

Aves Exóticas em Portugal: anos de 2005-2008

Non-native birds in Portugal in 2005-2008

Compilado por Rafael Matias

RESUMO

Nesta compilação de registos são apresentadas observações de 55 espécies de aves exóticas em liberdade em Portugal respeitantes principalmente ao período de 2005 a 2008. Para muitas espécies, a tendência de colonização progressiva do habitat disponível aparentemente mantém-se. Foram registadas 12 novas espécies para Portugal Continental, uma para os Açores e outra para a Madeira. As novas espécies naturalizadas, em vias de se naturalizarem ou que estarão a reproduzir-se com regularidade são 7: o Ganso do Egipto *Alopochen aegyptiaca*, o Pato-do-mato *Cairina moschata*, o Periquito da Guiné *Poicephalus senegallus*, o Periquitão-de-cabeça-azul *Aratinga acuticaudata*, o Rouxinol do Japão *Leiothrix lutea*, o Bico-de-chumbo-malhado *Lonchura punctulata* e a Viúva-cauda-de-alfinete *Vidua macroura*.

SUMMARY

Observations of 55 species of non-native birds in Portugal, mostly from the period 2005 to 2008, are presented. Twelve new species for Mainland Portugal were recorded, as well as one new both for the Azores and Madeira. The new naturalized species or that are probably breeding regularly are Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*, Muscovy Duck *Cairina moschata*, Senegal Parrot *Poicephalus senegallus*, Blue-crowned Parakeet *Aratinga acuticaudata*, Red-billed Leiothrix *Leiothrix lutea*, Scaly-breasted Munia *Lonchura punctulata* and Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*.

No presente, tal como previsto há alguns anos atrás, Portugal alberga populações crescentes de cada vez mais espécies de aves introduzidas ou escapadas de cativeiro. São 7 aquelas que parecem irremediavelmente instaladas (ou naturalizadas) no território continental (ver Matias *et al.* 2007) e agora outras 7 tudo indica seguirem o percurso

das primeiras. Estas potenciais novas espécies naturalizadas são o Ganso do Egipto *Alopochen aegyptiaca*, o Pato-do-mato *Cairina moschata*, o Periquito da Guiné *Poicephalus senegallus*, o Periquitão-de-cabeça-azul *Aratinga acuticaudata*, o Rouxinol do Japão *Leiothrix lutea*, o Bico-de-chumbo-malhado *Lonchura punctulata* e a Viúva-cauda-de-alfinete *Vidua macroura*.

Torna-se evidente que a tendência desta situação será a de um agravamento nos próximos anos, com cada vez mais espécies a conseguir estabelecer-se, algo que poderá vir a ser facilitado pelas presentes alterações climáticas. É sabido que muitas destas espécies são introduzidas directamente por particulares, com o intuito de vê-las procriar em liberdade no nosso país, apesar de tal representar uma clara violação da legislação em vigor, para além de evidenciar noções de ecologia e civismo particularmente reprováveis. Os impactos destas espécies na fauna e flora nativas são potencialmente muito graves e encontram-se bem documentados em variados casos de desastre ecológico ocorridos noutras partes do Mundo. Em Portugal, os impactos destas espécies são em grande medida desconhecidos, consistindo o nosso conhecimento actual principalmente de especulações e de dados não sistemáticos ou observações ocasionais. Faltam cada vez mais estudos sérios que foquem as potenciais interações das espécies introduzidas com as espécies autóctones.

Por outro lado, uma inacção quase total por parte das autoridades competentes, por falta de meios ou de capacidade, face à actual situação, tão preocupante do ponto de vista da manutenção da biodiversidade natural, tem sido um fraco obstáculo à presença de cada vez mais espécies potencialmente invasoras. Apesar da disponibilização de informação detalhada sobre o assunto, quase inexistente há apenas alguns anos atrás, não parece haver vontade de uma mudança séria na tendência que se observa.

Os processos de erradicação de espécies invasoras instaladas são extremamente complexos e onerosos, tanto do ponto de vista de recursos humanos, como do ponto de vista metodológico. Seria, de facto, mais eficiente um processo de monitorização que permitisse detectar atempadamente as espécies novas, recém-introduzidas, numa fase em que a erradicação fosse ainda uma opção viável.

Esta pequena compilação de registos, abrangendo quatro anos diferentes, permite confirmar as tendências registadas para muitas espécies em anos anteriores (ver Matias 2002, 2003, 2004, 2006a, 2006b) e tem como objectivo contribuir para o conhecimento da situação dessas mesmas espécies no nosso país. Contudo, deve ser tido em consideração que os registos reportados, embora importantes, representam apenas uma parte da realidade das aves exóticas em Portugal, devido a muitas espécies serem discretas, de difícil detecção ou difícil contagem, ou devido a muitas das observações infelizmente não serem divulgadas.

Os principais critérios de selecção de registos de espécies exóticas (ou não nativas) para publicação são os seguintes:

- registos efectuados fora das áreas de ocorrência conhecidas para as espécies naturalizadas (categoria **C**);
- registos envolvendo um número excepcional de indivíduos;
- registos de nidificação de espécies não naturalizadas (categoria **E**);
- estimativas de populações locais;
- aves exóticas observadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

São também publicados registos de espécies exóticas observadas pela primeira vez em liberdade em Portugal (segundo a lista publicada em Matias *et al.* 2007) ou outros sempre que se julgue adequado. Por forma a conseguir uma listagem completa das espécies de aves exóticas observadas em liberdade no nosso país, registos divulgados noutras publicações poderão ser incluídos nesta compilação caso a sua relevância o justifique (por exemplo, serem espécies novas para Portugal).

Para determinadas espécies com potencial para se tornarem espécies-praga (por exemplo, o Pardal-de-bico-vermelho *Quelea quelea*) todos os registos

serão publicados, apesar da sua nidificação nunca haver sido confirmada no nosso país. Devido à comprovada versatilidade de numerosas espécies introduzidas em relação à época de reprodução, todos os registos poderão ser considerados potenciais dados de nidificação.

A propriedade dos dados apresentados é dos respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia (por exemplo: 1 macho observado nos arrozais da Quinta da Vala, Silves em 08.07.2004 (N. Fonseca *in* Matias 2006)).

Os registos encontram-se agrupados por distrito, cuja ordenação é feita aproximadamente de norte para sul (de forma a possibilitar mais facilmente uma noção da distribuição geográfica). Dentro de cada distrito, os registos são ordenados por data.

Nestes quatro anos de dados foram observadas 55 espécies de aves exóticas em liberdade, das quais 12 são novas espécies para Portugal Continental (lista E), metade das quais Anatídeos. Até ao final de 2008 foi assim registado um total de 97 espécies de aves exóticas em liberdade em Portugal Continental (ver Matias *et al.* 2007). O número total de espécies introduzidas observadas nas ilhas está ainda por definir devido à existência de registos muito antigos ainda não estudados e compilados na totalidade.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTOS

PORTUGAL CONTINENTAL

Cisne-preto *Cygnus atratus* (E)

(Austrália)

Porto, Vila Nova de Gaia, Cabedelo, 17.09.2008, 1 ad. (A. Caldas), existem fotografias.**Faro**, Portimão, Morgado do Reguengo, albufeira dos Álamos, 21.09.2006, 1 ind. (N. Fonseca).**Comentário:** fugas de espécie ornamental mantida, por exemplo, nalguns lagos de jardim.**Ganso-chinês** *Anser cygnoides* (E)

(Ásia Central e Oriental)

Lisboa, Torres Vedras, foz do rio Alcábrichel, 15.06.2008, 2 inds. (L. Vieira).**Comentário:** primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal, que é mantida como animal doméstico nalguns locais.**Ganso do Egípto** *Alopochen aegyptiaca* (E*)

(África Subsariana)

Viana do Castelo, Caminha, estuário do Minho, 09.02.2003, 2 inds. (F. Areias, R. Santos, S. Santos, P. Pereira); Ponte de Lima, Lagoas de Bertandos e S. Pedro de Arcos, 26.10-19.11.2006, 2 ads e 1 juv. (M. Cardoso, E. Gonçalves, M. Gonçalves);**Braga**, Esposende, rio Cávado, 28.12.2002, 2 inds. (C. Noivo); Esposende, Fão, rio Cávado, 10.08.2006, 4 inds. (L. Reino, J. Santana); mesmo local, 16.07-02.08.2008, 15-16.08.2008, pelo menos 5 inds. (L. Reino, Joana Santana).**Porto**, Porto, Parque da Cidade, 15.10.2003, 3 inds. (M. Azeredo); mesmo local, 06.08.2006, 2 inds. (P. Guimarães);**Coimbra**, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal, 19.08.2002, 1 ind. (P. Tenreiro);**Santarém**, Benavente, Vasa Sacos, 22.08.2004, 2 juvs. (C. Noivo);**Lisboa**, Sintra, Azóia, pedreira da Biscaia, 07.05.2005, 1 ind. (J. Simão), existem fotos.**Setúbal**, Alcochete, Hortas (tanques próximos), 10.12.2006, 2 inds. (P. Fernandes); Alcochete, Hortas, 24.02.2007, 1 ind. (A. Tomás); mesmo local, 24.03.2007, 1 ind. sem anilhas (L. Gordinho); Alcácer do Sal, arrozais junto ao quartel dos

bombeiros, 05.03.2008, 2 inds. (P. Lourenço);

Évora, Arraiolos, albufeira do Sargacinho, 15.03.2007, 5 inds. (P. Melro, J. P. Melro); Herdade da Camoeira, 15-16.04.2007, ninhada com 8 crias (M. Abreu);**Beja**, Alvito, Lagoa dos Patos, 12.04.2008, 1 ind. (J. L. Almeida); mesmo local, 11 e 15.11.2008, 1 ind. (A. Dias, L. Palma, G. Elias e observadores da saída da SPEA “circuito das albufeiras alentejanas”);**Comentário:** esta espécie tem vindo a desenvolver populações assilvestradas em diversos pontos do país, provavelmente a partir de aves ornamentais fugidas de lagos e jardins. É de destacar a distribuição dos registos ao longo de grande parte da metade ocidental do país (onde se concentra a maioria das zonas húmidas) e o facto de muitos dos indivíduos se manterem por muito tempo num mesmo local. Embora esta espécie tenha sido introduzida em diversos países europeus com maior ou menor sucesso, não há evidência que cheguem ao nosso país indivíduos no decurso de migrações ou divagância.**Pato-do-mato** *Cairina moschata* (E*)

(América Central e do Sul)

Braga, Esposende, Fão, rio Cávado, 10.08.2006, 2 inds. (assilvestrados) (L. Reino, J. Santana);**Leiria**, Pedrogão Grande, Albufeira de Cabril, 12.01.2008, 2 inds. (P. Fernandes);**Setúbal**, Sines, foz da Ribeira de Moinhos, 17.06.2007, 1 ad. (L. Gordinho);**Évora**, Mourão, 31.05.2006, pelo menos 3 adultos voadores (incluindo 2 fêmeas, uma com 3 e outra com 9 crias pequenas) (L. Gordinho); Montemor-o-Novo, albufeira da Anta, 19.01.2007, 1 ind. (M. Caetano); Mourão, albufeira de Mourão, 23.02.2007, 3 inds. voadores (L. Gordinho);**Comentário:** o primeiro caso de nidificação desta espécie em completa liberdade no nosso país é relativamente recente (ver Equipa Atlas 2008), havendo no entanto muitos registos anteriores de reprodução em parques e jardins, por exemplo da Grande Lisboa, em que os indivíduos (incluindo a

prole) circulavam livremente; poderá estar em vias de se estabelecer uma população assilvestrada (ou várias) desta espécie.

Marreca-de-coleira *Calonetta leucophrys* (E)
(América do Sul)

Coimbra, Coimbra, Choupal, 28.12.2007, 1 ind. (H. Afonso);

Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal.

Pato-mandarim *Aix galericulata* (E)
(Ásia Oriental e introduzido no sul da Grã-Bretanha)

Braga, Barcelos, Lagoas de Areias de Vilar, 26.04.2008, 1 casal (F. Areias);

Viseu, Mangualde, Fagilde, rio Dão, 20.11.2008, 2 inds. (V. Olazabal).

Comentário: estes são os primeiros registos publicados desta espécie para Portugal Continental.

Pato-carolino *Aix sponsa* (E)
(América do Norte e introduzido na Grã-Bretanha)

Viana do Castelo, Ponte de Lima, Paisagem Protegida das Lagoas de Bertandos e S. Pedro de Arcos, 17.10.2002, 1 macho e 2 fêmeas (E. Gonçalves, M. Cardoso); mesmo local, 30.10.2002, 1 casal (E. Gonçalves).

Braga, Esposende, Fão, Rio Cávado, 12.04.2004, 1 macho, existe fotografia (C. Rio); mesmo local, Setembro de 2004, 2 machos e uma fêmea (C. Rio).

Santarém, Abrantes, jardim do castelo de Abrantes, 10.04.2004, 1 macho (V. Garcia).

Comentário: primeiros registos publicados desta espécie em liberdade em Portugal Continental. Apesar de esta espécie ter uma distribuição neártica, o potencial divagante é considerado reduzido, pelo que correntemente os registos desta espécie no continente são publicados nesta secção (embora nos Açores os registos sejam considerados como provenientes de divagância natural). É ainda possível a sua proveniência a partir da reduzida população britânica (o que incluiria a espécie na categoria C5), embora tal tenha sido considerado improvável.

Marreca-oveira *Anas sibilatrix* (E)
(América do Sul)

Braga, Esposende, Fão, 15.08.2008, 1 ind. (L.

Reino, J. Santana);

Comentário: nova observação desta espécie, que representa uma fuga de cativeiro.

Pato-canela *Anas cyanoptera* (E)
(Américas)

Santarém, Santarém, ribeira das Fontainhas, 09.04.2006, 1 casal (H. Feith).

Comentário: 2006 foi o terceiro ano consecutivo em que a espécie foi observada na Primavera, neste mesmo local; estes indivíduos poderão ser provenientes de uma colecção de aves aquáticas existente no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (H. Feith *in litt.*).

Arrábio-de-faces-brancas *Anas bahamensis* (E)
(Caraíbas e América do Sul)

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 26.10.2003, 1 ind. (C. Noivo), existe fotografia.



Arrábio-de-faces-brancas, P. Boquilobo, Golegã, Outubro de 2003 (C. Noivo)

Arrábio-de-bico-vermelho *Anas erythrorhynchos* (E)
(África Austral e Oriental)

Setúbal, Sesimbra, Lagoa de Albufeira (Lagoa Pequena), 19 a 30.12.2006, 1 ind. (C. Pacheco, L. Costa, V. Encarnação, P. Geraldês, Faisca, J. Farminhão);

Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal.

Pato-capuchinho (ou Marreca-cricri)

Anas versicolor (E)
(América do Sul)

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 24 e 26.10.2003, 1 ind. (C. Noivo).

Comentário: primeiro registo desta espécie em

liberdade em Portugal.

Merganso-capuchinho *Lophodytes cucullatus* (E)

(América do Norte)

Braga, Esposende, Fão, Rio Cávado, desde 15.10.2008 até depois do final do ano, 1 fêmea portadora de anilha de cativo (R. Paulo, A. Caldas, E. Castro, J. Catchpole, M. Millais); existem fotografias.

Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal Continental. Apesar de a chegada de aves desta espécie por via natural (divagância) a partir da América do Norte ser muito possível, este merganso-capuchinho apresentava anilha de cativo (inscrição NL9), indicando a sua origem e inviabilizando a sua consideração para inclusão na categoria A, ou mesmo D (uma vez que a sua origem de cativo é certa). De momento, esta espécie encontra-se incluída na categoria A apenas para a região dos Açores.



Merganso-capuchinho, Rio Cávado, Outubro de 2008 (R. Paulo)

Faisão-comum *Phasianus colchicus* (E*)

(Eurásia)

Castelo Branco, Castelo Branco, Monte das Corgas (junto ao rio Pônsul), 29.03.2007, 1 macho (R. Lima);

Santarém, Benavente, Bate-Orelha/Pancas, 28.01.2006, 1 fêmea (R. Matias, N. Pereira, S. Pereira); Coruche, Vinhas da Erra, 05.06.2007, 1 macho (L. Guilherme); mesmo local, 19.06.2007, 1 fêmea (J. Guilherme); mesmo local, 06.07.2007, 1 fêmea com 5 juvenis junto à estrada (L. Guilherme); Coruche, Erra, junto ao rio Sorraia, 28.07.2007, 1 fêmea (L. Guilherme, B. Pacheco); Tomar, S. Pedro de Tomar, Quinta do Falcão, 30.08.2007, 1 macho

(P. Alves); Coruche, Erra, junto à estrada para Vale Vidro, 13.09.2007, 3 machos ads. e 1 macho juv. (L. Guilherme, J. Guilherme); Coruche, Vinhas da Erra, 6 fêmeas e 1 macho juv. (J. Guilherme); Benavente, Pancas, 15.11.2007, 1 macho (A. Gonçalves); Coruche, Vinhas da Erra, 30.11.2007, 1 macho (L. Guilherme, J. Guilherme); Coruche, Vinhas da Erra, 10-11.05.2008, 1 macho (L. Guilherme, E. Machado, J. Guilherme); Benavente, Pancas, 07.06.2008, 1 casal (P. Marques); Coruche, Vinhas da Erra, 21.06.2008, 1 casal e 2 juvs. (J. Guilherme); Benavente, Pancas, 10.11.2008, 1 macho (P. Fernandes, P. Fondinho);

Lisboa, Sintra, Sabugo, 01.03.2006, 1 fêmea (R. Matias);

Setúbal, Seixal, Corroios, junto ao moinho de maré, 12.01.2007, 1 ind. (J. Alves, P. C. Rodrigues); Seixal, Corroios, frente ao Sapal do Talaminho, 05.02.2007, 1 ind. (J. Alves); Palmela, Zambujal, 20.12.2008, 1 macho (J. Muchaxo);

Évora, junto à N114, 22.12.2007, 1 macho, (L. Guilherme, E. Machado); Évora, Herdade da Mitra, 21.04.2008, 1 fêmea (M. Caetano);

Beja, Serpa/Vidigueira, albufeira de Pedrógão, rio Guadiana (a sul do Monte do Corte Serrão), 20.12.2006, 1 ind. em voo (L. Gordinho).

Comentário: esta espécie é alvo de largadas anuais com finalidade cinegética em muitos pontos do país; parte destas aves sobrevive à época de caça e, muito ocasionalmente, reproduz-se em liberdade; a quantidade de registos de reprodução na zona da Erra poderá fazer suspeitar a existência de um núcleo naturalizado na região.

Urubu-de-cabeça-vermelha *Cathartes aura* (E)

(Américas)

Aveiro, Aveiro, Dunas de S. Jacinto, 30.09.2007, 1 ad. em voo (S. Mackay, M. Silva).

Comentário: registo bastante inusitado, o primeiro desta espécie em liberdade em Portugal (suportado por uma descrição detalhada), que provavelmente reflecte o facto de esta espécie ser usada nalguns locais onde se fazem demonstrações com aves de rapina de cativo.

Abibe do Senegal *Vanellus senegallus* (E)

(África Subsariana)

Lisboa, Oeiras, junto ao Tagus Park (Porto Salvo), 17.05.2008, 1 ad. (R. Tomé, A. Chambel, M. Dias. C.

Noivo e outros); existem fotografias.

Comentário: trata-se do primeiro registo em liberdade em Portugal. Esta ave permaneceu neste local de forma continuada desde que foi encontrada na data inicial até já depois do final de 2008. O facto de este indivíduo ter permanecido tanto tempo no mesmo local reflecte o facto de ser uma espécie sedentária nos seus locais de origem e de representar uma fuga de cativeiro.

Caturra *Nymphicus hollandicus* (E)
(Austrália)

Santarém, Benavente, Porto Alto, 02.12.2006, 1 ind. (L. Gordinho, G. Martins); Benavente, junto ao Rio Sorraia, 28.10.2007, 1 ind., (D. Fonseca, F. Canário);

Lisboa, Lisboa, Belém, 11.09.2005, 1 ind. (J. T. Tavares); Lisboa, Praça da Ilha do Faial, 20.06.2006, 1 ind. a vocalizar (L. Gordinho, M. Porto); Lisboa, Largo da Estefânia, 28.08.2007, 1 ind. (A. H. Leitão); Cascais, Carcavelos (praia), 01.10.2008, 1 ind. (P. Fernandes);

Setúbal, Sesimbra, Lagoa de Albufeira, 13.04.2006, 1 ind. em voo (P. Fernandes).

Beja, Odemira, Vila Nova de Milfontes, 16.10.2004, 1 ind. em voo (C. Pacheco).

Faro, Faro, Vale de Carneiros, 11.07.2006, 1 ind. (N. Fonseca); Portimão, Morgado do Reguengo, Almandarim, 09.08.2006, 1 ind. (N. Fonseca); Faro, Vale de Carneiros, 26.10.2006, 2 inds. (N. Fonseca).

Comentário: novos registos em liberdade desta espécie, muito comum em cativeiro; este psitacédeo é observado com regularidade na parte norte da cidade de Faro (N. Fonseca, *in litt.*).

Periquito-comum *Melopsittacus undulatus* (E*)
(Austrália)

Santarém, Coruche, 04.10.2007, 1 ind. nos campos de tomate (L. Guilherme);

Lisboa, Cascais, costa da Guia, 18.10.2007, 1 ind. (D. Travassos);

Setúbal, Palmela, Lagoa da Salgueirinha, 16.10.2008, 1 ind. com Pintarroxos *Carduelis cannabina* (G. Elias);

Faro, Faro, Vale Carneiros, 28.06.2008, 1 ind. “verde” (N. Fonseca); mesmo local, 01.10.2008, 1 ind. (N. Fonseca).

Comentário: esta espécie é observada com alguma frequência em liberdade (aves isoladas), referindo-se os registos a fugas de cativeiro.

Papagaio-cinzento *Psittacus erithacus* (E)
(África Ocidental e Central)

Coimbra, Coimbra, Penedo da Saudade, 07.08.2005, 1 ind. (R. Lopes)

Comentário: espécie ocasionalmente registada em liberdade em resultado de fugas de cativeiro.

Periquito da Guiné *Poicephalus senegalus* (E)
(África Ocidental)

Lisboa, Lisboa, Benfica, 22.03.2005, 1 ind. junto à igreja (L. Vieira); Lisboa, Jardim dos Mártires da Pátria, 22.07.2005, 3 inds. (J. P. Severino); Lisboa, Tapada da Ajuda, 12.09.2005, 2 inds. (P. J. Pinheiro); Lisboa, Jardins do Palácio de Belém, 31.07.2008, 1 ind. (E. Alípio); Lisboa, Belém, jardins do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 07.09.2008, 1 ind. (J. T. Tavares); Lisboa, Alcântara, Instituto Superior de Agronomia (ISA), 16.10.2008, 3 inds. (P. Pereira); Lisboa, Belém, Palácio de Belém, 11.12.2008, 1 ind. em voo (C. Pacheco); Lisboa, Alcântara, sobre o acesso à Ponte 25 de Abril, 17.12.2008, 10 inds. em voo (C. Pacheco); Lisboa, Alcântara, ISA, 18.12.2008, 3 inds. a pernoitar no arvoredado (P. Pereira).

Comentário: continuam a observar-se indivíduos e pequenos bandos desta espécie, contudo uma prova definitiva de reprodução em liberdade não foi ainda obtida (embora, dada a regularidade com que é observado e dos números envolvidos, muito provavelmente, já criou em liberdade em Portugal Continental (em Lisboa); as aves do Jardim dos Mártires da Pátria alimentavam-se de sementes de *Casuarina* sp..

Inseparável-pequeno *Agapornis pullarius* (E)
(África Ocidental e Central)

Faro, Faro, Gambelas, 15.07.2003, 1 ind. num pinhal (N. Fonseca).

Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal.

Inseparável-de-faces-rosadas
Agapornis roseicollis (E)

(Sudoeste africano)

Évora, Évora, centro (perto da muralha), 03.06.2008, 1 ind. (I. Santos).

Comentário: espécie muito comum em cativeiro, mas que não é vista muito frequentemente em liberdade.

Inseparável de Fischer *Agapornis fischeri* (E)

(África Oriental)

Faro, Lagoa, Vale de Milho, Alfanzinia, 17.01.2008, 6 inds. (M. Borrowdale, D. Borrowdale).**Comentário:** os observadores referem que algumas destas aves pareciam juvenis; contudo, tal não pôde ser confirmado; caso se confirmasse, seria relevante provar que a reprodução teria ocorrido em liberdade e não em cativeiro (com as aves libertadas posteriormente). Um mínimo de 2 indivíduos foi observado desde o final de Novembro de 2007 (M. Borrowdale *in litt.*) neste local.**Periquito-de-colar** *Psittacula krameri* (CE)

(África e sul da Ásia)

Viana do Castelo, Ponte de Lima, 27.02.2007, 1 ind. (G. Alexander);**Braga**, Barcelos, Barcelinhos, 21.07.2007, 1 ind. (G. Alexander);**Porto**, Porto, junto à foz do Douro, 13.05.2005, 4 inds. em voo (M. Azeredo);**Santarém**, Coruche, Erra (Quinta do Roseiral), 03.09.2007, 1 ind. azulado em voo (L. Guilherme);**Lisboa**, Lisboa, Benfica, 24.03.2005, 1 ind. junto à igreja (L. Vieira); Lisboa, Campo Grande, junto à Torre do Tombo, 24.04 - 09.05.2005, cerca de 10 inds (R. Tomé, A. Chambel); Oeiras, estação agronómica de Oeiras, 13.05.2005, 4 inds. (R. Tomé); Oeiras, Oeiras, 24.07.2005, 6 inds. juntos (J. Rodrigues); Cascais, junto ao Museu do Mar, 30.06.2006, 5 inds. (P. Fernandes, N. O'Connor, J. Saumande); Oeiras, Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, 26.09.2007, 6-8 inds. a alimentar-se de figos (D. Travassos);**Setúbal**, Setúbal, 19.08.2005, 1 ind. (J. Rodrigues); Alcochete, Hortas, 01.11.2006, 1 ind. (L. Gordinho); Seixal, Paio Pires, 13.07.2008, 1 ind. (J. T. Tavares).**Portalegre**, Elvas, junto ao Jardim Municipal, 22.08.2007, 4 inds. (N. Domingos); Elvas, 4 km a Leste de Vila Fernando, 14.05.2007, 1 ind. (C. Pacheco);**Faro**, Loulé, 18.04.2006, 3 inds. (J. M. Pereira); Portimão, Ria de Alvor, 04.11.2007, 2 inds. (J. Garzón); Loulé, entrada sul de Almancil, 16.07.2008, 3 inds. (J. M. Pereira).**Comentário:** novos registos desta espécie que ilustram a sua expansão no país durante o início do século XXI; os registos na região de Lisboa são aqui incluídos a título meramente ilustrativo,

uma vez que a sua população nesta zona ultrapassa provavelmente as 200 aves (ver Matias 2008).

Periquitão-de-cabeça-azul*Aratinga acuticaudata* (E)

(América do Sul)

Lisboa, Lisboa, Jardim Mártires da Pátria, 22.07.2005, 5 inds. alimentando-se de sementes de *Casuarina* sp. (J. P. Severino); Lisboa, Jardim Botânico, 06-07.10.2006, pelo menos 10 inds. juntos a alimentar-se (R. Lima);**Évora**, Évora, Herdade da Mitra, 1 ind. em 10.10.2008 (M. Caetano) e em 04.11.2008 (L. Guilherme, E. Machado, P. Serralha);**Faro**, Faro, Quinta do Ludo, 21.09.2008, 2 inds. (J. T. Tavares).**Comentário:** continuam a observar-se indivíduos e pequenos bandos desta espécie; contudo, embora muito provável, uma prova definitiva de reprodução em liberdade não foi ainda obtida.**Periquito-de-cabeça-preta** *Nandayus nenday* (E)

(América do Sul)

Faro, Portimão, Mexilhoeira Grande, 15.01.2008, 1 ind. (D. Radford).**Comentário:** espécie ocasionalmente registada em liberdade em resultado de fugas de cativeiro.**Papagaio da Patagónia** *Cyanoliseus patagonus* (E)

(Sul da América do Sul)

Braga, Vila Nova de Famalicão, Vilarinho das Cambas, 06.04.2007, 1 ind. (A. Caldas), existem fotos;**Setúbal**, Almada, Costa da Caparica (junto à Praia da Rainha), 06.06.2006, 1 ind. (R. Tomé, J. Cancela, A. N. Adelino, R. Guerreiro); Sesimbra, Cabo Espichel, 23.06.2007, 1 ind. (R. Guerreiro, G. Elias);**Faro**, Tavira, Vale de Asseca, 05.01.2008, 1 ad. em voo (C. Viney).**Comentário:** novos registos de aves isoladas desta espécie, sem evidências de nidificação.**Periquito-monge** *Myiopsitta monachus* (E*)

(América do Sul)

Lisboa, Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre do Jardim Zoológico, 21.07.2005, 2 inds. num ninho (R. Matias, J. Andrade); Loures, Parque do Tejo (junto à Ponte Vasco da Gama), 10.02.2008, 1 ind. (G. Elias);

Beja, Castro Verde, estrada Castro Verde – Mértola (próx. desvio para barragem da Apariça), 11.05.2007, 1 ad. (J. Dake, T. Farr, A. Grinter, M. Seery, S. Wates);

Faro, Portimão, próx. estação CF de Portimão, 25.12.2007, 1 ind. (N. Fonseca);

Comentário: para além dos registos acima, refira-se a presença da espécie em liberdade na área do Jardim Zoológico de Lisboa durante todo o período a que se refere esta compilação.

Papagaio-campeiro *Amazona ochrocephala* (E)
(América do Sul)

Lisboa, Lisboa, Picoas (Praça José Fontana), Maio 2007, 1 ind. (N. Pereira).

Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal.

Rola-doméstica *Streptopelia roseogrisea* var. domestica (“*S. risoria*”) (E)

(a forma selvagem ocorre naturalmente na África subsariana, contudo a forma doméstica é mantida vulgarmente em cativeiro)

Faro, Albufeira, Olhos de Água, 18.01.2008, 1 ind. (G. Oliosio).

Comentário: espécie ocasionalmente registada em liberdade em resultado de fugas de cativeiro.

Gaio-de-cauda-branca *Cyanocorax mystacalis* (E)
(América do Sul)

Faro, Olhão, jardins da povoação, presente pelo menos de Março de 2007 a Agosto de 2008, 1 ind. em nespereiras (*cabo Serrano* - GNR Olhão, comunicado por J. M. Pereira e A. Marques), existem fotografias.

Comentário: primeiro registo desta espécie, endémica do Perú e do Equador, em liberdade em Portugal.



Gaio-de-cauda-branca, Olhão, (*cabo Serrano* - GNR Olhão)

Estorninho-metálico-púrpura

Lamprolornis purpureus (E)
(África Subsariana)

Viana do Castelo, Caminha, estuário do Minho, 14.08.2007, 1 ind. (R. Rebelo);

Faro, Vila do Bispo, estrada para Vale Santo, 22.10.2006, 1 ind. (J. T. Tavares).

Comentário: novas observações desta espécie em liberdade, sem evidência de nidificação.

Estorninho-metálico-lamurioso

Lamprolornis chalybaeus (E)
(África Subsariana)

Aveiro, Aveiro, 27.04.2008, 1 ind. (H. Roriz), existem fotos.

Comentário: a identificação de espécies do género *Lamprolornis* é complexa; a identificação deste indivíduo foi confirmada pela análise cuidadosa de fotografias fornecidas pela observadora se pela descrição detalhada das vocalizações.

Estorninho-metálico *Lamprolornis* sp. (E)
(África Subsariana)

Lisboa, Lisboa, Feira da Ladra, 21.12.2004, 1 ind. (P. Lourenço); Oeiras, Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, 26.09.2007, 1 ind. (D. Travassos).

Comentário: muitos registos de aves deste género permanecem indeterminados ao nível da espécie, devido às dificuldades de identificação; esta informação é ainda assim interessante.

Mainá-indiano *Acridotheres tristis* (E)
(Sul e Centro da Ásia)

Porto, Vila Nova de Gaia, Lavadores, 12.03.2006, 1 ind. (M. Rego), existe fotografia;

Lisboa, Lisboa, Campo das Cebolas/Terreiro do Paço, 08.07.2005, 1 ind. a cantar (A. Leitão); mesmo local, 04.08.2005, 2 inds. (A. Leitão); Cascais, Carcavelos (junto à estação CF), 03.08.2005, 1 ind. a cantar (A. Leitão); Lisboa, Campo das Cebolas/Terreiro do Paço, 08.04.2006, 2 inds., pelo menos um deles a entrar muitas vezes numa cavidade de um edifício e canto também ouvido (R. Matias); Cascais, Carcavelos (forte S. Julião da Barra), 10.04.2006, 1 ad. (L. Paninho), existe fotografia; Lisboa, golf da Bela Vista (e Quinta das Teresinhas), 23.07.2006, 1 ind. (L. Gordinho); Lisboa, Terreiro do Paço (junto ao cais de embarque), 08.02.2008, 2 inds (J. Bried);

Cascais, Boca do Inferno, 30.03.2008, 1 ind. (M. Rodrigues);

Setúbal, Corroios, sapal de Corroios, junto à ETAR, 07.09.2005, 3 inds. (C. Pereira); Almada, junto à Costa da Caparica, 22.06.2008, 1 ind. (M. Silva, S. MacKay).

Comentário: apesar de a reprodução desta espécie não ainda sido ainda formalmente confirmada em Portugal, o comportamento do casal observado em Lisboa (Terreiro do Paço) parece apontar nesse sentido.

Mainá-de-crista *Acridotheres cristatellus* (C)

(Sudeste Asiático)

Lisboa, Oeiras, Instituto Gulbenkian de Ciência, 24.07.2005, 7 inds. juntos (J. Rodrigues); Cascais, Carcavelos (perto estação CF), 13 e 25.06.2006, 3 inds., um deles a entrar numa cavidade de um edifício com comida no bico (A. H. Leitão); Oeiras, Quinta do Marquês, 26.09.2006, 24 inds. (R. Tomé, T. M. Tomé); Oeiras, Jardins do Marquês, 02.03.2007, 10 inds. (R. Tomé); Oeiras, Cruz Quebrada (margem da ribeira do Jamor), 27.04.2007, 1 ind. (A. Pena); Cascais, Carcavelos (perto estação CF), 19.05.2007, 2 ads. a alimentar duas crias voadoras (R. Tomé); Cascais, Carcavelos, 23.02.2008, 6-7 inds. (A. Gonçalves); Cascais, Trajouce, 18.05.2008, 1 casal a transportar material de construção de ninho (R. Tomé, A. Silvério); Oeiras, junto à biblioteca, 18.05.2008, pelo menos 8 inds. (R. Tomé); Porto Salvo, Tagus Park, 18.06.2008, 1 ind. (R. Tomé); mesmo local anterior, 25.06.2008, 2 inds. (R. Lima, N. Pires);

Setúbal, Corroios, sapal de Corroios, junto à ETAR, 07.09.2005, 42 inds. (C. Pereira); Almada, Parque da Paz, 29.02.2008, 2 inds. (M. Estevens, P. Silva); Seixal, Quinta da Fidalga, 12.05.2008, 1 ind. (J. T. Tavares); Almada, Trafaria, Mata do Ribeiro da Enxurrada, Junho 2008, ca. 40 inds. (C. Carvalho, C. Vieira); mesmo local, 08-09.08.2008, ca. 20 inds. (C. Carvalho, C. Vieira); Almada, Costa da Caparica, sobre o Ondaparque, 08.09.2008, 2 inds. (P. Silva); Almada, Costa da Caparica, entrocamento da Via Panorâmica Pablo Neruda com o IC20, 11.10.2008, ca. 20 inds. (M. Estevens, I. Marques); Seixal, Corroios, ETAR de Miratejo, 13.12.2008, pelo menos 60 inds. (H. Costa);

Évora, Évora, 03.05.2006, 1 ind. em voo (G. Dias).

Comentário: novos registos deste mainá que parece continuar a sua expansão, desde os primeiros registos em liberdade em Portugal, em 1997 (Matias 2002). A observação em Évora poderá não ter ligação directa com as populações naturalizadas, podendo tratar-se de uma fuga de cativo.

Mainá-de-crista *Acridotheres cristatellus* x **Mainá-indiano** *Acridotheres tristis*

Lisboa, Cascais, Carcavelos, 23.02.2008, 1 ind. mostrando características fenotípicas intermédias entre estas duas espécies, deduzindo-se tratar-se de um híbrido (A. Gonçalves); existem fotografias.

Comentário: este registo ilustra uma situação única de hibridação entre as duas espécies (aparentemente inédita em liberdade), com a descendência a apresentar características intermédias. Note-se a sugestão de uma máscara clara, o bico relativamente pouco robusto, e corpo castanho com o centro do ventre branco e cabeça mais escura, características indicando a presença de genes de Mainá-indiano, e a crista/poupa pouco desenvolvida, as infracaudais não brancas e o bico relativamente curto e curvo que denunciam o Mainá-de-crista como o outro provável progenitor. Existem outras espécies de mainás *Acridotheres* sp. que foram descartadas, embora apresentem semelhanças superficiais com a ave em questão. Esta ave foi observada conjuntamente com Mainás-de-crista típicos e as duas espécies parentais foram registadas em simultâneo na mesma área (ver acima).



Híbrido de Mainá-de-crista x Mainá-indiano, Carcavelos, Fevereiro de 2008 (A. Gonçalves)

Bulbul-de-bigode-vermelho *Pycnonotus jocosus* (E)
(Sul e Sudeste Asiáticos)

Lisboa, Cascais, Carcavelos, Sassoeiros, 31.01.2007, 1 ind. (T. Martins), existem fotografias.

Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal.

Rouxinol do Japão *Leiothrix lutea* (E)
(Sudeste Asiático)

Coimbra, Lousã, alto da serra da Lousã, 14.08.2007, 2 inds. (A. Gonçalves);

Lisboa, Sintra, Peninha, parque de merendas, 15.04.2006, 3 inds. (R. Lima); Sintra, ribeira da Ursa, 28.10.2006, 3 inds. (N. Barreto), existe fotografia; Sintra, Pé da Serra, 27.01.2007, pelo menos 10 inds. (bando), (F. Moreira, A. I. Queiroz); Sintra, entre a Peninha e Adrenunes, 06.10.2007, pelo menos 5-6 inds. num bosque com carvalhos-negrais, sobreiros e cedros-do-Buçaco (D. Travassos); Sintra, Alto das 3 Cruzes, 17.10.2007, pelo menos 8 inds. (D. Travassos); Sintra, jardim em Sintra, 13.11.2007, 6 inds. (M. Poot);

Setúbal, Casais da Serra, Quinta da Arrábida, 31.07.2005, 4 inds. capturados em redes de anilhagem (G. Elias), existem fotos; Montijo, local exacto indeterminado, Abril 2006, 1 casal a alimentar-se num pomar de laranjeiras (D. Romão), existem fotos.

Comentário: estes novos registos confirmam a existência de uma população na região de Sintra, tal como era já sugerido por Matias (2002). As restantes observações indicam a existência de prováveis núcleos populacionais noutros pontos do país, cuja relação com o núcleo de Sintra é desconhecida. Esta espécie poderá estar mais distribuída do que estas observações poderão indicar. Apesar disto, não foi ainda reportada uma única observação de nidificação confirmada (e, assim, encontra-se na categoria E), sendo no entanto provável que se encontre já em processo de naturalização (em vias de ser classificada na categoria C). Há ainda relatos não confirmados da existência de um núcleo populacional junto à Ria de Alvor (Portimão). Sabe-se também que esta espécie tem vindo a ser capturada por passarinheiros no núcleo de Sintra para posterior venda.



Rouxinol do Japão, Q. da Arrábida, Julho de 2005 (G. Elias)

Tecelão-de-dorso-malhado *Ploceus cucullatus* (E*)
(África Subsariana)

Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca d'Alva, 04.08.2005, 1 macho apresentando as características da subespécie *P. c. cucullatus* (A. Leitão, R. Algarvio); Sesimbra, Lagoa de Albufeira, 09.05.2006, 1 macho com as características da subespécie *P. c. cucullatus* a construir ninho (R. Guerreiro); Alcochete, Herdade da Barroca d'Alva, 30.08.2007, 1 macho (M. Furtado); mesmo local anterior, 23.01.2008, 1 macho (plumagem eclipse) e 1 fêmea (M. Furtado); mesmo local anterior, 12.04.2008, 1 macho (A. Gonçalves); existem fotografias.

Comentário: novos registos desta espécie (todos do distrito de Setúbal), que parece reproduzir-se apenas ocasionalmente em liberdade em Portugal (muito ao contrário do Tecelão-de-cabeça-preta).

Tecelão-de-cabeça-preta *Ploceus melanocephalus* (C)
(África Subsariana)

Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal, 18.09.2003, 1 macho capturado em redes de anilhagem (P. Tenreiro). Existe fotografia.

Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca d'Alva, 04.08.2005, bando misto de machos e fêmeas que contava com 15 machos (A. Leitão, R. Algarvio).

Faro, Loulé, Vilamoura (Parque Ambiental), 10.03.2008, 8 inds. e 2 ninhos (G. Schreier); Loulé, Quinta do Lago, 17.05.2008 e 07 e 14.06.2008, 1 macho ad. (N. Fonseca); Loulé, Vilamoura (Parque Ambiental), 07.06.2008, 1 macho e 2 fêmeas (N. Fonseca, L. Campina)

Comentário: o registo no paul do Taipal foi o primeiro para o local. A observação na Barroca

D'Alva é incluída apenas a título ilustrativo, uma vez que a espécie é comum na zona.

Pardal-de-cabeça-vermelha *Quelea erythropis* (E)
(África Subsariana)

Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca d'Alva, 27.03.2006 e 08.04.2006, 1 macho (M. Gaspar, A. Gonçalves); mesmo local, 19.04.2006, 2 machos (S. Daly); existem fotografias.

Comentário: é possível que um dos indivíduos se trate da mesma ave observada desde Novembro de 2001 no mesmo local (ver Matias 2003).

Pardal-de-bico-vermelho *Quelea quelea* (E)
(África Subsariana)

Coimbra, Concelho, Paul do Taipal, Novembro de 2005, 1 ind. capturado em redes de anilhagem (P. Tenreiro).

Comentário: é surpreendente a quase ausência de registos desta espécie quando em anos anteriores foi registada com alguma frequência.

Bispo-de-coroa-amarela *Euplectes afer* (C)
(África Subsariana)

Aveiro, Estarreja, Salreu, 15.06.2005, 1 macho em plumagem nupcial (H. Afonso); Estarreja, Salreu, 14-22.12-2006, pelo menos 60 inds. (bando) em plumagem eclipse (J. Neto); Estarreja, Salreu, 05.04.2008, ca. 20 inds. em plumagem de eclipse (J. P. Tavares, G. Welch);

Coimbra, Figueira da Foz, Quinta do Canal, Ínsua, 15.10.2003, cerca de 140 inds. capturados em redes de anilhagem (P. Tenreiro).

Santarém, Coruche, Erra, junto ao rio Sorraia, 28.06.2007, 1 ind. (L. Guilherme); mesmo local, 28.07.2007, 3 machos e 2 fêmeas (L. Guilherme, B. Pacheco); entre o CNEMA e o Bairro do Choupal, 15.08.2007, 1 macho em parada nupcial (D. Leitão); Coruche, Erra, junto aos arrozais, 13.09.2007, 2 machos e 3 fêmeas (L. Guilherme);

Lisboa, Vila Franca de Xira, quadrícula UTMND01 (lezíria), 30.05.2006, 38 inds. detectados em 14 de 18 pontos (2.^a volta do CAC) (L. Gordinho); Vila Franca de Xira, arrozais da Giganta, 10.01.2008, ca. 1000 inds. (bando) (P. Fernandes, P. Fondinho);

Setúbal, Alcochete, Paul da Barroca d'Alva, 29.10.2006, ca. 200 inds. (R. Matias, C. D. Santos);

Comentário: este bispo continua a sua expansão,

parecendo tornar-se ainda mais numeroso, algo especialmente visível nas concentrações pós-nupciais; em 2005 continuava a ser bastante comum na zona da Quinta do Canal (P. Tenreiro *in litt.*)

Bispo-vermelho-d'asa-negra

Euplectes bordeaceus (E*)
(África Subsariana)

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 11.09.2006, 1 macho (C. Noivo);

Comentário: espécie muito raramente observada em liberdade, mas que já se reproduziu no Algarve (Matias 2002).

Bispo-laranja *Euplectes franciscanus* (E)
(África Subsariana)

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 01.09.2004, 1 ind. capturado em redes de anilhagem (ICNB).

Viúva-de-manto-amarelo *Euplectes macrourus* (E)
(África Subsariana)

Lisboa, Lisboa, Picoas, 11-12.10.2006, 1 macho a alimentar-se num relvado (N. Pereira, S. Pereira);

Comentário: fuga de cativo de uma espécie registada em liberdade em Portugal apenas uma vez anteriormente.

Bengali-vermelho *Amandava amandava* (C)
(Ásia Meridional)

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 05.08.2006, 1 macho (A. Tomás, R. Marcão); Benavente, Recoução, no caminho para Bate-Orelhas, 13.09.2008, 1 casal (P. Geraldès, R. Guerreiro, A. H. Leitão), existe foto; Golegã, Paul do Boquilobo, 09.11.2008, 2 inds. (G. Elias, M. Elias);

Setúbal, Palmela, Lagoa das Arrábidas (zona nordeste), 19.08.2006, 1 ind. a vocalizar (L. Gordinho); Alcochete, Paul da Barroca d'Alva, 29.10.2006, 1 ind. ouvido (R. Matias, C. D. Santos); Alcácer do Sal, arrozais junto às salinas de Monte Novo, 11.11.2006, 1 casal (A. Gonçalves); Alcochete, Barroca d'Alva, 01.11.2006, 5 inds. plumagem nupcial (L. Gordinho); Alcácer do Sal, arrozais junto a Monte Novo, 25.01.2008, mais de 40 inds. (P. Fernandes, P. Fondinho);

Portalegre, Elvas, junto ao Rio Caia, 30.01.2007, 29 inds. em dois bandos (L. Gordinho);

Beja, Alvito, a montante do dique da Lagoa dos Patos, 27.11.2006, 2 inds. a vocalizar (L. Gordinho, P. Beja); Alvito, Lagoa dos Patos, 01.11.2008, 6 inds. (G. Elias, M. Elias, D. Cortes).

Comentário: registos em vários locais da metade sul do país; a zona mais importante para esta espécie situa-se na zona de Elvas, onde já foram registados bandos com largas centenas de indivíduos (Matias 2002).

Ventre-laranja *Amandava subflava* (E*)
(África Subsariana)

Coimbra, Montemor-O-Velho, Paul do Taipal, 08.09.2003, 1 macho e uma fêmea capturados e anilhados (P. J. Tenreiro), mesmo local, 18.09.2003, 1 outro macho adulto capturado (P. J. Tenreiro).

Comentário: espécie ocasionalmente registada em liberdade em resultado de fugas de cativeiro; uma população existente no Paul das Caniceiras, Loures (Matias 2002), poderá estar extinta.

Mandarim *Taeniopygia guttata* (E*)
(Austrália)

Porto, Gaia, Cabedelo, estuário do Douro, 27.11.2008, 1 ind. (P. Cardia).

Comentário: espécie ocasionalmente registada em liberdade em resultado de fugas de cativeiro, cuja reprodução já foi verificada em liberdade em Portugal.

Bico-de-chumbo-malhado

Lonchura punctulata (E*)
(Sul e Sudeste Asiáticos)

Setúbal, Alcácer do Sal, Herdade do Pinheiro,

11.11.2006, 2 inds. (A. Gonçalves); Alcochete, paul de Rilvas, 05.08.2007, 1 ad. com pintassilgos *Carduelis carduelis* juvenis e *L. malacca* (P. Fernandes);
Comentário: esta espécie parece estar a expandir-se de acordo com as observações publicadas e relatos não confirmados.

Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta

Lonchura malacca (C)
(Sul e Sudeste Asiáticos)

Setúbal, Alcochete, paul de Rilvas, 05.08.2007, 3 ads. (P. Fernandes); Palmela, Águas de Moura, 31.03.2006, 1 ind. (R. Morgado); Palmela, Zambujal, 07.12.2006, 15 inds. (bando) (A. Gonçalves); Setúbal, Gâmbia, 18.03.2007, 6 inds. (P. Guerra, E. Brás); Alcochete, Herdade da Barroca d'Alva, 16.09.2008, 1 ad. a alimentar 2 juvs. (R. Silva);

Comentário: esta espécie é muito discreta e difícil de observar, pelo que as observações deverão apenas ser vistas como indicadores da sua presença.

Viúva-cauda-de-alfinete *Vidua macroura* (E)
(África Subsariana)

Aveiro, Oliveira do Bairro, proximidades da povoação, 28-30.07.2008, 1 macho e 3 fêmeas (M. Cardoso);

Comentário: é muito provável que esta espécie tenha já iniciado o processo de naturalização no nosso país, em resultado dos núcleos existentes desde a costa de Mira a Aveiro (ver, por exemplo, Petronilho *et al.* 2004). Esta viúva tem hábitos parasitas, pondo os seus ovos em ninhos de outras aves, sendo o Bico-de-lacre *Estrilda astrild* o seu hospedeiro preferencial.

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Perdiz-comum *Alectoris rufa* (E)
(Sudoeste da Europa)

Terceira, Praia da Vitória, perto de Biscoitos, 26.04.2005, 1 ind. encontrado morto (C. Pereira).

Graciosa, Serra Branca, 19.01.2006, 1 ind. (S. Rodebrand), existe foto.

Comentário: encontra-se mal documentada a presença desta espécie no arquipélago.

Charrela *Perdix perdix* (E)
(Eurásia)

S. Miguel, Sete Cidades, entre Várzea e Sete Cidades (no ponto mais alto), junto à estrada, 06.11.2006, 1 macho portador de anilha (K. T. Haataja, H. Palojärvi).

Comentário: parecem não haver registos anteriores nos Açores.

Periquito-de-colar *Psittacula krameri* (E)
(África e Sul da Ásia)

S. Miguel, Ponta Delgada, 02.04.2005, 2 inds. (C. Pereira); mesmo local, 07.08.2007, 2 inds. (D. M. Santos).

Comentário: esta espécie tem sido observada na zona de Ponta Delgada desde 2001 (Matias 2004), tendo-se tornado mais frequente (D.M. Santos *in litt.*), muito embora o reduzido número de registos divulgados não reflecta esta situação.

Verdilhão *Carduelis chloris* (C)
(Europa Continental)

Terceira, Angra do Heroísmo, 26.04.2005, 10-12 inds. (C. Pereira).

Comentário: existe pouca informação publicada sobre esta introdução antiga na região.

Pintassilgo *Carduelis carduelis* (C)
(Europa Continental)

Corvo, Ribeira da Ponte, 24-25.12.2005, 2 inds. (J.

Bried, E. Didner, P. A. Crochet).

Comentário: esta espécie está naturalizada em todas as ilhas dos Açores à excepção do Corvo; a sua ocorrência nesta ilha parece ser excepcional.

Bico-de-lacre *Estrilda astrild* (C)
(África Subsariana)

Terceira, Angra do Heroísmo, Cabo da Praia, 10.11.2006, 6 inds (K. T. Haataja, H. Palojärvi); Praia da Vitória, 10.11.2006, 3 inds (K. T. Haataja, H. Palojärvi); Paul da Praia, 26.12.2006, 21 inds. (J. Bried);

S. Miguel, Sete Cidades, Lagoa Azul, 06.11.2006, 4 inds. (K. T. Haataja, H. Palojärvi); Ginetes, 21.05.2005, 10 inds. (D. Kronbach); Ribeira Grande, Porto de Santa Iria, 05.08.2007, 3 inds. (D. M. Santos).

Comentário: registos que ilustram a permanência desta espécie no Arquipélago dos Açores.

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

Pato-do-mato *Cairina moschata* (E)
(América Central e do Sul)

Madeira, Funchal, foz da ribeira de S. João, 13.05.2007, 1 casal (R. Matias).

Comentário: nos últimos anos parece estar em expansão na Madeira, sendo provável que nidifique em liberdade; este registo isolado é apenas ilustrativo uma vez que a maioria das aves não é reportada.

Faisão-comum *Phasianus colchicus* (E*)
(Eurásia)

Madeira, Calheta, Paul da Serra, 29.04.2008, 2 machos (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg).

Comentário: o estatuto actual desta espécie na Ilha da Madeira é pouco claro. Sarmento (1936) refere que foram efectuadas repetidas introduções (mesmo durante o séc. XX), após a sua introdução (possivelmente no séc. XVI). Falta informação que permita determinar se as observações de indivíduos ocasionais se poderão referir a aves nascidas em estado selvagem, e se existe uma população auto-sustentável na ilha.

Periquito-de-colar *Psittacula krameri* (E)
(África e Sul da Ásia)

Madeira, Funchal, porto do Funchal, 09.06.2008, 2 inds. em voo (R. Matias, H. Alonso).

Comentário: mais uma observação desta espécie de estatuto indeterminado na região.

Mainá-indiano *Acridotheres tristis* (E)
(Sul e Centro da Ásia)

Madeira, Funchal, Machico, Caniçal, Quinta do Lorde, 11.06.2005, 2 inds. adultos (C. Fagundes, H. Caldeira, T. Pestana). Existem fotografias.

Comentário: trata-se do primeiro registo desta espécie, reputada de invasora, no arquipélago da Madeira. Alguns casais nidificam nas Ilhas Canárias, sem que a população apresente sinais de expansão (Clarke 2006).

Bico-de-lacre *Estrilda astrild* (C)
(África Subsariana)

Madeira, Machico, Ribeira de Machico, 28.08.2007, 250-300 inds. num bando (A. Sandberg *in BirdingMadeira*); Ponta do Sol, Lagoa do Lugar

de Baixo, 27.11.2007, vários inds. escutados (R. Guerreiro).

Comentário: as primeiras referências a esta espécie na Madeira são bastante antigas, sendo já mencionado por Forster (1777).

REFERÊNCIAS

- BirdingMadeira: <http://madeira.seawatching.net/>
- Clarke, T. 2006. *Birds of the Atlantic Islands*. Christopher Helm, London.
- Equipa Atlas (2008) Atlas das aves nidificantes em Portugal (1999-2005). Assírio & Alvim, Lisboa.
- Forster, J. G. A. 1777. *A Voyage round the World (in His Britannic Majesty's Sloop "Resolution", commanded by Captain James Cook, during the years 1772, 3, 4 and 5)*. London, 710 pp.
- Matias, R. 2002. *Aves Exóticas que Nidificam em Portugal Continental*. Instituto da Conservação da Natureza.
- Matias, R. 2003. Aves exóticas em Portugal: anos de 2000 e 2001. *Anuário Ornitológico* 1: 47-51.
- Matias, R. 2004. Aves exóticas em Portugal: ano de 2002. *Anuário Ornitológico* 2: 55-63.
- Matias, R. 2006a. Aves exóticas em Portugal: anos de 2003 e 2004. *Anuário Ornitológico* 3: 55-63.
- Matias, R. 2006b. A nidificação de aves exóticas em Portugal Continental. In: Rodrigues, L.; Reino, L., Gordinho, L.O.; Freitas, H. (Eds.). Actas do 1º Simpósio sobre Espécies Exóticas: Introduções, Causas e Consequências. Pp. 72-80. Liga para a Protecção da Natureza, Lisboa.
- Matias, R. 2008. Censos de Periquito-rabijunco *Psittacula krameri* no Jardim da Estrela, Lisboa. *Airo* 18: 24-28.
- Matias, R., P. Catry, H. Costa, G. Elias, J. Jara, C. C. Moore & R. Tomé 2007. Lista sistemática das aves de Portugal Continental. *Anuário Ornitológico* 5: 74-132.
- Petronilho, J. M. S., J. V. Vingada & J. Ferreira 2004. As aves exóticas na costa de Quaiaios-Mira (Beira Litoral, Portugal). *Airo* 14: 114-120.
- Sarmento, A. A. 1936. *As Aves do Arquipélago da Madeira*. Ed. autor, Funchal. 142 pp.