

Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal

Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2006 e 2007

João Jara, Helder Costa, Rafael Matias, C. C. Moore, Carlos Noivo & Ray Tipper

Este é o sexto relatório do Comité Português de Raridades sobre aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal, a ser publicado no Anuário Ornitológico editado pela SPEA.

O presente relatório inclui principalmente registos referentes aos anos de 2006 e 2007, o que significa que foi possível encurtar o tempo entre a ocorrência desses registos e a respectiva publicação, sendo objectivo do Comité que o próximo relatório seja publicado com um intervalo ainda menor (cerca de 12 meses) após o final do ano analisado; por essa razão, numerosos registos de 2008 estão já a ser avaliados. Este relatório inclui também diversos registos de anos anteriores, para os quais o Comité não tinha tomado uma decisão anteriormente; não obstante este facto, alguns registos de 2006 e de 2007, bem como de anos anteriores, ainda se encontram em fase de recolha de informação adicional ou de avaliação.

É para nós motivo de grande satisfação o facto de se verificar um claro incremento no número de registos submetidos ao Comité; em nossa opinião, este aumento não se deve a uma maior ocorrência de espécies raras ou accidentais em Portugal, mas antes e essencialmente a um maior interesse da parte dos observadores em reportar esses mesmos registos; neste sentido, é de salientar o aumento de registos recebidos especialmente dos arquipélagos dos Açores, da Madeira e das Selvagens, o que representa um esforço proporcionalmente maior de um número mais reduzido de observadores e que, sem dúvida, permitirá conhecer melhor o estatuto de numerosas espécies nestes arquipélagos, de forma a poder rever com maior segurança o respectivo estatuto como raridades.

Com o objectivo de obter um relatório o mais completo possível, o Comité implementou uma atitude mais dinâmica e proactiva relativamente aos registos de raridades; assim, registos publicados em revistas internacionais, forums on-line ou

no Noticiário Ornitológico, por exemplo, são pesquisados regularmente; caso sejam detectados registos interessantes e que não foram submetidos, o Comité tentará contactar os respectivos observadores ou, se tal não for possível, poderá avaliar esses registos com base na informação publicada. Não obstante este facto, solicitamos a todos os observadores que não tenham enviado as suas observações de espécies consideradas raras ou accidentais, que o façam, uma vez que esta é, sem dúvida, a forma mais eficaz de garantir que o maior número possível de registos é analisado e de que a respectiva informação está correcta. Relativamente ao procedimento do Comité, este mantém-se idêntico ao descrito no último relatório, isto é: cada registo é analisado e votado por pelo menos cinco dos seis membros, sendo necessária unanimidade para que um registo seja homologado. A escolha dos cinco membros que analisam cada registo é efectuada arbitrariamente, com uma excepção: quando um dos observadores de um dado registo é um dos membros do Comité, esse membro não pode votar nesse registo.

A confirmação de recepção de cada um dos registos recebidos é efectuada no espaço de tempo mais curto possível, o que constitui uma prioridade fundamental para o Comité, nem sempre implementada no passado.

As decisões relativamente a cada registo submetido são publicadas nos relatórios publicados anualmente.

A análise do relatório em baixo apresentado revela um impressionante número de primeiros registos homologados quer para Portugal no seu conjunto, quer para cada uma das regiões separadamente.

Em 2006, foram registadas no continente duas novas espécies para Portugal: a Gaivota do Cáspio *Larus cachinnans* e o Rabirruivo-mourisco *Phoenicurus moussieri*; em 2007, foi homologado

o primeiro registo de Felosa-assobiadeira *Phylloscopus sibilatrix* no continente, nove dias antes da ocorrência de uma ave da mesma espécie no arquipélago das Selvagens.

Dos Açores, vieram os primeiros registos homologados para Portugal de três espécies: um Socó-mirím *Butorides virescens* em 2006 e um Socoi-vermelho *Ixobrychus exilis* e um Olho-dourado *Bucephala clangula* em 2007. Na Madeira, em 2007, foi efectuado o primeiro registo homologado para Portugal de Franga-d'água-americana *Porzana carolina*. Outros registos de grande importância ornitológica publicados neste relatório, todos efectuados na ilha do Corvo, Açores, no extraordinário Outono de 2005, envolveram seis espécies com registos homologados pela primeira vez em Portugal: Petinha-fulva *Anthus rubescens*, Juruviara-d'olho-branco *Vireo griseus*, Mariquita do Tennessee *Vermivora peregrina*, Sanhaço-d'asa-preta *Piranga olivacea*, Tico-tico-coroado *Zonotrichia leucophrys* e Mariposa-azul *Passerina cyanea*. A nível regional, houve 69 espécies com registos homologados pela primeira vez: 7 para o Continente, 26 para os Açores, 23 para a Madeira e 13 para as Selvagens.

O registo de um Grifo-africano *Gyps africanus* fotografado no Cabo de São Vicente, Vila do Bispo, Faro, em Outubro de 2006, constitui uma das observações mais interessantes publicadas neste relatório. Este registo, potencialmente o primeiro para o Paleártico Ocidental, foi, por uma questão de precaução, aceite na categoria D, uma vez que não é conhecida a proveniência da ave; considerando o registo recente de uma ave imatura desta espécie em Tarifa, Cádiz, Espanha, no Outono de 2008 (www.rarebirds.net), o registo do Cabo de São Vicente será mantido sob avaliação, aguardando a possibilidade de se vir a comprovar um padrão de ocorrência semelhante ao verificado no caso do Grifo-pedrês *Gyps rueppellii*.

O facto de alguns registos acima mencionados constituírem primeiros registos homologados a nível nacional ou regional, poderá surpreender alguns observadores conhecedores da avifauna de Portugal. Por esta razão, o Comité pretende uma vez mais encorajar o envio de registos, uma

vez que não é possível considerar registos a que o Comité não teve acesso.

Com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2009, os registos no continente de Gaivota-de-bico-fino *Larus genei* deixam de carecer de homologação pelo Comité. De facto e não obstante os registos desta espécie se concentrarem essencialmente na faixa costeira do Este do Algarve, o número durante os últimos anos de registos homologados e de aves envolvidas, levou a que o Comité decidisse pela remoção desta espécie da lista de espécies sujeitas a homologação. Aproveitamos para pedir a todos os observadores que continuem a enviar os seus registos desta espécie para o Noticiário Ornitológico, uma vez que não existem registos conhecidos desta gaivota para a maior parte do território nacional, sendo essa a única forma de conhecer um eventual padrão de ocupação de novas áreas geográficas.

Agradecimentos: O Comité agradece a todos os observadores e fotógrafos que enviaram os seus registos para apreciação e sem os quais este relatório não seria possível. Pretendemos também agradecer a Killian Mullarney e a Philippe Dubois, pela colaboração como consultores relativamente a aspectos específicos de identificação.

Rare birds in Portugal

Portuguese Rarities Committee Report for 2006 and 2007

João Jara, Helder Costa, Rafael Matias, C. C. Moore, Carlos Noivo & Ray Tipper

This is the sixth report of the Portuguese Rarities Committee to be published in the Anuário Ornitológico (Annual Bird Report) of SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. It deals with the occurrence of rare birds in Portugal in both 2006 and 2007 and thus brings reporting up-to-date. There are, of course, records for these years and, indeed, prior years that remain under review, but significant progress has been made with clearing the backlog and the PRC is committed to publishing its rare bird report on a timely basis and to this end many 2008 records are already being reviewed.

It is most satisfying to be able to report on the steep rise in records submitted to the Committee which, there can be little doubt, is a result of a greater willingness by observers to report sightings rather than a real increase in the occurrence of rarities. Of particular significance is the increased volume of rarity reports received for the Azores, Madeira and Selvage and the PRC is most appreciative of the effort made by the comparatively few observers upon whom the burden of submitting by far the major percentage of records falls. Their diligence provides a more complete picture of the avifauna of these islands and will be invaluable in future reviews of the rarity status of certain species. In an effort to ensure this annual rarities report is as complete as possible, the PRC has taken a much more dynamic approach to rarity records. Foreign journals, SPEA's own email bulletin Noticiário Ornitológico and website forums are now regularly searched for news of sightings and in the event of a formal report failing to be submitted, the Committee makes every effort to contact the observer(s) with encouragement to provide information. This approach has met with a great deal of co-operation and, therefore, success. The assessment procedure remains unchanged. All records are reviewed by five of the six members of the Committee and acceptance requires a unanimous decision. The five members dealing with any one record are chosen arbitrarily, the only exceptions being in

instances where a committee member is the reporting observer, or one of them, in which event he is excluded from the assessment process. All records submitted are acknowledged in writing as soon as possible following receipt, a vital courtesy to observers that has not always been in place. Decisions are communicated by way of this report.

*Scrutiny of the systematic lists that follow reveals an impressive number of first fully documented records both for Portugal as a whole and for the individual recording regions. In 2006 two new species for Portugal were identified: a Caspian Gull *Larus cachinnans* and a Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri*; in 2007, the mainland produced the first fully documented record of Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix*, just nine days prior to one being found on the Salvage Islands. The Azores hosted the first fully documented records for Portugal of three species: a Green Heron *Butorides virescens* in 2006 and a Least Bittern *Ixobrychus exilis* and a Common Goldeneye *Bucephala clangula* in 2007. A Sora *Porzana carolina* on Madeira in 2007, was the first fully documented record for Portugal. Other records of significance appearing in this report, all from the island of Corvo in the Azores, in an extraordinary Autumn in 2005, involve six species fully documented for the first time in Portugal; Buff-bellied Pipit *Anthus rubescens*, White-eyed Vireo *Vireo griseus*, Tennessee Warbler *Vermivora peregrina*, Scarlet Tanager *Piranga olivacea*, White-crowned Sparrow *Zonotrichia leucophrys* and Indigo Bunting *Passerina cyanea*. On a regional basis, there were first fully documented records of no less than 69 species: 7 for the mainland, 26 for the Azores, 23 for Madeira and 13 for the Salvage Islands.*

*A particularly intriguing record is that of the African White-backed Vulture *Gyps africanus**

*photographed at Cape St. Vincent, Vila do Bispo, Faro, in October 2006. Potentially a first for the Western Palearctic, the PRC had no difficulty in accepting the identification, but prudence demanded caution regarding its provenance and the record has been assigned to Category D. With a report of an immature at Tarifa, Cádiz, Spain in the autumn of 2008 (www.rarebirdspain.net), the Algarve record will be kept under review awaiting a pattern of records to develop as has occurred with its congener, Rüppell's Griffon Vulture *G. rueppellii*.*

That some of these records constitute national or regional firsts may well be met with surprise by observers with experience of Portugal's avifauna, so it is worth emphasising that the PRC has taken the view that it cannot acknowledge earlier records unless they can be substantiated, have been published, and are, therefore, in the public domain.

*For the future, with effect from 1st January 2009, Slender-billed Gull *L. genei* has been removed from the list of species for the mainland that is considered by the PRC. The frequency with which this species*

now occurs in Portugal, albeit almost exclusively in coastal Eastern Algarve, with feeding flocks having substantially exceeded 100 on occasions on the Salinas do Cerro do Bufo, Castro Marim Nature Reserve, Faro, has led to its removal. The PRC is aware that because of its regularity at, in particular, the Salinas do Cerro do Bufo and the Salinas de Tavira, Faro, observers often failed to submit their records of the species. It is to be hoped that, released from the obligation to produce a written description or photograph, they will now be more forthcoming by submitting future records to Noticiário Ornitológico as Slender-billed Gull remains unrecorded in the majority of mainland Portugal and it is important that its anticipated spread is accurately recorded.

Acknowledgements: *The Committee wishes to thank all observers and photographers who sent in details of rarities to the PRC, without whose input, this report could not exist. We should also like to express our gratitude to Killian Mullarney and Philippe Dubois, whose expert opinion was sought and freely given in relation to a number of difficult records.*

LISTA SISTEMÁTICA DOS REGISTOS HOMOLOGADOS

A apresentação dos dados obedece às seguintes normas e critérios:

- A informação é apresentada separadamente para cada uma das quatro regiões consideradas: Portugal Continental, Açores, Madeira e Selvagens. Este formato já foi utilizado nos últimos relatórios e tem como objectivo facilitar a pesquisa de informação sobre cada região.
- Para cada espécie apresenta-se o número total de registos homologados pelo Comité Ibérico de Raridades e pelo Comité Português de Raridades anteriores à publicação deste relatório e o número de registos agora publicados. Assim, a indicação (7, 6) que é dada para os registos de Cisne-mudo em Portugal Continental, indica que já existiam 7 registos homologados e que agora foram homologados 6 novos

registos, resultando num total de 13 registos para esta região geográfica.

- Apresenta-se informação resumida sobre a área de distribuição de cada uma das espécies tratadas.
- Neste relatório, a taxonomia, nomenclatura e sequência de espécies seguidas são as propostas pela AERC, aliás igualmente adoptadas pelo CPR na lista para Portugal Continental publicada no Anuário n.º 5, onde se explicam melhor estas opções (ver Matias *et al.* 2007).
- Apenas são publicados dados considerados seguros. No caso de alguns géneros para os quais existem grandes dificuldades de identificação, no campo ou na mão (por exemplo *Limnodromus* sp. ou *Pterodroma* sp.) e em que todas as espécies desse género

são sujeitas a homologação, aceitam-se também registos indeterminados a nível específico.

- Para cada observação indica-se sucessivamente:
 1. o distrito ou, no caso das observações de aves marinhas, a Zona Económica Exclusiva (ZEE); no caso das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e do arquipélago das Selvagens, indica-se a ilha em vez do distrito;
 2. o concelho (no caso das regiões autónomas esta indicação só é incluída quando relevante);
 3. o local da observação e, quando necessário, a localidade mais próxima;
 4. número de indivíduos e, quando possível, outras informações, nomeadamente,

idade, sexo, se a ave foi capturada, anilhada, abatida, etc.; quando não se refere o número de indivíduos, o registo envolveu uma única ave;

5. data da observação;
6. observadores;
7. referência à existência de fotografias ou outro tipo de registo de imagens ou de som.

- Sempre que tal se justifique, são apresentados comentários adicionais sobre os registos.

Os dados apresentados são propriedade dos respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia, por exemplo: “... adulto, aparentemente fêmea, observado em Benavente, em 18 de Março de 2006 (C. C. Moore *in* Jara *et al.* 2008)”.

PORTUGAL CONTINENTAL

Cisne-mudo

Cygnus olor (7, 6)

(Holárctico, em latitudes temperadas)

2006-Santarém, Benavente, adulto, aparentemente fêmea, 18 de Março (C. C. Moore).

2006-Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, adulto, 6 de Setembro a 30 de Dezembro (R. Marcão, R. Tomé e outros). Existe fotografia.

2007-Faro, Parque Ambiental de Vilamoura, adulto, 29 de Julho (J. Hardacre).

2007-Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, adulto, 31 de Julho (J. Hardacre).

2007-Setúbal, Sesimbra, Lagoa Pequena, Lagoa de Albufeira, adulto, 19 de Maio (J. Rodrigues, J. Côxo). Existem fotografias.

2007-Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, adulto, 8 de Outubro (H. Costa). Existe fotografia.

2007-Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, adulto, 11 de Dezembro (A. Leitão).

2007-Setúbal, Sapal de Corroios, adulto, 28 de Dezembro (M. Stevens).

Comentário: a origem das aves envolvidas nas observações efectuadas não pode ser estabelecida com

segurança, sendo possível que a maior parte delas, senão mesmo todas, sejam oriundas de fugas de cativoiro; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente aves de outros registos anteriores.

Ganso do Canadá

Branta canadensis (3, 1)

(América do Norte, introduzido na região Paleárctica Ocidental)

2007-Santarém, Abrantes, Rossio a Sul do Tejo, adulto de subespécie desconhecida, 13 de Março (R. Marcão). Existem fotografias.

Comentário: a origem dos gansos do Canadá observados em Portugal é incerta, sendo provável que a maior parte seja proveniente de fugas de cativoiro.

Ganso-marisco

Branta leucopsis (7, 1)

(Gronelândia, Svalbard e Nova Zembla)

2007-Santarém, Salvaterra de Magos, Escaropim, rio Tejo, 1 ind., 27 de Maio (J. Jara, Faisca e outros). Existem fotografias.

Comentário: todos os registos aceites, com excepção deste e de um outro, foram efectuados no período de

Outono ou de Inverno; a data deste registo pode pois considerar-se atípica, sugerindo que a ave envolvida possa ser proveniente de uma fuga de cativo.

Ganso-de-faces-pretas

Branta bernicla (6, 3)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2006-Faro, Portimão, Morgado do Reguengo, 1 ind. da subespécie *B. b. brota*, provavelmente de 2º calendário, 22 de Junho (N. Fonseca). Existem fotografias.

2006-Leiria, Óbidos, Lagoa de Óbidos, 12 inds., dos quais 1 da subespécie *B. b. brota* e 11 da subespécie *B. b. bernicla*, 11 de Fevereiro (R. Matias, N. Pereira, S. Pereira).

2006-Leiria, Óbidos, Lagoa de Óbidos, 14 inds., 18 de Fevereiro (P. Fernandes).

2006-Leiria, Óbidos, Lagoa de Óbidos, 3 inds., dos quais 1 da subespécie *B. b. brota* e 2 da subespécie *B. b. bernicla*, 2 de Março (A. Leitão e outros).

Comentário: *o aparecimento de um pequeno bando destes gansos na Lagoa de Óbidos foi aparentemente um caso isolado, não tendo sido recebidos registos de outras zonas, o que provavelmente teria acontecido se tivesse ocorrido um influxo invulgar de aves no Inverno de 2005–2006. No lote de observações homologadas, salienta-se o facto de haver pelo menos duas aves da subespécie *B. b. brota* envolvidas; o registo efectuado no Morgado do Reguengo merece também destaque pela data precoce em que teve lugar; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Pato-casarca

Tadorna ferruginea (19, 6)

(Ásia Central e Ocidental, Sudeste da Europa e Noroeste de África)

2007-Coimbra, Figueira da Foz, Arrozaís da Quinta do Canal, 1 ind., 1 de Março (D. Rodrigues). Existe fotografia.

2007-Leiria, Óbidos, Lagoa de Óbidos, 1 ind., 24 de Março (H. Cardoso, C. Magalhães e outros). Existe fotografia.

2007-Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, macho e fêmea adultos, 23 de Junho a 2 de Setembro (J. Jara, C. Noivo, A. Palavra, C. C. Moore e outros). Existem fotografias.

2007-Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da

Giganta, 1 ind. provavelmente adulto, 21 de Agosto (A. Leitão, C. Pereira, P. Fernandes). Existem fotografias.

2007-Setúbal, Alcácer do Sal, Salinas da Batalha, adulto, 18 de Março (J. Jara). Existem fotografias.

2007-Setúbal, Outão, provavelmente fêmea, 19 de Março (J. Barbosa). Existem fotografias.

2007-Setúbal, Alcácer do Sal, Albufeira do Pego do Altar, 2 inds., 1 de Dezembro (P. Marques). Existe fotografia.

Comentário: *a origem dos patos-casarcas observados em Portugal é sempre difícil de estabelecer e raramente se pode excluir a hipótese de que as aves sejam oriundas de cativo; no entanto, em 2007, quatro dos registos homologados foram obtidos no mês de Março em localidades diferentes; este facto sugere que possa ter ocorrido um influxo de aves nesse mês, o que faz pensar que, pelo menos essas aves, possam ter origem selvagem; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Piadeira-americana

Anas americana (4, 1)

(América do Norte)

2007-Aveiro, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, macho adulto em plumagem nupcial, 16 de Dezembro (D. Rodrigues). Existe fotografia.

Comentário: *a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto continua a ser o local que congrega o maior número de registos desta espécie em Portugal Continental; de facto, quatro dos cinco registos aceites ocorreram nesse local.*



Piadeira-americana, macho adulto em plumagem nupcial, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, Aveiro, Dezembro de 2007 (D. Rodrigues)

Marrequinha-americana*Anas carolinensis* (7, 2)

(América do Norte)

2006-Aveiro, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, macho adulto em plumagem nupcial, 20 de Novembro e 3 de Dezembro (D. Rodrigues). Existem fotografias.

2007-Aveiro, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, macho adulto em plumagem nupcial, 2 a 4 de Março (D. Rodrigues). Existe fotografia.

2007-Lisboa, Vila Franca de Xira, Tanques da Saragoça, macho adulto em plumagem nupcial, 24 de Novembro (J. Jara).

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*



Marrequinha-americana, macho adulto em plumagem nupcial, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, Março de 2007 (D. Rodrigues)

Pardilheira*Marmaronetta angustirostris* (3, 4)

(Sul de Espanha, Norte de África, Médio Oriente, região Ocidental da China)

2006-Santarém, Benavente, Salinas de Vazasacos, 3 inds., 28 de Outubro (J. Jara). Existem fotografias.

2007-Évora, Montemor-o-Novo, Albufeira do Poço da Rua, 2 inds., 5 de Setembro (M. Caetano, P. Pereira, E. Gomes). Existem fotografias.

2007-Lisboa, Vila Franca de Xira, Tanques da Saragoça, 1 ind., 28 de Agosto (C. C. Moore). Existem fotografias.

2007-Santarém, Benavente, Salinas de Vaza-

sacos, 3 inds., 11 de Março (J. Jara). Existem fotografias.

2007-Setúbal, Alcochete, lagoas junto das Salinas da Ribeira das Enguias, 2 inds. nos dias 19 e 20 de Maio, 1 ind. no dia 26 de Maio (J. Jara, D. Hurst e outros). Existe fotografia.

Comentário: *o número de registos efectuados em 2007 pode considerar-se invulgar; com efeito, nunca o Comité recebeu e homologou tantas observações desta espécie; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Caturro*Aythya collaris* (12, 2)

(América do Norte)

2003-Faro, Silves, Salgados de Pêra, 1 ind., 27 de Dezembro (M. Mendes, J. Ministro).

2006-Beja, Castro Verde, Barragem da Apariça, 1 macho adulto e 2 fêmeas, 13 a 15 de Março (P. Leitão, R. Morgado, L. Reino). Existem fotografias.

Comentário: *de todos os anatídeos de origem neártica, esta espécie é aquela com maior número de registos aceites pelo Comité para Portugal Continental.*

Êider*Somateria mollissima* (2, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

1993/1994-Faro, Portimão, Ria de Alvor, macho de 1º Inverno, 26 de Novembro de 1993 a 18 de Março de 1994 (C. Jackson).

Comentário: *durante a vigência do Comité Ibérico de Raridades (1989-1994), a espécie não necessitava de homologação; este registo foi publicado já há alguns anos (Jackson 1994), tendo agora sido analisado e validado.*

Pato-rabilongo*Clangula hyemalis* (8, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, fêmea provavelmente de 1º Inverno, 23 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor, R. Tipper, G. Schreier). Existem fotografias.

Comentário: *este registo envolveu presumivelmente a mesma ave observada várias vezes por diversos observadores na mesma área, pelo menos até ao final de Fevereiro do ano seguinte; estes registos de 2008 ainda estão em fase de avaliação.*

Negrola-d'asa-branca*Melanitta fusca* (3, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

2007-Viana do Castelo, Esposende, Estuário do Rio Cávado, 2 inds. provavelmente fêmeas ou imaturos, 17 de Dezembro (A. Leitão, P. Rodrigues).**Comentário:** nas circunstâncias deste registo e com base nos critérios de identificação actuais, não é possível, com excepção do caso dos machos adultos, separar os taxon *M. f. fusca* e *M. f. deglandi*.**Pato-rabo-alçado-americano***Oxyura jamaicensis* (5, 2)

(América, introduzido no Reino Unido)

2003-Beja, Viana do Alentejo, Alcáçovas, macho adulto em plumagem nupcial, em data exacta desconhecida (H. Caetano). Existem fotografias.**2007-Beja**, Viana do Alentejo, Alcáçovas, macho adulto em plumagem nupcial, 11 de Abril (J. Viana, Faísca). Existem fotografias.**2007-Évora**, Montemor-o-Novo, Albufeira do Poço da Rua, macho adulto em plumagem nupcial, 22 de Junho (M. Caetano, L. Guilherme, B. Pacheco). Existe fotografia.**Comentário:** um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.**Mobelha-pequena***Gavia stellata* (10, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

2006-Faro, Praia de Faro, 1 ind. aparentemente adulto, 29 de Dezembro (G. Schreier). Existe fotografia.**Comentário:** esta observação enquadra-se no padrão dos registos anteriores, que se concentram nos meses de Dezembro e Janeiro.**Mergulhão-de-penachos***Podiceps auritus* (1, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

2006-Leiria, Óbidos, Lagoa de Óbidos, 1 ind. em plumagem de Inverno, provavelmente adulto, de 7 de Janeiro a 11 de Fevereiro (H. Cardoso, R. Matias, N. Pereira, S. Pereira e outros).**Comentário:** este é o segundo registo homologado para o espaço geográfico português, sendo que o primeiro teve lugar na foz do estuário do Minho, em zona internacional, em 1993 (F. J. Arcas et al. in De

Juana 1995).

Alma-negra*Bulweria bulwerii* (26, 11)

(Oceano Atlântico e Oceano Pacífico em latitudes tropicais e subtropicais; ilhas da Macaronésia no Atlântico Oriental)

2004-ZEE, 38-30-15 N, 13-28-89 W (cerca de 187 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-31-52 N, 13-26-41 W (cerca de 185 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-31-51 N, 13-19-32 W (cerca de 179 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-32-14 N, 13-04-38 W (cerca de 168 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-36-04 N, 12-37-50 W (cerca de 146 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-39-56 N, 12-13-57 W (cerca de 128 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-40-16 N, 12-07-04 W (cerca de 123 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-40-00 N, 11-59-64 W (cerca de 117 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2004-ZEE**, 38-39-45 N, 11-51-89 W (cerca de 111 milhas a oeste de Portugal Continental), 1 ind., 13 de Agosto (J. Tavares, F. Abreu).**2006-ZEE**, cerca de 5 milhas a oeste do Cabo Espichel, 1 ind., 6 de Abril (A. Leitão, A. Luis).**2006-ZEE**, cerca de 6 milhas a oeste do Cabo da Roca, 1 ind., 29 de Abril (A. Leitão).**Comentário:** foram recebidos e homologados vários registos efectuados em Agosto na ZEE, que confirmam o padrão de ocorrência pós-nupcial já conhecido nas águas continentais; particularmente interessantes são os registos efectuados em Abril de 2006, que parecem indicar uma utilização das nossas águas territoriais também no período pré-nupcial.**Pelicano-branco***Pelecanus onocrotalus* (4, 4)

(Sudeste da Europa, Ásia, África)

2006-Portalegre, Albufeira do Caia, imaturo, 10

e 11 de Julho (L. Venâncio, J. Almeida) Existe fotografia.

2006-Setúbal, Palmela/Setúbal, Arrozaís da Gâmbia, 1 ind., provavelmente imaturo, 30 de Dezembro (J. Jara). Existem fotografias.

2007-Aveiro, Estarreja, Salreu, provavelmente adulto, 14 de Março (J. Neto).

2007-Aveiro, Estarreja, Salreu, adulto, 13 de Maio (M. Romão). Existe fotografia.

2007-Coimbra, Figueira da Foz, Ilha da Murraceira, adulto, 20 de Janeiro (R. Lopes). Existe fotografia.

Comentário: a origem dos pelicanos observados em Portugal permanece incerta; por um lado, não se pode afastar a possibilidade de haver aves de origem selvagem; por outro lado, a existência de vários parques zoológicos onde são mantidas aves em condições por vezes precárias, pode dar origem a fugas de cativoiro; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.



Pelicano-branco, adulto, Ilha da Murraceira, Figueira da Foz, Janeiro de 2007 (R. Lopes)

Pelicano-cinzento

Pelecanus rufescens (0, 1)

(África subsariana)

2001-Coimbra, Figueira da Foz, Estuário do Mondego, 1 ind., 23 de Outubro (J. Petronilho, A. Marques). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo desta espécie

efectuado em Portugal; tal como acontece com as outras espécies de pelicanos observados na Europa fora das suas áreas normais de ocorrência, a origem desta ave é incerta; a probabilidade de ser originária de cativoiro parece ser elevada.



Pelicano-cinzento, estuário do Mondego, Figueira da Foz, Outubro de 2001 (J. Petronilho)

Flamingo-pequeno

Phoenicopterus minor (4, 2)

(África subsariana)

2007-Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, adulto, 23 e 27 de Março (P. Dedicoat, J. Taylor, J. Viana e outros). Existe fotografia.

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, adulto, 1 de Julho a 28 de Agosto (P. Dedicoat, J. Taylor, J. Jara). Existem fotografias.

Comentário: a ave observada na Lagoa dos Salgados encontrava-se anilhada, o que poderá sugerir tratar-se de um indivíduo escapado de cativoiro.

Águia-malhada

Aquila clanga (8, 1)

(Leste da Europa, Ásia Central e Setentrional)

2003-Santarém, Benavente, Pancas, 1 ind. de 2º ou 3º calendário, 2 de Fevereiro (C. C. Moore). Existem fotografias.

Comentário: a zona de Pancas foi utilizada com alguma regularidade por esta espécie desde 1998, até pelo menos 2004.

Grifo-pedrês

Gyps rueppellii (8, 1)

(África subsariana)

2005-Beja, perto de Mértola, imaturo, 31 de Outubro a 2 de Novembro (C. C. Moore, P. Holt).

2006-Castelo Branco/Portalegre, Vila Velha de Ródão/Nisa, Portas de Ródão, 1 ind., 2 de Abril

(A. Leitão, C. Pacheco, D. Querido).

2007-Castelo Branco/Portalegre, Vila Velha de Ródão/Nisa, Portas de Ródão, provavelmente adulto, 18 de Março (J. Muchaxo). Existem fotografias.

Comentário: os dois registos das Portas de Ródão não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente a mesma ave de outros registos anteriores já publicados; é de referir que presumivelmente a mesma ave envolvida nos registos das Portas de Ródão foi por diversas vezes filmada por uma câmara de vídeo instalada junto a um ninho existente na colónia de grifos aí localizada.



Grifo-pedrês, provavelmente adulto, Portas de Ródão, Vila Velha de Ródão, Março de 2007 (J. Muchaxo)

Grifo-africano

Gyps africanus (0, 1)
(África subsariana)

2006-Faro, Vila do Bispo, Cabo de São Vicente, 1 ind., 14 de Outubro (B. Small). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo desta espécie para a Europa, permanecendo incerta a origem desta ave; se por um lado não se pode afastar a hipótese de se tratar de um indivíduo proveniente de cativeiro, também não é possível garantir que não se trate de uma ave selvagem que se tenha associado a um bando de grifos em deslocação de África para a Península Ibérica.



Grifo-africano, Cabo de São Vicente, Vila do Bispo, Outubro de 2006 (B. Small)

Galeirão-de-crista

Fulica cristata (15, 4)

(Mediterrâneo Ocidental e África subsariana)

2006-Faro, Castro Marim, lagoas junto ao Sapal de Venta Moinhos, adulto, 3 de Março e 19 de Abril (C. C. Moore, D. Hurst, R. Hurst, P. Holt).

2006-Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 1 ind., 6 de Janeiro (C. C. Moore).

2006-Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 2 inds., 4 de Novembro (C. C. Moore).

2007-Faro, Castro Marim, Tanque de Altura, adulto, 1 de Julho a 16 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor, J. Jara, R. Tipper e outros). Existem fotografias.

Comentário: a Lagoa de Santo André continua a constituir um local onde esta espécie é observada com alguma regularidade, nomeadamente nos meses de Inverno.

Tarambola-dourada-siberiana

Pluvialis fulva (1, 1)

(Sibéria e Alasca Ocidental)

2007-Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, provavelmente macho de 2º ou 3º calendário, 22 de Julho (G. Schreier, R. Eufrásia). Existem fotografias.

Comentário: este é o segundo registo homologado para Portugal Continental; o primeiro registo, de uma ave provavelmente de 3º calendário, foi efectuado em Agosto de 2005, na área do estuário do Tejo (C. C. Moore et al. in Jara et al. 2007).

Batuirçu

Pluvialis dominica (7, 1)
(América do Norte)

2006-Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, juvenil, 30 de Setembro (M. Mendes). Existem fotografias.

Comentário: este registo insere-se no padrão habitual dos registos anteriores, tendo sido efectuado no período de migração pós-nupcial.

Pilrito-de-bico-fino

Calidris bairdii (0, 1)
(Sibéria Oriental e Canadá em latitudes boreais)

2004-Faro, Ludo, provavelmente juvenil/1º Inverno, 14 de Dezembro (R. Kelsh).

Comentário: este é o primeiro registo desta espécie em Portugal Continental; o padrão habitual de ocorrência da espécie na Europa Ocidental corresponde ao final do Verão e ao início do Outono.

Pilrito-de-colete

Calidris melanotos (17, 1)
(Nordeste da Sibéria e América do Norte Setentrional)

2007-Faro, Salinas do Ludo, provavelmente adulto, 7 de Setembro (G. Silva, J. Neiva, J. Tavares). Existe fotografia.

Comentário: tal como na generalidade da Europa, esta espécie continua a ser uma das limícolas neárticas com maior número de registos em Portugal Continental.

Pilrito-acuminado

Calidris acuminata (0, 1)
(Sibéria Oriental em latitudes boreais)

2007-Aveiro, Ria de Aveiro, Cais do Bico, adulto em muda para plumagem de Verão, 21 de Março (P. Hottola). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo desta espécie em Portugal Continental; trata-se de uma espécie de ocorrência muito rara na Europa Ocidental; de salientar a data atípica do registo, uma vez que, por exemplo na Grã Bretanha, apenas dois dos 28 registos que ocorreram até ao final de 2007 não foram efectuados no período entre Julho e Outubro, tendo ocorrido um no mês de Janeiro e o outro no mês de Abril (Hudson 2008).



Pilrito-acuminado, adulto em muda para plumagem de Verão (à esquerda), Cais do Bico, Ria de Aveiro, Março de 2007 (P. Hottola)

Pilrito-acanelado

Tryngites subruficollis (6, 1)
(América do Norte)

2004-Faro, Vila do Bispo, Sagres, juvenil, 6 de Setembro (P. Pinto). Existem fotografias.

Comentário: este registo insere-se no padrão habitual dos registos anteriores, tendo sido efectuado no período de migração pós-nupcial.

Maçarico-de-bico-comprido

Limnodromus scolopaceus (3, 1)
(América do Norte e Sibéria, em latitudes boreais)

2007-Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 1 ind. provavelmente de 1º Verão em muda para plumagem de Inverno, 30 e 31 de Agosto (J. Santos, J. Viana, Faisca). Existem fotografias.

Comentário: tal como neste caso, todos os registos aceites anteriormente ocorreram no período pós-nupcial; este registo é, no entanto, aquele cuja data é mais precoce.



Maçarico-de-bico-comprido, provavelmente de 1º Verão em muda para plumagem de Inverno, Arrozaís da Giganta, Vila Franca de Xira, Agosto de 2007 (J. Viana)

Perna-verde-fino*Tringa stagnatilis* (11, 2)

(Região Ocidental da Rússia, Sibéria Central e Oriental)

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, adulto em plumagem de Inverno, 18 de Agosto (J. Jara).**2007-Faro**, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, provavelmente adulto, 27 de Agosto (R. Tipper, J. Jara).**2007-Faro**, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, provavelmente adulto, 9 de Setembro (P. Catry).**Comentário:** *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.***Perna-amarela-pequeno***Tringa flavipes* (13, 1)

(América do Norte)

2004-Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 24 de Novembro (J. Santos).**2006-Setúbal**, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, juvenil em muda para plumagem de 1º Inverno, 30 de Outubro e 4 de Novembro (C. C. Moore).**Comentário:** *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior já publicado (J. Winsper et al. in Elias et al. 2006).***Pisa-n'água***Phalaropus tricolor* (3, 1)

(América do Norte)

2007-Faro, Portimão, Ria de Alvor, 1 ind. de 1º Inverno, 21 de Setembro (C. Key). Existe fotografia.**Comentário:** *este é o quarto registo aceite, sendo o segundo efectuado no período de migração pós-nupcial; os restantes dois registos aceites foram efectuados na Primavera.*

Pisa-n'água, 1º Inverno, Ria de Alvor, Portimão, Setembro de 2007 (C. Key)

Falaropo-de-bico-fino*Phalaropus lobatus* (2, 5)

(Holártico)

2006-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, adulto em muda para plumagem de Verão, 10 de Junho (C. C. Moore).**2006-Faro**, Castro Marim, Salinas de Venta Moinhos, imaturo, 20 a 31 de Agosto (A. Leitão, R. Belo, J. Jara). Existem fotografias.**2007-Évora**, Montemor-o-Novo, Albufeira do Poço da Rua, juvenil/1º Inverno, 5 de Setembro (M. Caetano, P. Pereira, E. Gomes). Existem fotografias.**2007-Faro**, Castro Marim, Salinas de Castro Marim, adulto em muda para plumagem de Inverno, 8 a 17 de Agosto (S. Wates, J. Jara, R. Tipper). Existem fotografias.**2007-Lisboa**, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 2 inds. de 1º calendário, 2 de Setembro (C. C. Moore, J. Jara). Existem fotografias.**Comentário:** *o relativo baixo número de registos aprovados, deve-se ao facto de esta espécie não ter estado incluída na lista de espécies com registos sujeitos a homologação para Portugal Continental, até recentemente.***Moleiro-rabilongo***Stercorarius longicaudus* (21, 4)

(Holártico, em latitudes boreais)

2005-Leiria, Peniche, Cabo Carvoeiro e Papoa, juvenil, 22 de Outubro (C. C. Moore, H. Cardoso, C. Almeida).**2006-Lisboa**, Mafra, Ericeira, juvenil, 29 de Setembro (C. C. Moore).**2006-Lisboa**, Cascais, Cabo Raso, 4 juvenis, 20 de Outubro (C. C. Moore, M. Armelin, A. Leitão).**2006-Lisboa**, Cascais, Cabo Raso, 2 adultos, 20 de

Outubro (A. Leitão, M. Armelin).

Comentário: *estes registos inserem-se no padrão dos registos na costa ocidental portuguesa anteriores, envolvendo uma maioria de aves juvenis, desde o final de Agosto até o final de Outubro.*

Gaivota de Sabine

Larus sabini (17, 3)

(Ásia e América do Norte, em regiões circumpolares)

2006-ZEE, cerca de 5 milhas a noroeste do Cabo de São Vicente, 2 adultos, 19 de Abril (A. Leitão).

2006-ZEE, entre 10 e 25 milhas a oeste de Esposende, 8 inds., dos quais 5 juvenis e 3 adultos, 28 de Outubro (A. Leitão).

2006-ZEE, a cerca de 20 milhas ao largo da Murtosa, 4 juvenis, 30 de Outubro (A. Leitão).

Gaivota-de-bico-fino

Larus genei (21, 16)

(Europa Meridional e Oriental, África Ocidental, Médio Oriente, Ásia)

2006-Faro, Castro Marim, Esteiro da Carrasqueira, adulto, 3 de Março (C. C. Moore).

2006-Faro, Castro Marim, Salinas de Castro Marim, 9 adultos, 19 de Abril (C. C. Moore, M. Mekela, S. Jarnafeldt).

2006-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, 24 adultos e 1 ind. de 1º Verão, 20 de Maio (C. C. Moore).

2006-Faro, Castro Marim, adulto, 17 de Junho (M. Pimentel). Existe fotografia.

2006-Faro, Tavira, salinas junto ao Mercado de Tavira, 2 adultos, 1 de Agosto (M. Piazzi). Existe fotografia.

2006-Faro, Castro Marim, Salinas de Castro Marim, 2 adultos, 8 de Setembro (P. Catry).

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, 2 adultos, 17 de Março (P. Dedicoat, J. Taylor). Existe fotografia.

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, 4 inds., 20 de Maio (P. Dedicoat, J. Taylor). Existe fotografia.

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, 2 adultos, 2 de Junho (P. Dedicoat, J. Taylor). Existe fotografia.

2007-Faro, Tavira, Salinas de Santa Luzia, 2 adultos e 1 ind. de 1º Inverno, 6 de Agosto (R. Tipper). Existe fotografia.

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro

do Bufo, 1 ind. de 1º Inverno, 9 de Agosto (R. Tipper). Existe fotografia.

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, pelo menos 15 inds., 28 de Agosto (J. Jara). Existem fotografias.

2007-Faro, Tavira, Salinas de Santa Luzia, 15 inds., 13 de Outubro, 25 inds., 15 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existe fotografia.

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, 3 inds. provavelmente adultos, 13 de Dezembro (A. Leitão, A. Rocha, J. Alves, P. Lourenço). Existe fotografia.

2007-Faro, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, adulto, 23 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existe fotografia.

2007-Faro, Tavira, Salinas de Santa Luzia, adulto, 29 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existe fotografia.

Comentário: *o número de registos e o número de indivíduos envolvidos continua a aumentar e actualmente a espécie pode considerar-se regular no Sotavento Algarvio; o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies sujeitas a homologação para Portugal Continental, a partir do ano 2009.*

Gaivota-prateada

Larus argentatus (3, 2)

(Paleártico)

2007-Porto, Cabedelo, Estuário do Douro, 1 ind. provavelmente adulto da subespécie *L. a. argentatus*, 20 de Janeiro (P. Cardia, A. Pinto). Existe fotografia.

2007-Porto, Póvoa do Varzim, Aguçadoura, juvenil de subespécie indeterminada, 18 de Setembro (P. Crochet).

Comentário: *é provável que o número de registos aceites não reflecta o real padrão de ocorrência de *L. argentatus* em Portugal Continental, uma vez que é possível que indivíduos deste taxon, sobretudo não adultos, passem despercebidos aos olhos dos observadores.*

Gaivota do Cáspio

Larus cachinnans (0, 1)

(Europa Oriental e Ásia Central)

2006-Beja, Aterro Sanitário de Beja, 1 ind. de 1º Verão, 18 a 23 de Abril (C. C. Moore).

Comentário: *este é o primeiro registo para Portugal; para mais detalhes, ver nota publicada neste Anuário Ornitológico.*

Gaivota-branca*Larus glaucooides* (9, 1)

(Gronelândia e Nordeste do Canadá)

2007-Porto, Gaia, Afurada, 1 ind. de 1º ano, de 1 e 10 de Abril (I. Vila Verde, A. Silva). Existem fotografias.

Gaivota-branca, 1º ano, Afurada, Gaia, Abril de 2007 (I. Vila Verde)

Gaivotão-branco*Larus hyperboreus* (14, 2)

(Holárctico em latitudes circumpolares)

2006-Faro, Portimão, Docapesca de Portimão, 1 ind. de 2º calendário, 30 de Agosto (A. Leitão). Existem fotografias.**2007-ZEE**, a cerca de 20 kms a Sul de Montegordo, 1 ind. de 1º Inverno, 15 de Novembro (A. Leitão, C. Santos). Existe fotografia.**Garajau-real***Sterna maxima* (1, 1)

(América e zonas costeiras da África Ocidental)

2006-Faro, Vila Real de Santo António/Castro Marim, Foz do Guadiana e Salinas de Castro Marim, 1 ind. aparentemente adulto em plumagem de Inverno, apresentando características da subespécie *S. m. albididorsalis*, 26 e 27 de Agosto (C. C. Moore).**Comentário:** *este é o segundo registo homologado para Portugal Continental, sendo que a observação anterior também foi efectuada no Algarve (C. Jackson et al. in De Juana 1993).***Garajau-pequeno***Sterna bengalensis* (1, 1)

(pequenas populações no Mediterrâneo, principalmente na Líbia; Mar Vermelho e Golfo Pérsico; Nova Guiné e Austrália)

2006-Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, adulto, 27 de Outubro (R. Eufrásia). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o segundo registo homologado para Portugal Continental, sendo que a observação anterior também foi efectuada no Algarve e em Outubro (C. Noivo & A. Tavares in Jara et al. 2007).***Gaivina-rosada***Sterna dougallii* (4, 1)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico)

2006-Lisboa, Cascais, Cabo Raso, adulto em plumagem de Inverno, 17 de Setembro (C. C. Moore).**Gaivina-d'asa-branca***Chlidonias leucopterus* (12, 4)

(Europa Central e Oriental, Sibéria, Norte da Mongólia)

2005-Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, adulto em plumagem nupcial, 7 de Junho (J. Viana). Existe fotografia.**2006-Setúbal**, Alcochete, Salinas da Atalaia e Barroca d'Alva, 2 juvenis, 9 e 16 de Setembro (C. C. Moore, J. Jara).**2006-Setúbal**, Alcochete, Salinas da Atalaia, juvenil, 17 de Setembro (A. Leitão, C. Pereira). Existem fotografias.**2007-Faro**, Salinas do Ludo, adulto em muda para plumagem de Inverno, 5 a 7 de Outubro (M. Davis). Existem fotografias.**2007-Faro**, Castro Marim, Salinas do Cerro do Bufo, 1 ind. de 1º Inverno, 11 de Novembro (S. Wates, J. Muchaxo). Existem fotografias.**Comentário:** *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.***Andorinhão-cafre***Apus caffer* (17, 7)

(pequenas populações em Espanha e em Marrocos; África subsariana)

2006-Beja, Mértola, Pulo do Lobo, 2 inds., 19 de Maio (C. C. Moore).**2006-Beja**, Mértola, Mina de São Domingos, 5 inds., 20 de Maio (C. C. Moore).

2006-Beja, concelho de Mértola, 2 inds. (nidificação confirmada), 11 de Junho (C. C. Moore).

2006-Beja, Mértola, São Barão, 1 ind., 11 de Junho (C. C. Moore).

2006-Beja, Mértola, Mina de São Domingos, 3 inds., 4 de Agosto (M. Piazzzi).

2006-Beja, Mértola, Pulo do Lobo, 1 ind., 26 de Agosto e 18 de Setembro (P. Catry, J. Rabaça).

2006-Beja, concelho de Mértola, 2 inds. (nidificação confirmada), 27 de Agosto (P. Catry, J. Rabaça).

2006-Beja, Mértola, Penha da Águia, 3 inds., 6 de Setembro, 1 ind., 20 de Setembro (P. Catry, A. Campos, J. Rabaça).

2006-Faro, Alcoutim/Castro Marim, Fernão Gil, 2 inds. (provável casal), 21 de Julho (R. Tipper, K. Searle, K. Phillipps). Existem fotografias.

2007-Faro, Alcoutim/Castro Marim, Fernão Gil, 1 ind., 21 de Maio, 2 inds. (provável casal), 18 e 29 de Junho (P. Dediccoat, J. Taylor).

Comentário: foram recebidos vários registos efectuados em 2006 na área do núcleo de nidificação já conhecido, situado no concelho de Mértola; de salientar os dois registos efectuados em anos consecutivos na zona de Fernão Gil, que sugerem que a espécie poderá estar a estabelecer um novo núcleo de nidificação nessa região; três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente aves de outros registos anteriores.

Andorinhão-pequeno

Apus affinis (8, 1)

(África, Médio Oriente e Sul da Ásia)

2007-Faro, Vila do Bispo, Cabo de São Vicente, 1 ind., 10 de Maio (S. Wates e outros).

Comentário: a data deste registo insere-se no padrão habitual dos registos anteriores; a espécie nidifica em Marrocos e foi recentemente encontrada a nidificar no sul de Espanha (Marti & Del Moral 2003).

Petinha-marítima

Anthus petrosus (6, 1)

(Ilhas Britânicas, ilhas do Canal da Mancha, Noroeste da França, Escandinávia e Noroeste da Rússia)

2006-Lisboa, Cascais, Parede, 1 ind., 30 de Dezembro (C. C. Moore, P. Holt).

Comentário: não obstante tratar-se de uma espécie rara em Portugal Continental, o reduzido número

de registos homologado poderá não reflectir a sua real abundância, nomeadamente devido ao facto de o habitat frequentado no Inverno ser pouco visitado por observadores.

Rabirruivo-mourisco

Phoenicurus moussieri (0, 1)

(Norte de África)

2006/2007-Faro, Vila do Bispo, Cabo de São Vicente, macho adulto, 16 de Novembro de 2006 a 14 de Janeiro de 2007 (K. Wilson, R. Tipper e outros). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo efectuado em Portugal e um dos poucos conhecidos na Europa; para mais detalhes, ver nota publicada neste Anuário Ornitológico.

Felosa-aquática

Acrocephalus paludicola (7, 1)

(Europa Oriental e Rússia)

2005-Faro, Portimão, Ria de Alvor, juvenil, 12 de Outubro (C. Key).

Felosa-assobiadeira

Phylloscopus sibilatrix (0, 1)

(Eurásia Central e Setentrional)

2007-Faro, Vila do Bispo, Praia das Furnas, adulto, 9 de Maio (S. Wates, T. Farr e outros). Existem fotografias.

Comentário: não obstante serem conhecidas várias observações desta espécie em Portugal Continental, este é o primeiro registo submetido ao Comité.



Felosa-assobiadeira, adulto, Praia das Furnas, Vila do Bispo, Maio de 2007 (T. Farr)

Papa-moscas-real*Ficedula parva* (5, 1)

(Europa Central e Oriental, Ásia)

2005-Lisboa, Sintra, Samarra, 1 ind., 29 e 30 de Setembro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

Papa-moscas-real, Samarra, Sintra, Setembro de 2005 (A. Gonçalves)

Pardal-alpino*Montifringilla nivalis* (2, 2)

(Paleártico)

2006-Lisboa, Sintra, Cabo da Roca, 1 ind. em plumagem de Inverno, 5 de Janeiro (R. Matias).**2006-Lisboa**, Sintra, Cabo da Roca, 1 ind. em plumagem de Inverno, 15 de Janeiro (N. Pereira, S. Pereira).**2007-Lisboa**, Sintra, Cabo da Roca, 2 inds. em plumagem de Inverno, 16 de Dezembro (A. Gonçalves). Existe fotografia.*Comentário: a presença da espécie na zona do Cabo da Roca começou a ser reportada em 2005; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.***Peito-carmim***Carpodacus erythrinus* (1, 2)

(Eurásia)

2006-Beja, Odemira, Cabo Sardão, 1 ind. aparentemente juvenil, 1 de Novembro (C. C. Moore).**2006-Santarém**, Golegã, Paul do Boquilobo, provavelmente macho, 11 de Setembro (C. Noivo).

AÇORES

Ganso-bravo*Anser anser* (0, 1)

(Paleártico)

2007-São Miguel, Lagoa Verde, provavelmente adulto, 19 e 20 de Novembro e 5 de Dezembro (C. Ribeiro, C. Pereira e outros). Existe fotografia.**2007-São Miguel**, Lagoa das Sete Cidades, provavelmente adulto, 9 e 12 de Dezembro (C. Pereira, C. Ribeiro, J. Royuela). Existe fotografia.*Comentário: conhecem-se registos antigos de gansos-bravos nos Açores (Bannerman & Bannerman 1966, Medeiros 1991); no entanto, este é o primeiro registo submetido e homologado pelo Comité; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.***Ganso-de-faces-pretas***Branta bernicla* (1, 1)

(Holártico em latitudes boreais)

2006-Flores, Fajã Grande, Lajes das Flores, adulto da subespécie *B. b. brota*, 12 de Dezembro (M. Fortes). Existem fotografias.**Ganso do Canadá***Branta canadensis* (0, 1)

(América do Norte, introduzido na região paleártica ocidental)

2000-Terceira, Angra do Heroísmo, 1 ind., 9 de Novembro (S. Rodebrand, M. Nilsson, B. Carlsson).*Comentário: este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité; conhecem-se pelo menos dois registos anteriores efectuados em 1998 e 2000, que nunca foram submetidos para apreciação (Clarke 2006).*

Pato-carolino*Anas sponsa* (3, 1)

(América do Norte)

2002/2003-Graciosa, Santa Cruz da Graciosa, fêmea, pelo menos de Março de 2002 a 6 de Fevereiro de 2003 (L. Aguiar, J. Bried).

Comentário: a origem dos patos-carolinos observados nos Açores é incerta; os registos anteriores envolveram aves observadas na ilha das Flores e na ilha de São Miguel.

Piadeira-comum*Anas penelope* (6, 4)

(Paleártico)

2005-Flores, Lagoa Branca, macho adulto, 27 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existem fotografias.

2005-São Miguel, Lagoa Azul, provavelmente 1 macho em plumagem de eclipse e 2 juvenis/fêmeas, 7 de Novembro (R. Lindroos, K. Wahlroos).

2005-São Miguel, Lagoa das Furnas, 1 macho, 26 de Novembro (S. Rodebrand). Existe fotografia.

2005-São Miguel, Lagoa Azul/Verde, 1 ind., 27 e 28 de Novembro (S. Rodebrand). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, macho adulto em plumagem nupcial, 7 e 8 de Janeiro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-Terceira, Barragem do Cabrito, 2 fêmeas/imaturos, 2 de Novembro (K. Rouck). Existe fotografia.

Comentário: dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente aves de outros registos anteriores.

Piadeira-americana*Anas americana* (4, 2)

(América do Norte)

2005-Flores, Lagoa Branca, macho adulto em plumagem nupcial, 27 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Lagoa Azul, macho adulto em plumagem nupcial, 18 de Janeiro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, macho adulto em plumagem nupcial, 21 e 28 de Fevereiro (C. Pereira). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Lagoa Azul, macho adulto em plumagem nupcial, 29 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: dois dos registos não foram considerados

na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente aves de outros registos anteriores.

Frisada*Anas strepera* (2, 1)

(Holártico)

2007-Terceira, Barragem do Cabrito, fêmea/imaturo, 2 de Novembro (K. Rouck). Existe fotografia.

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holártica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem.

Arrábio*Anas acuta* (1, 1)

(Holártico)

2007-São Miguel, Lagoa Azul, fêmea/imaturo, 7 e 8 de Janeiro (C. Pereira). Existe fotografia.

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holártica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem.

Marreco*Anas querquedula* (3, 1)

(Paleártico)

2007-São Miguel, Lagoa Azul, macho adulto em plumagem nupcial, 29 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: ao contrário desta observação, os registos anteriores foram efectuados durante o Outono.



Marreco e Piadeira-americana, machos adultos em plumagem nupcial, Lagoa Azul, São Miguel, Março de 2007 (C. Pereira)

Marreca-d'asa-azul*Anas discors* (9, 4)

(América do Norte)

2005-São Miguel, Lagoa das Furnas, juvenil/

fêmea, 25 de Setembro (B. Carlsson). Existe fotografia.

2005-Terceira, Cabo da Praia, juvenil/fêmea, 14 de Setembro (B. Carlsson). Existe fotografia.

2006-São Miguel, Achada das Furnas, macho em plumagem de eclipse abatido, 26 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Lagoa Azul, juvenil/fêmea, 29 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa Verde, juvenil/fêmea, 1 e 2 de Novembro (R. Guerreiro, N. Barros). Existe fotografia.

Comentário: o relativo baixo número de registos aprovados não reflecte provavelmente o padrão de ocorrência desta espécie nos Açores; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.

Pato-colhereiro

Anas clypeata (7, 4)
(Holártico)

2005-São Miguel, Lagoa Azul, fêmea/imaturo, 13 de Novembro (R. Lindroos, K. Wahlroos). Existe fotografia.

2005-Terceira, Cabo da Praia, macho imaturo, 8 de Setembro (J. Bried).

2007-São Miguel, Lagoa Azul/Verde, 4 inds., 27 e 29 de Outubro (C. Pereira, C. Ribeiro e outros). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, fêmea/imaturo, 10 de Novembro (C. Pereira e outros). Existe fotografia.

2007-Terceira, Barragem do Cabrito, fêmea/imaturo, 2 de Novembro (K. Rouck). Existe fotografia.

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holártica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.

Caturro

Aythya collaris (25, 1)
(América do Norte)

2005-Flores, Poço da Alagoinha, 2 machos adultos e 2 inds., aparentemente fêmeas, 27 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existe fotografia.

Comentário: os registos desta espécie efectuados nos Açores a partir de 2006, deixaram de necessitar de homologação pelo Comité; este registo foi avaliado e é agora publicado, uma vez que foi efectuado em 2005.

Negrinha

Aythya fuligula (3, 4)
(Paleártico)

2004-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind. de 1º Inverno, 31 de Outubro (S. Rodebrand).

2007-Faial, Lagoa Pedro Miguel, juvenil, 11 de Novembro (J. Bried). Existe fotografia.

2007-Santa Maria, perto do Ginjal, macho em plumagem de eclipse, 25 de Novembro (S. Parejo). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa Verde, imaturo, 2 de Novembro (R. Guerreiro, N. Barros). Existe fotografia.

Comentário: o registo de 2004 do Cabo da Praia constitui o primeiro dos sete registos aceites.

Negrelho

Aythya marila (4, 3)
(Holártico em latitudes boreais)

2005-Terceira, Praia da Vitória, 2 inds. de 1º calendário, aparentemente macho e fêmea, 22 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existem fotografias.

2006-Terceira, Lagoas da Praia da Vitória, 1 macho e 1 fêmea, 13 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Lagoa Azul, juvenil, 29 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Lagoa Verde, 1 ind. provavelmente juvenil, 1 e 2 de Novembro (R. Guerreiro, N. Barros). Existe fotografia.

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holártica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.

Negrelho-americano

Aythya affinis (2, 1)
(América do Norte)

2006-São Miguel, Lagoa Azul, 1 ind., provavelmente macho imaturo, 6 a 12 de Novembro (K. Haataja, H. Palojarvi). Existem

fotografias.

Comentário: os dois registos anteriores foram efectuados no mesmo local.

Negrola

Melanitta nigra (0, 1)

(Holárctico Setentrional)

2004-Terceira, Porto do Cabo da Praia, juvenil, 29 de Outubro (S. Rodebrand).

Comentário: são conhecidos registos antigos de negrolas nos Açores (Bannerman & Bannerman 1966, Medeiros 1991); no entanto, este é o primeiro registo submetido e homologado pelo Comité; nas circunstâncias deste registo e com base nos critérios de identificação actuais, não é possível, com excepção do caso dos machos adultos, separar os taxa *M. n. nigra* e *M. n. americana*.

Olho-dourado

Bucephala clangula (0, 1)

(Holárctico em latitudes boreais)

2007-Terceira, Barragem do Cabrito, 1 ind., 2 de Novembro (K. Rouck). Existe fotografia.

Comentário: conhece-se apenas um registo desta espécie nos Açores até à década de 1980, referente a um exemplar abatido em São Miguel em 1905 (Bannerman & Bannerman 1966, Medeiros 1991); para além deste registo, Clarke (2006), menciona apenas um outro efectuado em Novembro de 1998 na Fajã dos Cubres, em São Jorge, que nunca foi submetido à apreciação do Comité; este é pois o primeiro registo recebido e homologado.



Olho-dourado, Barragem do Cabrito, Terceira, Novembro de 2007 (K. Rouck)

Merganso-de-poupa

Mergus serrator (3, 1)

(Holárctico)

2003-Santa Maria, Vila do Porto, imaturo ou fêmea, 15 e 16 de Novembro (J. Bried).

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem.

Mobelha-grande

Gavia immer (8, 2)

(Islândia e Neárctico, em latitudes boreais)

2006-Graciosa, Santa Cruz da Graciosa, 1 ind., 11 de Fevereiro (J. Bried).

2007-São Miguel, Praia do Pópulo, 3 inds. de 2º calendário, 8 a 26 de Março (C. Pereira, T. Valkenburg). Existem fotografias.

Mergulhão-caçador

Podilymbus podiceps (6, 2)

(Américas)

2001-São Miguel, Lagoa das Furnas, adulto, 19 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson).

2005-Pico, Lajes do Pico, adulto, 19 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existe fotografia.

Albatroz-de-sobrancelha

Thalassarche melanophris (0, 2)

(Hemisfério Sul em latitudes subantárticas)

2006-ZEE, a Sul do Faial, 1 ind. de 1º ano, 13 de Setembro (M. Fernandes). Existem fotografias.

2007-ZEE, a cerca de 3 milhas a Sul do Pico, imaturo, 9 de Julho (J. Quaresma). Existe fotografia.

Comentário: estes são os primeiros registos conhecidos para a região.



Albatroz-de-sobrancelha, imaturo, ZEE a Sul do Faial, Setembro de 2006 (M. Fernandes)



Albatroz-de-sobrancelha, imaturo, ZEE, a cerca de 3 milhas a Sul do Pico, Julho de 2007 (J. Quaresma)

Freira da Madeira/Gon-gon

Pterodroma madeira / *Pterodroma feae* (8, 1)
(Ilhas da Madeira e Cabo Verde)

2004-ZEE, 38° 25' 05,2" N 26° 56' 52,7" W, a cerca de 20 milhas de Angra do Heroísmo, 1 ind., 18 de Junho (J. Tavares).

Freira das Bermudas

Pterodroma cahow (1, 0)
(Caraíbas)

2003-Santa Maria, Ilhéu da Vila, adulto capturado, 19 a 21 de Novembro (J. Bried). Existem fotografias.

2006-Santa Maria, Ilhéu da Vila, adulto capturado, 12 e 13 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: estes dois registos envolveram a mesma ave, que já havia sido capturada e anilhada em Novembro de 2002 (J. Bried in Elias et al. 2004).

Casquilho

Oceanites oceanites (0, 1)
(Antártica e ilhas subantárticas)

2006-ZEE, perto do Banco Açores, 1 ind., 26 de Agosto (J. Bried e outros).

Comentário: o número de observações desta espécie pelágica nas águas açoreanas é bastante escasso; para além do registo agora obtido, que constitui o primeiro homologado pelo Comité, conhecem-se apenas três registos anteriores: um efectuado em 1865, outro em 1950 e o último em 1990 (Clarke 2006).

Paínho-de-cauda-forcada

Oceanodroma leucorhoa (4, 2)
(Holárctico, em latitudes boreais)

2006-ZEE, local exacto desconhecido ao largo do arquipélago, 1 ind. capturado, 4 de Maio (F. Tempera). Existem fotografias.

2007-Faial, Horta, 1 ind. capturado no dia 14 de Dezembro e libertado no dia seguinte (J. Bried, D. Vargas, M. Laranjo, P. Pedro). Existem fotografias.

Comentário: do total de seis registos aceites, cinco são oriundos do Faial.

Corvo-marinho-comum

Phalacrocorax carbo (2, 1)

(Europa)

2007-Santa Maria, Vila do Porto, 1 ind. de 1º Inverno, 19 e 20 de Novembro (J. Bried).

Corvo-marinho-de-orelhas

Phalacrocorax auritus (7, 1)

(América do Norte)

2006-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 6 a 12 de Novembro (K. Haataja, H. Palojarvi). Existem fotografias.

Abetouro-americano

Botaurus lentiginosus (3, 1)

(Neártico)

2007-São Miguel, perto da Universidade de Ponta Delgada, 1 ind., 15 de Outubro (R. Resendes). Existe fotografia.

Comentário: é provável que esta espécie ocorra no arquipélago dos Açores com maior regularidade do que o número de registos aceites sugere; no entanto, este abetouro sofreu um declínio importante na América do Norte, essencialmente devido à perda de habitat (Cottridge & Vinicombe 1996).

Socó-mirém

Butorides virescens (0, 1)

(América do Norte e Central)

2006-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 27 de Novembro (R. Bispo). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité; os primeiros registos conhecidos desta espécie no arquipélago foram efectuados em finais da década de 1970 (Le Grand 1983); posteriormente, outros registos foram efectuados, mas nunca submetidos para apreciação do Comité (Clarke 2006).



Socó-mirém, 1º Inverno, Porto de Ponta Delgada, São Miguel, Novembro de 2006 (R. Bispo)

Socoi-vermelho

Ixobrychus exilis (0, 1)

(Américas)

2007-Santa Maria, Vila do Porto, juvenil, capturado exausto e libertado, 28 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité; os primeiros registos até agora conhecidos desta espécie no arquipélago foram efectuados em inícios da década de 1950 e o último teve lugar em 1964 (Bannerman & Bannerman 1966, Le Grand 1983).



Socoi-vermelho, juvenil, Vila do Porto, Santa Maria, Setembro de 2007 (C. Pereira)

Goraz

Nycticorax nycticorax (3, 1)
(Cosmopolita)

2005-Flores, Santa Cruz das Flores, juvenil, 31 de Outubro (F. Jiguet, M. Zucca). Existe fotografia.

Comentário: *o facto de se tratar de uma espécie cosmopolita, coloca um problema acrescido relativamente à determinação da origem das aves envolvidas.*

Carraceiro

Bubulcus ibis (10, 5)
(bacia mediterrânica, Ásia, Austrália, África e Américas)

2006-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, adulto em plumagem nupcial, 25 a 27 e 29 de Abril (J. Jarvinen, V. Tälman). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, 1 ind., 9 e 10 de Janeiro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind., 19 de Janeiro (J. Bried). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 4 inds., 26 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Achada das Furnas, 1 ind., 4 e 12 de Outubro (C. Pereira, J. Royuela, C. Silva). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Achada das Furnas, 1 ind., 25 de Outubro (C. Pereira). Existe fotografia.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Garça-branca-americana

Egretta thula (1, 1)
(Américas)

2005-Faial, Porto da Horta, adulto, 27 de Fevereiro (A. Vieira). Existe fotografia.

2005-Pico, Madalena, 1 ind., 21 de Janeiro (P. Madruga). Existe fotografia.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior já publicado (J. Quaresma et al. in Elias et al. 2006, M. Bolton in Jara et al. 2007).*

Garça-branca-grande

Casmerodius albus (4, 5)
(Cosmopolita)

2006-São Miguel, Lagoa das Furnas, 1 ind. de subespécie desconhecida, 6 e 8 de Agosto (S.

Parnaby, D. Parnaby).

2007-Corvo, 1 ind. de subespécie desconhecida, 20 de Abril (P. Domingos). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, 1 ind. de subespécie desconhecida, 3 e 5 de Janeiro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Povoação, 1 ind. aparentemente pertencente à subespécie *C. a. egretta*, 8 de Fevereiro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, 1 ind. aparentemente pertencente à subespécie *C. a. egretta*, 25 a 27 de Fevereiro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-Terceira, Angra do Heroísmo, Vinha Brava, 1 ind. aparentemente imaturo pertencente à subespécie *egretta*, 1 de Fevereiro (J. Amaral). Existem fotografias.

Comentário: *do total de nove registos aceites, cinco observações envolveram aves aparentemente pertencentes à subespécie americana C. a. egretta; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Garça-vermelha

Ardea purpurea (1, 1)
(Europa, Ásia e África)

2006-São Miguel, Lagoa Verde, juvenil, 9 de Agosto (S. Parnaby, D. Parnaby).

Comentário: *este é o segundo registo aceite para o arquipélago do Açores; o primeiro ocorreu em Abril de 1999, igualmente em São Miguel, envolvendo um adulto (A. Ramos & P. Rodrigues in Costa et al. 2003).*

Águia-pesqueira

Pandion haliaetus (3, 1)
(Cosmopolita)

2004-Terceira, Cabo da Praia e Baía das Mós, adulto, 27 e 28 de Outubro (S. Rodebrand).

Comentário: *o facto de se tratar de uma espécie cosmopolita, coloca um problema acrescido relativamente à determinação da origem das aves envolvidas.*

Peneireiro

Falco tinnunculus (0, 1)
(Eurásia e África)

2006-Graciosa, Ponta da Barca, 1 macho de 1º Inverno, 10 de Fevereiro (J. Bried). Existem

fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité; Bannerman & Bannerman (1966), referem a existência de sete exemplares na colecção do Museu Carlos Machado em Ponta Delgada; mais recentemente, Clarke (2006), refere a existência de 25 registos, sem no entanto fornecer pormenores.*

Falcão-peregrino

Falco peregrinus (4, 2)

(Cosmopolita)

2002-Flores, Ponta Ruiva, 1 ind. de 1º Inverno de subespécie desconhecida, 11 de Fevereiro (J. Bried, M. Magalhães, A. Meirinho).

2007-Santa Maria, Ilhéu da Vila, juvenil de subespécie desconhecida, 18 de Novembro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *o facto de se tratar de uma espécie cosmopolita, coloca um problema acrescido relativamente à determinação da origem das aves envolvidas.*

Franga-d'água-malhada

Porzana porzana (0, 1)

(Eurásia)

2005-São Miguel, Lagoa das Furnas, adulto encontrado morto, Outubro, em data exacta desconhecida (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité e, aparentemente, o único registo recente conhecido; Clarke (2006), refere a existência de seis registos no arquipélago, o primeiro dos quais datado de 1911 e o último de 1968.*

Galeirão-americano

Fulica americana (8, 5)

(Américas)

2001-Flores, 1 ind., 31 de Outubro, encontrado morto a 7 de Novembro (K. Rouck, D. Colin). Existe fotografia.

2001-Terceira, Lagoa Azul, 1 ind., aparentemente de 1º Inverno, 3 de Dezembro (H. Bister, B. Carlsson, G. Granstrom, S. Aberg). Existe fotografia.

2005-Pico, Lagoa do Capitão, 1 ind. aparentemente de 1º Inverno, 19 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existem fotografias.

2006-Pico, Lagoa do Capitão, 1 ind. aparentemente de 1º Inverno, 7 de Janeiro (J. Bried).

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, 1 ind., 3 e 5

de Janeiro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, 2 inds., 21 de Fevereiro (C. Pereira). Existe fotografia.

Comentário: *não obstante tratar-se de uma espécie extremamente rara na Europa, o número de registos aceites para os Açores sugere tratar-se de uma espécie regular como divagante neste arquipélago; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Batuíra-de-bando

Charadrius semipalmatus (26, 9)

(América do Norte)

2001-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind. provavelmente adulto, 18 de Setembro (B. Carlsson, S. Rodebrand). Existem fotografias.

2001-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 8 de Outubro (S. Aavisto). Existem fotografias.

2004-Terceira, Cabo da Praia, adulto, 26 de Outubro a 1 de Novembro (S. Rodebrand).

2005-Terceira, Cabo da Praia, adulto, 8 de Setembro (J. Bried).

2005-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 15 de Novembro (S. Rodebrand). Existe fotografia.

2005-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 21 e 22 de Dezembro (P. Crochet). Existe fotografia.

2006-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 10 de Novembro (K. Haataja, H. Palojarvi). Existem fotografias.

2007-Faial, Porto Pim, 2 inds., 25 de Outubro (P. Pedro, M. Laranja). Existe fotografia.

2007-Flores, Fajã Grande, juvenil, 28 de Outubro (K. Rouck). Existe fotografia.

2007-Flores, Ponta Delgada, provavelmente adulto, 29 de Outubro (K. Rouck). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Mosteiros, juvenil, 1 de Novembro (R. Guerreiro, N. Barros). Existe fotografia.

Comentário: *dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente aves de outros registos anteriores.*

Borrelho-ruivo

Charadrius morinellus (1, 1)

(Europa e Ásia, sobretudo em latitudes boreais)

2007-Santa Maria, Aeroporto, pelo menos 2 inds., provavelmente juvenis, 24 a 28 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo). Existem fotografias.

2007-Santa Maria, Aeroporto, 1 ind., 22 de Novembro (S. Parejo). Existe fotografia.

Comentário: *este é o segundo registo aceite para os Açores; o primeiro registo ocorreu em Outubro de 2003, no Faial, envolvendo um juvenil (H. Fraga in Elias et al. 2005); um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente uma das mesmas aves do registo anterior.*

Batuiruçu

Pluvialis dominica (8, 2)
(América do Norte)

2006-Faial, Horta, Feteira, Poça da Rainha, 2 juvenis, 7 de Outubro (D. Vargas, H. Fraga). Existem fotografias.

2007-Flores, Fajã Grande, juvenil, 28 de Outubro (K. Rouck). Existe fotografia.

Comentário: *trata-se de uma espécie cujo padrão de migração outonal é caracterizado por percorrer uma rota que atravessa parte da zona oeste do oceano Atlântico Norte.*



Batuiruçu, juvenis, Poça da Rainha, Feteira, Horta, Outubro de 2006 (D. Vargas)

Abibe-comum

Vanellus vanellus (4, 1)
(Paleártico)

2007-Santa Maria, Aeroporto, 1 ind., 21 de Novembro (S. Parejo). Existe fotografia.

Comentário: *o relativo baixo número de registos recebidos poderá estar influenciado pelo facto de se tratar de uma espécie comum na Europa, não sendo por vezes reportada pelos observadores europeus.*

Pilrito-rasteirinho

Calidris pusilla (15, 9)

(América do Norte setentrional)

2004-Faial, Porto da Horta, 1 ind., 28 a 30 de Setembro (J. Tavares).

2004-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 10 a 12 de Setembro (I. Torsson, S. Aberg). Existe fotografia.

2005-Terceira, Cabo da Praia, juvenil/1º Inverno, de 18 de Outubro a 3 de Novembro (P. Alfrey). Existe fotografia.

2007-Faial, Porto Pim, juvenil, 2 a 4 de Setembro (J. Bried). Existem fotografias.

2007-Flores, Fajã Grande, juvenil em muda para plumagem de 1º Inverno, 29 de Outubro (K. Rouck). Existe fotografia.

2007-Flores, Ponta Delgada, juvenil em muda para plumagem de 1º Inverno, 29 de Outubro (K. Rouck). Existe fotografia.

2007-Pico, Lajes do Pico, juvenil, 14 de Outubro (J. Quaresma). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Mosteiros, juvenil, 13 de Outubro (C. Ribeiro). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Furnas, 1 ind., 19 de Outubro (C. Pereira, C. Silva). Existe fotografia.

2007-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 5 de Setembro (J. Bried, P. Pedro). Existem fotografias.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior já publicado (J. Bried et al. in Jara et al. 2007).*



Pilrito-rasteirinho, juvenil/1º Inverno (à esquerda); Pilrito-anão (à direita, registo já homologado, ver Jara et al. 2007), Cabo da Praia, Terceira, Outubro de 2005 (P. Alfrey)

Pilrito-miúdo*Calidris mauri* (1, 1)

(Alasca e Sibéria Oriental)

2002-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 16 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o segundo registo recebido e homologado pelo Comité; o primeiro registo foi efectuado em Setembro de 1998, igualmente no Cabo da Praia (M. Bolton in Costa et al. 2003); conhecem-se alguns registos anteriores, o primeiro dos quais efectuado em 1978 (Le Grand 1983, Clarke 2006).***Pilrito-anão***Calidris minutilla* (15, 4)

(América do Norte)

2006-Pico, Lajes do Pico, adulto, 14 de Agosto (S. Parnaby, D. Parnaby).**2006-Terceira**, Cabo da Praia, 1 ind., provavelmente adulto, 9 de Fevereiro (J. Bried).**2007-Pico**, Lajes do Pico, juvenil, 14 de Outubro (J. Quaresma). Existe fotografia.**2007-Terceira**, Cabo da Praia, 1 ind. de 1º Inverno, 7 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro).**Pilrito-escuro***Calidris maritima* (4, 6)

(Holárctico em latitudes boreais)

2004-São Miguel, Porto de Vila Franca do Campo, 1 ind., 5 de Novembro (S. Rodebrand).**2005-Graciosa**, Santa Cruz, 1 ind., 20 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existe fotografia.**2006-São Miguel**, Porto de Ponta Delgada, 2 inds., 6 e 8 de Novembro (S. Rodebrand).**2007-Graciosa**, Ilhéu da Praia, 1 ind., 13 de Dezembro (J. Bried).**2007-São Miguel**, Mosteiros, 1 ind., 20 de Janeiro (T. Valkenburg, R. Ceia). Existe fotografia.**2007-São Miguel**, Mosteiros, 1 ind. de 1º Inverno, 9 de Dezembro (C. Ribeiro). Existe fotografia.**Pilrito-de-peito-preto***Calidris alpina* (0, 2)

(Holárctico Setentrional)

2007-Faial, Porto Pim, juvenil, 8 e 9 de Novembro, 2 juvenis, 13 de Novembro (J. Bried, P. Pedro). Existe fotografia.**2007-Santa Maria**, Ginjal, juvenil, 24 a 28 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo). Existe fotografia.**Comentário:** *estes são os dois primeiros registos**recebidos e homologados pelo Comité; o estatuto desta espécie nos Açores é pouco claro; Clarke (2006), considera-a migradora rara ou accidental, mas não fornece detalhes; a necessidade de acumular informação que permita estabelecer um padrão de ocorrência, levou o Comité a decidir incluir o pilrito-de-peito-preto na lista das espécies sujeitas a homologação; a espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem.***Narceja-galega***Lymnocyptes minimus* (0, 3)

(Eurásia Setentrional)

2006-São Miguel, Achada das Furnas, 1 ind. abatido, 29 de Outubro (C. Pereira). Existe fotografia.**2006-São Miguel**, Achada das Furnas, 1 ind. abatido, 19 de Novembro (C. Pereira). Existe fotografia.**2006-São Miguel**, Achada das Furnas, 1 ind. abatido, 10 de Dezembro (C. Pereira). Existe fotografia.**Comentário:** *estes são os três primeiros registos recebidos e homologados pelo Comité e todos envolvem aves abatidas no decurso da actividade cinegética; a informação existente sobre a ocorrência desta espécie nos Açores é bastante escassa; Clarke (2006), refere conhecer apenas dois registos efectuados até à década de 1960, não mencionando informação posterior; o baixo número de registos homologados poderá não reflectir o real padrão de ocorrência, uma vez que se trata de uma espécie difícil de detectar pelos observadores de aves.***Maçarico-de-bico-comprido***Limnodromus scolopaceus* (0, 1)

(América do Norte e Sibéria, em latitudes boreais)

2006-São Miguel, a este da Marina de Ponta Delgada, 1 ind. aparentemente adulto em plumagem de Inverno, 20 e 21 de Setembro (R. Brace).**Comentário:** *Clarke (2006), menciona um possível registo desta espécie efectuado em 2000; essa ave foi identificada apenas com base no chamamento e a observação nunca foi submetida para apreciação do Comité; o registo agora apresentado é pois o primeiro fidedigno efectuado na região.*

Maçarico-de-bico-curto*Limnodromus griseus* (5, 2)

(América do Norte e Sibéria, em latitudes boreais)

2005-Terceira, Cabo da Praia, 2 juvenis, 8 de Setembro (J. Bried).**2005-Terceira**, Cabo da Praia, 3 inds., 14 de Setembro (B. Carlsson). Existem fotografias.**Fuselo***Limosa lapponica* (5, 7)

(Paleártico)

2004-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 2 inds., 6 de Novembro (S. Rodebrand).**2004-Terceira**, Cabo da Praia, 2 inds, 26 e 27 de Outubro, 1 ind., 30 de Outubro (S. Rodebrand).**2005-São Miguel**, Lagoa Azul, juvenil, 3 de Novembro (J. Hering). Existem fotografias.**2005-Terceira**, Cabo da Praia, juvenil, 7 a 14 de Agosto (P. Crochet). Existe fotografia.**2007-Faial**, Monte da Guia, adulto, provavelmente fêmea, 31 de Agosto a 16 de Setembro (A. Vieira, J. Bried). Existe fotografia.**2007-São Miguel**, Praia da Ribeira Grande, 1 ind. provavelmente adulto, 8 e 15 de Setembro (C. Pereira, C. Silva, S. Parejo, J. Royuela). Existe fotografia.**2007-São Miguel**, Lagoa Azul, adulto, 29 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo). Existe fotografia.**2007-São Miguel**, Praia da Ribeira Grande, 1 ind. em plumagem de Inverno provavelmente fêmea, 16 de Novembro (C. Ribeiro). Existe fotografia.**Comentário:** um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.**Maçarico-galego-americano***Numenius phaeopus hudsonicus* (1, 0)

(Neártico)

2005-Corvo, Vila Nova do Corvo, 1 ind. provavelmente juvenil/1º Inverno, 19 de Outubro a 3 de Novembro (P. Alfrey). Existe fotografia.**Comentário:** este é o primeiro registo aceite para os Açores, uma vez que os outros registos anteriormente homologados, presumivelmente do mesmo indivíduo, nas ilhas do Corvo e das Flores, também em 2005 (R. Lindroos et al. in Jara et al. 2007), ocorreram em datas posteriores; este registo não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave dos outros registos anteriores já referidos e publicados (R. Lindroos et al. in Jara et

al. 2007).

Perna-verde*Tringa nebularia* (9, 0)

(Paleártico)

1998-São Miguel, Lagoa Azul, 1 ind. provavelmente juvenil, 13 de Agosto (S. Ernst). Existe fotografia.**Comentário:** esta espécie é de ocorrência regular na região e foi removida da lista das espécies sujeitas a homologação desde 1999; publica-se este registo por ter sido efectuado em data anterior; este registo não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior já publicado (R. Tomé & A. Cardoso in Costa et al. 2000).**Perna-amarela-pequeno***Tringa flavipes* (23, 1)

(América do Norte)

2005-Graciosa, Ilhéu da Praia, 1 ind., 4 de Agosto (P. Crochet, J. Bried).**Comentário:** os registos desta espécie efectuados nos Açores a partir de 2006 deixaram de necessitar de homologação pelo Comité; este registo é aqui publicado, uma vez que foi efectuado em 2005.**Maçarico-solitário***Tringa solitaria* (2, 1)

(América do Norte Setentrional)

2007-São Miguel, Achada das Furnas, 1 ind., 25 de Outubro (C. Pereira). Existe fotografia.**Comentário:** o baixo número de registos aceites é consistente com o reduzido número de observações na Europa.**Maçarico-de-dorso-malhado***Tringa glareola* (3, 2)

(Paleártico)

2003-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 1 de Novembro (P. Alfrey). Existe fotografia.**2004-São Miguel**, Lagoa Azul, 1 ind., 11 de Setembro (I. Torsson, S. Aberg).**Maçarico-das-rochas***Actitis hypoleucos* (0, 2)

(Eurásia)

2005-Terceira, Cabo da Praia, adulto, 7 a 14 de Agosto (P. Crochet). Existe fotografia.**2007-Pico**, Lajes do Pico, juvenil, 4 e 7 de Outubro (R. Guerreiro). Existe fotografia.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos recebidos e homologados pelo Comité; a ocorrência desta espécie no arquipélago poderá ser regular (Clarke 2006); no entanto, a falta de informação concreta levou o Comité a decidir incluir o maçarico-das-rochas na lista das espécies sujeitas a homologação.*

Moleiro-pequeno

Stercorarius parasiticus (2, 1)

(Holártico, em latitudes circumpolares)

2007-Faial, Horta, Feteira, 1 ind. provavelmente juvenil, 6 e 7 de Novembro (D. Vargas). Existem fotografias.

Comentário: *este é o terceiro registo aceite para os Açores; os dois primeiros registos envolveram aves juvenis.*

Moleiro-rabilongo

Stercorarius longicaudus (4, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

2007-ZEE, a cerca de 6 milhas a S/SE do Monte Guia, Faial, imaturo, 10 de Outubro (R. Guerreiro). Existe fotografia.

Gaivota-de-cabeça-preta

Larus melanocephalus (2, 5)

(Europa oriental e meridional)

2006-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 12 de Novembro (K. Haataja, H. Palojarvi, J. Lorentzon, N. Vries). Existem fotografias.

2006-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind. de 1º Inverno, 9 de Fevereiro (J. Bried).

2007-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 1º ano em muda com anilha de PVC amarela "2A33" no tarso esquerdo e anilha metálica no tarso direito, 29 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Praia da Ribeira Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 12 de Novembro (C. Ribeiro). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Praia da Ribeira Grande, 4 inds. de 1º Inverno, 16 de Novembro (C. Ribeiro). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 2º Inverno (o mesmo ind. observado em 29 de Março no mesmo local), 30 de Novembro (C. Pereira, P. Monteiro). Existe fotografia.

Comentário: *de salientar que todos os registos contabilizados envolveram aves de 1º ano; um dos*

registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu a mesma ave de outro registo anterior.

Gaivota-alegre

Larus atricilla (16, 4)

(América do Norte)

2005-Graciosa, Santa Cruz, 2 inds. de 1º Inverno, 20 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existem fotografias.

2005-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, Dezembro, em data exacta desconhecida (P. Crochet, E. Didner). Existe fotografia.

2005-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind. de 1º Inverno, 21 e 22 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner). Existe fotografia.

2006-Graciosa, Porto da Praia, 2 inds. de 1º Inverno e 1 adulto, 12 de Fevereiro (J. Bried, L. Aguiar).

2006-Graciosa, Porto da Praia, 1 ind. de 1º Verão, 9 de Junho (J. Bried).

2006-Terceira, Porto da Praia da Vitória, adulto, 9 de Fevereiro (J. Bried).

2007-Terceira, Cabo da Praia, adulto em plumagem de Inverno, 1 de Novembro (K. Rouck). Existe fotografia.

Comentário: *confirma-se que o ano de 2005 constituiu um ano excepcional em termos de registos e de número de aves observadas; três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente aves de outros registos anteriores.*

Gaivota-das-pradarias

Larus pipixcan (2, 1)

(América do Norte)

2006-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 11 de Novembro (K. Haataja, H. Palojarvi). Existem fotografias.

Comentário: *este é o terceiro registo aceite para os Açores; os dois primeiros registos ocorreram em 2005, na ilha de São Miguel (R. Lindroos & K. Wahlroos in Jara et al. 2007, S. Rodebrand in Jara et al. 2007).*

Guincho-americano

Larus philadelphia (3, 1)

(América do Norte)

2007-São Miguel, Lagoa Verde, 1 ind. de 1º Inverno, 5 de Dezembro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Lagoa das Sete Cidades, 1 ind. de 1º Inverno, 6 e 9 de Dezembro (C. Ribeiro). Existe fotografia.

Comentário: *este é o quarto registo aprovado para o arquipélago; o relativo baixo número de registos homologados, reflecte provavelmente o facto de se tratar de uma espécie que ocorre com menor frequência na Europa, quando comparada com outras gaivotas de origem neártica; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Gaivota-prateada

Larus argentatus (0, 1)
(Eurásia Setentrional)

2007-São Miguel, Praia da Ribeira Grande, adulto provavelmente da subespécie *L. a. argentus*, 8 e 10 de Março (C. Pereira). Existe fotografia.

Comentário: *este é aparentemente o primeiro registo efectuado no arquipélago.*



Gaivota-prateada, adulto provavelmente da subespécie *L. a. argentus*, Praia da Ribeira Grande, São Miguel, Março de 2007 (C. Pereira)

Gaivota-prateada-americana

Larus smithsonianus (2, 3)
(América do Norte)

2005-Flores, Lagoa Rasa, 1 ind. de 1º Inverno, 27 de Janeiro (J. Bried).

2005-Flores, Lagoa Rasa, 1 ind. de 2º Inverno, 27 de Dezembro (P. Crochet, E. Didner, J. Bried). Existem fotografias.

2005-Flores, adulto, 27 e 28 de Dezembro (P. Crochet, P. Adriaens). Existem fotografias.

2005-Terceira, Aterro, juvenil, 28 de Fevereiro (P. Alfrey, M. Ahmad). Existe fotografia.

Comentário: *a identificação de indivíduos desta espécie, nomeadamente subadultos e adultos, continua*

a representar um desafio, não obstante os recentes avanços no estabelecimento de critérios; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.

Gaivota-branca

Larus glaucooides (3, 4)
(Gronelândia e Nordeste do Canadá)

2006-Faial, Porto da Horta, 1 ind. de 2º calendário, 16 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

2006-Graciosa, Santa Cruz da Graciosa, 1 ind. de 1º ou de 2º Inverno, 10 de Fevereiro (J. Bried).

2006-Pico, Lajes do Pico, 1 ind. de 1º Inverno, 7 de Janeiro (J. Bried, J. Quaresma).

2007-São Miguel, Praia da Ribeira Grande, 1 ind. provavelmente de 1º Inverno, 21 e 28 de Fevereiro (C. Pereira). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Praia da Ribeira Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 17 de Março (C. Pereira, T. Valkenburg). Existe fotografia.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Gaivotão-branco

Larus hyperboreus (10, 3)
(Holártico em latitudes circumpolares)

2005-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 25 a 31 de Janeiro (P. Bergdahl). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Ribeira Grande, 1 ind. provavelmente de 1º Inverno, 16 de Fevereiro (T. Valkenburg). Existe fotografia.

2007-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 23 de Fevereiro (T. Valkenburg). Existe fotografia.

Garajau

Sterna sandvicensis (5, 1)
(Europa e Médio Oriente; Américas)

2006-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, adulto, 24 a 26 de Abril (J. Jarvinen, V. Talman). Existe fotografia.

Comentário: *a possibilidade deste registo, à semelhança dos anteriores, poder envolver aves de origem neártica, não pode ser descartada.*

Gaivina-de-dorso-preto*Sterna fuscata* (3, 4)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em zonas tropicais e subtropicais)

2006-Graciosa, Ilhéu da Praia, adulto, 1 e 2 de Agosto (J. Bried e outros).**2006-Santa Maria**, Ilhéu da Vila, adulto, 30 de Junho (J. Bried, E. Alamo).**2007-Graciosa**, Ilhéu da Praia, casal a nidificar, 24 a 27 de Julho, adulto, 6 de Setembro (J. Bried).
Existem fotografias.**2007-Santa Maria**, Ilhéu da Vila, adulto, 27 de Junho (J. Bried).**Comentário:** não foi possível confirmar o sucesso de reprodução no registo do Ilhéu da Praia em 2007.

Gaivina-de-dorso-preto, adulto, Ilhéu da Praia, Graciosa, Julho de 2007 (J. Bried)

Garajau-de-dorso-castanho*Sterna anaethetus* (3, 3)

(Oceanos em latitudes tropicais)

2004-Graciosa, Ilhéu da Praia, adulto, 31 de Julho (J. Bried).**2005-Graciosa**, Ilhéu da Praia, adulto, Abril em data exacta desconhecida e 4 de Agosto (J. Bried, H. Fraga e outros). Existem fotografias.**2006-Graciosa**, Ilhéu da Praia, adulto, de 9 a 20 de Junho (J. Bried). Existem fotografias.**Comentário:** o total de registos aceites desta espécie para os Açores foi efectuado no período estival.**Gaivina-dos-pauis***Chlidonias hybrida* (1, 1)

(Paleártico)

2004-São Miguel, Lagoa das Furnas, 8 inds. de 1º calendário, 3 e 5 de Novembro (S. Rodebrand).

Existem fotografias.

Comentário: este é o segundo registo homologado para a região; o primeiro registo envolveu um juvenil observado em Outubro de 2002, na ilha Terceira (P. Alfrey in Elias et al. 2004); uma vez que esta espécie migradora é relativamente comum na Europa Ocidental durante o Verão, este registo nos Açores não é totalmente inesperado; de salientar a data algo tardia e o número de aves envolvidas.**Torda-mergulheira***Alca torda* (0, 1)

(Holártico Setentrional)

2007-Terceira, Porto de Praia da Vitória, 1 ind., 23 e 24 de Outubro (J. Rodeia). Existem fotografias.**Comentário:** este é o primeiro registo homologado para a região; conhecem-se apenas dois registos anteriores, um efectuado em 1888 e o outro em 1985 (Clarke 2006); esta espécie é conhecida pelo seu potencial de ocorrência como accidental; a origem da ave é incerta, uma vez que a espécie ocorre em ambos os lados do Atlântico.

Torda-mergulheira, Porto de Praia da Vitória, Terceira, Outubro de 2007 (J. Rodeia)

Torda-miúda*Alle alle* (1, 1)

(Holártico, em latitudes circumpolares)

2007-Faial, Porto da Horta, 1 ind. em plumagem de Inverno encontrado morto, 11 de Janeiro (D. Vargas, J. Bried, M. Magalhães). Existe fotografia.**Comentário:** este é apenas o segundo registo aceite para os Açores; o primeiro registo foi efectuado em 2002, também em Janeiro e na Horta (J. Bried in Jara et al. 2007).

Papagaio-do-mar*Fratercula arctica* (1, 1)

(Paleárctico Ocidental e Nordeste do Neárctico)

2007-ZEE, 2 a 3 milhas a Sul da Ponta da Queimada, Pico, adulto, 4 de Junho (J. Quaresma). Existem fotografias.**Comentário:** *este é apenas o segundo registo homologado para o arquipélago; de salientar a data da observação, ocorrida durante o período de Verão; o primeiro registo foi efectuado em Fevereiro de 2002, no Faial (J. Bried in Jara et al. 2007); tal como no caso da torda-miúda, é provável que esta espécie seja mais regular em águas açoreanas, do que aquilo que os escassos registos conhecidos permitem supor.***Papa-lagarta-norte-americano***Coccyzus americanus* (3, 2)

(América do Norte)

2007-Faial, Horta, 1 ind. de 1º calendário capturado e anilhado no dia 3 de Novembro, libertado no dia 7 de Novembro (J. Bried e outros). Existe fotografia.**2007-Faial**, Horta, 1 ind., 24 de Novembro (M. Laranjo, J. Bried).**2007-Flores**, Fajã Grande, 1 ind., 30 de Outubro (K. Rouck). Existe fotografia.**Comentário:** *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*


Papa-lagarta-norte-americano, Fajã Grande, Flores, Outubro de 2007 (K. Rouck)

Coruja-do-nabal*Asio flammeus* (0, 1)

(Holárctico e Ásia)

2007-São Miguel, Fenais da Luz, Aflitos, 1 ind.,

28 de Novembro (C. Pereira). Existe fotografia.

2007-São Miguel, junto ao Aeroporto João Paulo II, 1 ind., 11 de Dezembro (S. Parejo). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité; conhecem-se pelo menos quatro registos desta espécie efectuados entre o princípio do século XX e 1994 (Clarke 2006); a possibilidade deste registo poder envolver uma ave de origem neárctica, não pode ser descartada; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Coruja-do-nabal, Aflitos, Fenais da Luz, São Miguel, Novembro de 2007 (C. Pereira)

Andorinhão-pequeno*Apus affinis* (0, 1)

(África, Médio Oriente e Sul da Ásia)

2007-Santa Maria, Ilhéu da Vila, 1 ind., 18 de Novembro (J. Bried).**Comentário:** *este é o primeiro registo conhecido na região.***Guarda-rios-cintado***Ceryle alcyon* (3, 0)

(América do Norte)

2005-Graciosa, Santa Cruz da Graciosa, fêmea, 9 de Dezembro (J. Bried).**Comentário:** *este registo não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior já publicado (P. Crochet in Jara et al. 2007).*

Petinha-fulva*Anthus rubescens* (0, 2)

(América do Norte e Sibéria)

2005-Corvo, 1 ind., 29 de Outubro (P. Alfrey).

Existem fotografias.

2007-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 1 de Novembro (R. Guerreiro, N. Barros). Existe fotografia.**Comentário:** *estes são os dois primeiros registos conhecidos na região.*

Petinha-fulva, Corvo, Outubro de 2005 (P. Alfrey)

Alvéola-amarela*Motacilla flava* (0, 1)

(Holártico e África do Norte)

2006-Pico, Lajes do Pico, 1 ind. de subespécie desconhecida, 24 de Setembro (A. Jones, A. Williams, L. Archer).**Comentário:** *este é aparentemente o primeiro registo conhecido na região.***Felosinha-comum***Phylloscopus collybita* (2, 2)

(Paleártico)

2004-São Miguel, Lagoa Azul, 1 ind., 2 e 4 de Novembro (S. Rodebrand).**2007-Faial**, Horta, Hospital da Horta, macho, 1 de Dezembro (J. Bried).**Felosa-musical***Phylloscopus trochilus* (0, 1)

(Eurásia)

2004-São Miguel, Lagoa Azul, 1 ind., 2 de Novembro (S. Rodebrand).**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité; Clarke (2006), menciona a existência de**quatro registos efectuados entre 1998 e 2004, nenhum dos quais submetido.***Juruviara-d'olho-branco***Vireo griseus* (0, 1)

(Ámerica do Norte)

2005-Corvo, Ribeira da Ponte, 1 ind. de 1º Inverno, 23 de Novembro (S. Rodebrand).**Comentário:** *este é o primeiro registo conhecido para a região e para o Paleártico Ocidental (Alfrey 2005).***Mariquita do Tennessee***Vermivora peregrina* (0, 1)

(América do Norte)

2005-Corvo, Fojo, 1 ind. de 1º Inverno, 21 de Novembro (S. Rodebrand).**Comentário:** *este é o primeiro registo conhecido na região.***Mariquita-dos-mangais***Dendroica petechia* (1, 1)

(América do Norte e Central, Norte da América do Sul)

2001-São Miguel, Lagoa Azul, 1 ind. de 1º calendário, 5 de Dezembro (H. Bister, B. Carlsson, G. Granstrom, S. Aberg). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o segundo registo aceite para os Açores; o primeiro registo foi efectuado em Agosto de 1995, na ilha das Flores (P. Catry et al. in Costa 1997).*

Mariquita-dos-mangais, 1º calendário, Lagoa Azul, São Miguel, Dezembro de 2001 (H. Bister)

Sanhaço-d'asa-preta

Piranga olivacea (0, 1)
(América do Norte)

2005-Corvo, 1 ind. de 1º Inverno, 29 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido na região.*



Sanhaço-d'asa-preta, 1º Inverno, Corvo, Outubro de 2005 (P. Alfrey)

Tico-tico-coroado

Zonotrichia leucophrys (0, 1)
(América do Norte)

2005-Corvo, Vila Nova do Corvo, 1 ind. de 1º Inverno, 25 e 27 de Outubro (P. Alfrey). Existe fotografia.

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido na região.*



Tico-tico-coroado, 1º Inverno, Vila Nova do Corvo, Corvo, Outubro de 2005 (P. Alfrey)

Realejo

Pheucticus ludovicianus (3, 1)
(América do Norte)

2005-Flores, Lagoa Lomba, macho de 1º Inverno, 19 de Novembro (S. Rodebrand).

Comentário: *os quatro registos aprovados envolveram aves imaturas.*

Mariposa-azul

Passerina cyanea (1, 1)
(Neártico)

2005-Corvo, pelo menos 7 inds. de 1º Inverno, 26 de Outubro, entre um e dois inds., entre 22 de Outubro e 1 de Novembro (P. Alfrey). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo aceite para os Açores, uma vez que o outro registo anteriormente homologado, de um indivíduo na ilha das Flores também em 2005 (M. Zucca in Jara et al. 2007), ocorreu em data posterior; uma vez que se trata de uma espécie regularmente mantida em cativeiro na Europa, o estatuto como accidental nesta região tem sido posto em causa; contudo, estas observações, certamente de aves selvagens, vêm reforçar aquele estatuto; de salientar o número de aves envolvidas.*



Mariposa-azul, 1º Inverno, Corvo, Outubro de 2005 (P. Alfrey)

MADEIRA

Ganso-de-faces-pretas*Branta bernicla* (0, 1)

(Holárctico em latitudes boreais)

2006-Porto Santo, 1 ind. da subespécie *B. b. bernicla*, provavelmente adulto, 8 a 12 de Julho (A. Tarozzi). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo conhecido para a região; de salientar a data da observação, durante o período do Verão.***Piadeira***Anas penelope* (1, 1)

(Paleárctico)

2007-Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, macho adulto em muda para plumagem nupcial, 12 e 13 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano). Existe fotografia.**Comentário:** *este é o segundo registo aceite para a região; o primeiro registo foi efectuado no Outono de 1998, no Funchal, envolvendo uma fêmea (A. Topp in Costa et al. 2003).***Marrequinha-americana***Anas carolinensis* (0, 2)

(América do Norte)

2007-Madeira, Ribeira da Janela, macho adulto em plumagem nupcial, 15 de Fevereiro (H. Romano). Existe fotografia.**2007-Madeira**, Ponta do Sol, macho adulto em plumagem nupcial, 24 de Maio (A. Crombet-Beolens, Z. Parmenter). Existe fotografia.**2007-Madeira**, Ribeira da Janela, macho adulto em plumagem nupcial, 18, 20 e 24 de Setembro (R. Beschow). Existem fotografias.**Comentário:** *estes são os dois primeiros registos conhecidos para a região; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Marrequinha-americana, macho adulto em plumagem nupcial, Ribeira da Janela, Madeira, Setembro de 2007 (R. Beschow)

Negrelho*Aythya marila* (0, 1)

(Holárctico em latitudes boreais)

2007-Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, juvenil/fêmea, 24 de Novembro a 22 de Dezembro (C. Fagundes, H. Romano, R. Guerreiro, G. Silva). Existe fotografia.**Comentário:** *Zino et al. (1995) e Clarke (2006), referem apenas um registo desta espécie efectuado em 1985; este é pois a primeira observação recente e a primeira recebida pelo Comité.***Mobelha-grande***Gavia immer* (0, 3)

(Islândia e Neárctico, em latitudes boreais)

2002-Madeira, Funchal, 1 ind. provavelmente adulto, 7 de Abril (T. Holmgren). Existe fotografia.**2006-Madeira**, Ponta de S. Lourenço, 1 ind., 4 de Fevereiro (A. Sterno, M. Grudzinska). Existem fotografias.**2006-Madeira**, Caniçal, imaturo, Março, em data exacta desconhecida (C. Randler). Existe fotografia.**Comentário:** *os dois únicos registos anteriormente conhecidos na região tiveram lugar, respectivamente, em 1855 e 1945 (Bannerman & Bannerman 1965); estes são pois os primeiros dados recentes sobre a ocorrência desta espécie na Madeira.*

Cagarraz

Podiceps nigricollis (0, 1)
(Holártico, Ásia e África)

2006-Porto Santo, Campo de Golfe, 1 adulto, 27 de Fevereiro (G. Elias, M. Sousa). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité; Clarke (2006), refere a espécie como sendo de ocorrência excepcional no arquipélago e menciona a existência de menos de cinco registos nos últimos 50 anos.*

Cegonha-branca

Ciconia ciconia (1, 2)
(Paleártico)

2006-Madeira, Ponta de São Lourenço, 1 ind., 19 de Abril (B. Geurkink).

2007-Madeira, Aeroporto de Santa Catarina, adulto, 12 de Julho (L. Welie, V. Kuiner).

Íbis-preto

Plegadis falcinellus (0, 1)
(Cosmopolita)

2006-Porto Santo, Campo de Golfe, 2 adultos, 27 de Fevereiro (G. Elias, M. Sousa). Existem fotografias.

2007-Porto Santo, Tanque, 2 adultos em plumagem de Inverno, 7 e 24 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano, P. Saarinen, A. Saarinen). Existem fotografias.

Comentário: *estas são as primeiras observações recentes conhecidas; Bannerman & Bannerman (2006), mencionam a existência de três registos efectuados, respectivamente, em 1892, 1896 e 1936; Clarke (2006), não refere nenhum registo para além destes; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves do registo anterior.*

Colhereiro

Platalea leucorodia (2, 1)
(Paleártico)

2006-Porto Santo, Tanque, 1 imaturo, 27 de Fevereiro (G. Elias, M. Sousa). Existe fotografia.

Comentário: *este terceiro registo homologado para a região ocorreu, à semelhança dos dois anteriores, na ilha de Porto Santo.*

Milhafre-preto

Mikvus migrans (0, 1)
(Eurásia, África e Oceânia)

2007-Madeira, Caniçal, Santo da Serra, 1 ind., 23 de Maio (A. Crombet-Beolens, Z. Parmenter). Existe fotografia.

Comentário: *este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité; Clarke (2006), refere dois registos efectuados, respectivamente, em 2001 e 2004, que nunca foram submetidos para apreciação pelo Comité.*

Águia-sapeira

Circus aeruginosus (0, 1)
(Eurásia, África e Oceânia)

2007-Madeira, Ponta do Pargo, macho adulto, 24 de Maio (A. Crombet-Beolens, Z. Parmenter).

Comentário: *este é o primeiro registo recebido e homologado pelo Comité; Clarke (2006), refere que a espécie terá sido registada menos de cinco vezes nos últimos 50 anos, mas sem adiantar quaisquer pormenores.*

Águia-calçada

Hieraaetus pennatus (2, 2)
(Europa e Ásia Meridionais)

2007-Madeira, cerca de 2 kms a leste de Porto da Cruz, 1 ind. de forma clara, 11 de Julho (L. Welie).

2007-Porto Santo, Tanque, 1 ind. de forma clara, 24 de Setembro (P. Saarinen, A. Saarinen).

Falcão-vespertino

Falco vespertinus (2, 1)
(Europa Oriental e Ásia)

2007-Madeira, Ponta do Pargo, macho de 2º calendário, 24 de Maio (A. Crombet-Beolens, Z. Parmenter). Existe fotografia.

2007-Madeira, Ponta do Pargo, macho de 2º calendário, 15 de Junho (M. Wakeman). Existem fotografias.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*



Falcão-vespertino, macho de 2º calendário, Ponta do Pargo, Madeira, Maio de 2007 (A. Crombet-Beolens)

Franga-d'água-americana

Porzana carolina (0, 1)
(América do Norte)

2007-Madeira, Funchal, Lugar de Baixo, provavelmente adulto, 29 e 30 de Janeiro (N. Crouch). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido na região.*



Franga-d'água-americana, provavelmente adulto, Lugar de Baixo, Madeira, Janeiro de 2007 (N. Crouch)

Pilrito-de-bico-fino

Calidris bairdii (0, 1)

(Sibéria Oriental e Canadá em latitudes boreais)

2007-Madeira, Funchal, adulto em plumagem de Verão, 13 de Maio (R. Matias).

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido na região.*

Pilrito-de-colete

Calidris melanotos (2, 1)

(Nordeste da Sibéria e América do Norte setentrional)

2006-Madeira, São Vicente, Ribeira de São Vicente, juvenil, 27 de Agosto (H. Romano, C. Fagundes). Existem fotografias.

Comentário: *este é o terceiro registo aceite para a região; os dois primeiros registos ocorreram na ilha do Porto Santo e também envolveram aves juvenis.*

Pilrito-acanelado

Tryngites subruficollis (0, 1)

(América do Norte)

2006-Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, juvenil, 8 de Setembro (H. Romano, C. Fagundes). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido na região.*



Pilrito-acanelado, juvenil, Lagoa do Lugar de Baixo, Madeira, Setembro de 2006 (H. Romano)

Combatente*Philomachus pugnax* (0, 1)

(Eurásia Setentrional e Central)

2007-Porto Santo, Tanque, provavelmente macho, 7 e 8 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano). Existe fotografia.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité; Clarke (2006), refere a espécie como accidental.*

Maçarico-bique-bique*Tringa ochropus* (0, 1)

(Eurásia)

2007-Madeira, Ribeira de Machico, 1 ind., 11 de Março (C. Fagundes, H. Romano). Existe fotografia.

Comentário: *Clarke (2006), refere que a espécie é ocasional na região, com menos de cinco registos efectuados nos últimos 50 anos; no entanto, discrimina apenas um registo efectuado em Porto Santo em 2003, que nunca foi submetido para apreciação do Comité; este é pois o primeiro registo documentado para a região.*

Maçarico-pintado*Actitis macularius* (2, 1)

(América do Norte)

2007-Madeira, Funchal, Lugar de Baixo, 1 ind. de 1º Inverno, 29 de Janeiro a 4 de Fevereiro (N. Crouch). Existem fotografias.

2007-Madeira, Funchal, Lugar de Baixo, adulto, 20 e 22 de Abril (L. Rahm). Existem fotografias.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Gaivota-de-cabeça-preta*Larus melanocephalus* (3, 2)

(Europa Oriental e Meridional)

2006-Madeira, Porto do Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 25 de Fevereiro (G. Elias e outros). Existe fotografia.

2007-Madeira, Porto do Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 4 de Dezembro (C. Fagundes). Existe fotografia.

Comentário: *estes dois registos ocorreram, à semelhança dos três anteriores, durante os meses de Inverno.*

Gaivota-alegre*Larus atricilla* (0, 2)

(América do Norte)

2006-Madeira, Porto do Funchal, 2 adultos em plumagem de Inverno e 1 ind. de 1º Inverno, de 18 a 22 de Janeiro (D. Mangsbo). Existem fotografias.

2006-Madeira, Porto do Funchal, 1 ind. em plumagem de Inverno provavelmente adulto, 24 e 25 de Fevereiro (G. Elias e outros). Existem fotografias.

2006-Madeira, local exacto desconhecido, 1 ind. provavelmente adulto, Março, em data exacta desconhecida (C. Randler). Existe fotografia.

2007-Madeira, Porto do Funchal, provavelmente adulto em plumagem de Verão, 13 de Julho (K. Moir).

Comentário: *estes são os primeiros registos conhecidos na região; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente aves de outros registos anteriores.*



Gaivota-alegre, adulto em plumagem de Inverno, Porto do Funchal, Madeira, Janeiro de 2006 (D. Mangsbo)

Gaivota de Sabine*Larus sabini* (1, 1)

(Ásia e América do Norte, em regiões circumpolares)

2006-ZEE, no mar da Madeira, 32°01'66"N, 16°48'93"W, 1 ind., 18 de Junho (P. Catry, R. Matias, J. P. Granadeiro e outros).

Comentário: *este é o segundo registo aprovado para a região; o primeiro registo, envolvendo um adulto, foi efectuado no final de Agosto de 2002, a cerca de 55 kms a nordeste de Porto Santo (C. C. Moore in Elias et al. 2004).*

Guincho-americano

Larus philadelphia (0, 1)
(América do Norte)

2007-Madeira, Porto do Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro (N. Crouch). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido na região.*



Guincho-americano, 1º Inverno, Porto do Funchal, Madeira, Janeiro de 2007 (N. Crouch)

Famego

Larus canus (0, 1)
(Paleártico)

2004-Madeira, Baía de Machico, 1 ind. de 1º Inverno, 2 de Novembro (J. Bried).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité; existe pelo menos um registo anterior desta espécie para a região (Löfgren 1978).*

Gaiivotão-branco

Larus hyperboreus (1, 1)
(Holártico em latitudes circumpolares)

2006-Madeira, Porto do Funchal, 1 ind. aparentemente de 1º Inverno, 25 de Fevereiro (G. Elias e outros). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado para o arquipélago da Madeira; o primeiro registo envolveu um adulto e ocorreu em Abril de 2002, em Machico (A. Helbig in Elias et al. 2005).*

Gaiivota-tridáctila

Rissa tridactyla (0, 1)
(Holártico e Sibéria Setentrionais)

2006-ZEE, entre o Funchal e as Desertas, 1 ind. de 1º Inverno, 20 de Janeiro (D. Mangsbo).

Existem fotografias.

Comentário: *Bannerman & Bannerman (1965), com base em informação recolhida por terceiros, sugerem que a espécie poderá invernar na região; no entanto, referem apenas a existência de um exemplar obtido na região em 1937; Clarke (2006), refere a espécie como acidental, sem no entanto adiantar pormenores; este é pois aparentemente o primeiro registo recente efectuado na região.*

Tagaz

Sterna nilotica (1, 1)
(Cosmopolita)

2007-Madeira, Porto do Funchal, adulto em plumagem nupcial, 25 de Maio (R. Tipper e outros).

Comentário: *este é o segundo registo aceite para a região; o primeiro registo foi também efectuado durante a Primavera e no Funchal (J. Siddle in Elias et al. 2004).*

Seixa

Columba oenas (0, 1)
(Eurásia e Norte de África)

2006-Madeira, Ponta de São Lourenço, 1 ind., 19 de Janeiro (D. Mangsbo). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido na região.*



Seixa, Ponta de São Lourenço, Madeira, Janeiro de 2006 (D. Mangsbo)

Andorinhão-real

Apus melba (2, 1)
(Europa e Ásia Meridionais)

2007-Porto Santo, Tanque, 1 ind., 9 de Julho (K.

Moir).

Comentário: este terceiro registo homologado para a região foi efectuado, à semelhança dos dois anteriores, durante o mês de Julho.

Rabo-espinhoso

Chaetura pelagica (0, 1)
(América do Norte)

2005-Madeira, Funchal, 2 inds., 31 de Outubro e 1 de Novembro (C. Noivo). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo conhecido na região.



Rabo-espinhoso, Funchal, Madeira, Novembro de 2005 (C. Noivo)

Guarda-rios-comum

Alcedo atthis (0, 1)
(Eurásia, Norte de África e Oceânia)

2006-Madeira, São Vicente, 1 ind., 27 de Agosto (O. Jonsson, J. Segergren).

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité; *Bannerman & Bannerman* (1965), referem várias fontes que mencionam a ocorrência da espécie na região.

Rabirruivo

Phoenicurus ochruros (0, 1)
(Eurásia e Norte de África)

2007-Madeira, Porto Moniz, macho adulto, 29 de Janeiro (A. Leitão).

Comentário: *Bannerman & Bannerman* (1965), referem quatro registos efectuados até 1938; *Clarke* (2006), refere que a espécie é ocasional, com menos de cinco registos efectuados nos últimos 50 anos; no entanto, discrimina apenas um registo recente efectuado em 2003, que nunca foi submetido para apreciação do Comité.

Felosa-listada

Phylloscopus inornatus (1, 1)
(Norte e Leste da Sibéria, Ásia Central)

2003-Madeira, Funchal, 1 ind., 1 a 10 de Dezembro (J. Hawkey).

Comentário: este é o segundo registo aceite para a região; o primeiro registo foi efectuado igualmente na zona do Funchal, poucos dias antes (*S. Rodebrand in Jara et al. 2007*).

Cruza-bico-comum

Loxia curvirostra (0, 1)
(Holártico, Ásia e Norte de África)

2006-Madeira, Chão da Lagoa, 1 ind. aparentemente adulto, 26 de Fevereiro (G. Elias e outros). Existem fotografias.

Comentário: *Clarke* (2006), refere dois registos antigos efectuados, respectivamente, em 1930 e 1943; este é o primeiro registo recente conhecido para a região.



Cruza-bico-comum, aparentemente adulto, Chão da Lagoa, Madeira, Fevereiro de 2006 (G. Elias)

Escrevedeira-da-neves

Plectrophenax nivalis (0, 1)
(Holártico em latitudes boreais)

2007-Madeira, Pico do Areiro, 2 inds. em plumagem de Inverno, 2 e 25 de Fevereiro (J. Nunes, A. Ferro). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité; *Bannerman & Bannerman* (1965), mencionam a existência de um exemplar no Museu do Funchal obtido em 1933; *Clarke* (2006), refere a espécie como ocasional.



Escrevedeiras-das-neves, plumagem de Inverno, Pico do Areiro, Madeira, Fevereiro de 2007 (J. Nunes)

SELVAGENS

Rabijunco

Phaeton aethereus (0, 2)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em latitudes tropicais e subtropicais)

2006-ZEE, entre a Selvagem Grande e a Selvagem Pequena, adulto 19 de Junho (R. Matias).

2006-ZEE, entre a Selvagem Grande e a Selvagem Pequena, adulto, 22 de Julho (P. Lassey, P. Palmer).

2007-ZEE, a cerca de 2 kms a Sul da Selvagem Pequena, adulto, 15 de Maio (R. Matias).

Comentário: estes são os primeiros registos homologados para o arquipélago das Selvagens; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Milhafre-preto

Milvus migrans (0, 1)

(Eurásia, África e Oceânia)

2007-Selvagem Grande, juvenil, 29 de Julho (R. Matias).

Comentário: este é o primeiro registo homologado para a região; existem registos anteriores ao funcionamento do Comité.

Águia-sapeira

Circus aeruginosus (0, 1)

(Eurásia, África e Oceânia)

2006-Selvagem Grande, 1 ind., 9 de Setembro (R. Matias).

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité; existe uma referência prévia a esta espécie para as Selvagens (Câmara & Teixeira 1980).

Gavião

Accipiter nisus (0, 1)

(Paleártico)

2007-Selvagem Grande, Baía das Galinhas, macho e fêmea, em voo para Sul, 27 de Setembro (R. Matias).

Comentário: de acordo com a bibliografia existente, este é o primeiro registo efectuado no arquipélago das Selvagens.

Águia-calçada

Hieraetus pennatus (0, 1)

(Paleártico e África do Sul)

2007-Selvagem Grande, adulto de forma clara, 29 de Maio (R. Matias, H. Alonso, J. Mata).

Comentário: este é o primeiro registo documentado e homologado para o arquipélago.

Falcão-da-rainha*Falco eleonora* (0, 2)

(Europa Meridional e Norte de África)

2006-Selvagem Grande, 1 ind. de forma clara, provavelmente adulto, 11 de Setembro (R. Matias).**2007-Selvagem Grande**, Baía das Cagarras, adulto de forma clara, 26 de Setembro (R. Matias).**Comentário:** *estes são os primeiros registos homologados para a região; Mougin et al. (1987), referem um registo efectuado nas Selvagens, sem no entanto adiantar pormenores.***Gaivina-de-dorso-preto***Sterna fuscata* (2, 1)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em zonas tropicais e subtropicais)

2006-Selvagem Pequena, adulto, 18 de Julho (R. Matias, C. Medeiros, F. Zino, B. Zino e outros).**2006-Selvagem Grande**, adulto, 7 a 12 de Agosto (R. Matias, G. Pereira e outros).**Comentário:** *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.***Rola-turca***Streptopelia decaocto* (0, 1)

(Eurásia)

2007-Selvagem Grande, adulto, 19 de Maio (R. Matias).**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado na região; existem registos anteriores ao funcionamento do Comité.***Noitibó-cinzento***Caprimulgus europaeus* (0, 1)

(Eurásia e Norte de África)

2007-Selvagem Grande, adulto, 22 de Maio (H. Alonso). Existe fotografia.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité; existe uma referência antiga relativa a uma ave desta espécie abatida nas Selvagens em 1895 (Ogilvie-Grant 1896).***Torcicolo***Jynx torquilla* (0, 1)

(Eurásia e Norte de África)

2007-Selvagem Grande, 1 ind. de 1º Inverno encontrado morto, 27 de Setembro (R. Matias, D. Putzer). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado na**região; existem registos anteriores ao funcionamento do Comité.***Calhandrinha***Calandrella brachydactyla* (0, 2)

(Paleártico)

2007-Selvagem Grande, adulto, 21 a 23 de Maio (R. Matias).**2007-Selvagem Grande**, 1 ind., 30 de Setembro (R. Matias).**Comentário:** *estes são os dois primeiros registos homologados na região; existem registos anteriores ao funcionamento do Comité.***Petinha-de-garganta-ruiva***Anthus cervinus* (0, 1)

(Holártico em latitudes boreais)

2007-Selvagem Grande, macho adulto em plumagem nupcial, 19 a 28 de Maio (R. Matias, H. Alonso).**Comentário:** *este é o primeiro registo efectuado no arquipélago das Selvagens.***Toutinegra-de-bigodes***Sylvia cantillans* (0, 1)

(Europa Meridional e Norte de África)

2007-Selvagem Grande, fêmea adulta, 21 a 23 de Maio (R. Matias).**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado na região; existem registos anteriores ao funcionamento do Comité.***Felosa-assobiadeira***Phylloscopus sibilatrix* (0, 1)

(Eurásia Central e Setentrional)

2007-Selvagem Grande, adulto, 18 de Maio (R. Matias).**Comentário:** *este é o primeiro registo documentado, efectuado no arquipélago das Selvagens.*

LISTA DE REGISTOS NÃO ACEITES
PORTUGAL CONTINENTAL

Ganso-de-testa-branca *Anser albifrons*

2006-Lisboa, Ponta da Erva, Vila Franca de Xira, 1 ind., 23 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anser*.

Ganso-marisco *Branta leucopsis*

2006-Lisboa, Ponta da Erva, Vila Franca de Xira, 1 ind., 23 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Branta*.

Pato-casarca *Tadorna ferruginea*

2006-Setúbal, Salinas do Samouco, Alcochete, 2 inds., 2 de Maio. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Tadorna*.

Pato-escuro-americano *Anas rubripes*

2006-Local desconhecido, vários inds., data desconhecida. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*.

Pato-rabo-alçado *Oxyura leucocephala*

2001-Setúbal, Lagoa de Santo André, Santiago do Cacém, macho, 12 de Agosto. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Charrela *Perdix perdix*

2006-Viana do Castelo, Germil, Parque Nacional da Peneda Gerês, Ponte da Barca, cerca de 8 inds., 25 de Agosto. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Alfaneque *Falco biarmicus*

2007-Faro, Lagoa dos Salgados, Silves, 1 ind., 15 de Janeiro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Falco*.

Pilrito-de-colete *Calidris melanotos*

2001-Beja, Lagoa dos Patos, Alvito, 1 ind., 23 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Perna-verde-fina *Tringa stagnatilis*

2004-Faro, Salinas de Castro Marim, Castro Marim, Vila Real de Santo António, 1 ind., 29 de Abril. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Tringa*.

Gaivota-alegre *Larus atricilla*

1987-Faro, Ria de Alvor, Portimão, 2 juvenis, 12 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Larus*.

2006-Leiria, Lagoa de Óbidos, Óbidos, adulto, 18 de Fevereiro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Larus*.

Garajau-real *Sterna maxima*

2006-Faro, Lagoa dos Salgados, Silves, 1 ind., 10 de Maio. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Pica-pau-preto *Dryocopus martius*

2006-Braga, Caldas do Gerês, Terras do Bouro, 1 ind., 29 de Julho. **Comentário:** este registo é baseado unicamente na audição de vocalizações, não tendo a ave chegado a ser observada; considera-se que os dados apresentados são insuficientes para estabelecer uma identificação segura.

Petinha-de-garganta-ruiva *Anthus cervinus*

2007-Faro, Colina do Farol, Ferragudo, Portimão, 1 ind., 11 de Março. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anthus*.

AÇORES

Frisada *Anas strepera*

2003-São Miguel, Lagoa das Furnas, fêmea, 12 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Pato-escuro-americano *Anas rubripes*

2001-Flores, Lagoa Branca, 6 inds. no dia 5 de Outubro e 1 ind. no dia 6 de Outubro.

Comentário: a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*, ou híbridos.

2003-Faial, Pedro Miguel, 1 ind., Maio, em data exacta desconhecida. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir híbridos.

2004-Flores, Lagoa Branca, macho, 2 de Setembro.

Comentário: a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*, ou híbridos.

Marreco *Anas querquedula*

2004-Flores, perto da Lagoa Branca, 1 ind., 2 a 7 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Pato-colhereiro *Anas clypeata*

2003-São Miguel, Lagoa das Furnas, 2 fêmeas, 15 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Caturro *Aythya collaris*

2004-São Miguel, Lagoa Azul, 1 ind., 9 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Negrelho-americano *Aythya affinis*

1999-São Miguel, Lagoa das Sete Cidades, 7 inds., 2 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Aythya*.

Garça-branca-americana *Egretta thula*

2007-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 30 de Outubro a 2 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Egretta*.

Águia-pesqueira *Pandion haliaetus*

2004-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 1 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Peneireiro *Falco tinnunculus*

2003-São Miguel, Ribeira Chã, fêmea/imaturo, 15 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2006-São Miguel, Aeroporto de Ponta Delgada, fêmea, 7 de Novembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Falco*.

2007-Santa Maria, Aeroporto, 1 ind., 28 de Setembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Falco*.

Ostraceiro *Haematopus ostralegus*

2003-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 8 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Batuíra-de-bando *Charadrius semipalmatus*

2003-Terceira, Cabo da Praia, 2 ou 3 inds., 14 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2004-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 30 de Agosto.

Comentário: a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Pilrito-rasteirinho *Calidris pusilla*

2006-Faial, Porto Pim, 2 inds., 23 de Maio.

Comentário: a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Calidris*.

Pilrito-de-colete *Calidris melanotos*

2004-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 1 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Pilrito-escuro *Calidris maritima*

2003-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 9 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2003-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 21 de

Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2003-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 14 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Pilrito-acanelado *Tryngites subruficollis*

2004-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 1 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Maçarico-galego-americano *Numenius phaeopus hudsonicus*

2003-São Miguel, Ponta Delgada, 2 inds., 20 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2004-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 14 a 18 de Fevereiro. **Comentário:** com base nos critérios utilizados actualmente, a foto apresentada não permite descartar a possibilidade de se tratar de 1 ind. da subespécie nominal.

Perna-vermelha *Tringa totanus*

2004-São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind., 8 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Perna-amarela-pequeno *Tringa flavipes*

2003-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 14 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2004-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 12 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Tringa*.

Maçarico-solitário *Tringa solitaria*

2007-Terceira, Cabo da Praia, adulto, 24 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Gaivota-de-cabeça-preta *Larus melanocephalus*

2004-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 7 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Larus*.

Gaivota-de-bico-riscado *Larus delawarensis*

2003-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 21 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Gaivina de Forster *Sterna forsteri*

2004-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind. de 1º ano, 31 de Outubro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Sterna*.

Tentilhão-montês *Fringilla montifringilla*

2003-São Miguel, Serra da Tronqueira, 1 ind., 12 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Lugre *Carduelis spinus*

2003-São Miguel, Lagoa das Furnas, macho, 10 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2003-São Miguel, Lagoa das Sete Cidades, 1 macho e 2 fêmeas, 11 e 15 de Dezembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

MADEIRA

Marreco *Anas querquedula*

2003-Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 26 a 29 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*.

Francelho *Falco naumanni*

2006-Madeira, Ribeira Brava, 1 ind., 27 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada não

permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Falco*.

Falcão-da-rainha *Falco eleonorae*

2007-Madeira, Pico Grande, 1 ind., 10 de Julho. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Falco*.

Perna-amarela-pequeno *Tringa flavipes*
2007-Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind.,
10 de Março. **Comentário:** o material apresentado
não permite excluir outras espécies, nomeadamente do
género *Tringa*.

Gaivota-de-bico-fino *Larus genei*
2002-Madeira, Funchal, adulto, 2 de Abril.
Comentário: a descrição apresentada não permite

excluir outras espécies, nomeadamente do género
Larus.

Rola-turca *Streptopelia decaocto*
2007-Porto Santo, adulto, 24 de Setembro.
Comentário: a descrição apresentada não permite
excluir outras espécies, nomeadamente do género
Streptopelia.

SELVAGENS

Rolieiro *Coracias garrulus*
2007-Selvagem Grande, 1 ind., 12 de Maio. **Comentário:** o material apresentado não permite identificar a
espécie com segurança.

REFERÊNCIAS

- Alfrey, P. 2005. American vagrants on the Island of Corvo, Azores, in October 2005. *Birding World* 18 (11): 465-474.
- Bannerman, D.A. & Bannerman, W.M. 1965. *Birds of the Atlantic Islands*, vol. II. Oliver & Boyd. Edinburgh and London.
- Bannerman, D.A. & Bannerman, W.M. 1966. *Birds of the Atlantic Islands*, vol. III. Oliver & Boyd. Edinburgh and London.
- Câmara, D. B. & A. M. Teixeira 1980. Autumn occurrence of palearctic migrants on Selvagem Grande Island (Madeira): *Bocagiana* 50: 1-3.
- Clarke, T. 2006. *Birds of the Atlantic Islands*. Christopher Helm. London.
- Costa, H. e o Comité Português de Raridades da SPEA 1997. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 1995. *Pardela* 5: 4-19.
- Costa, H., Bolton, M., Catry, P., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2000. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1997 e 1998. *Pardela* 11: 3-27.
- Costa, H., Bolton, M., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2003. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1999, 2000 e 2001. *Anuário Ornitológico* 1: 3-35.
- Cottridge, D. & Vinicombe, K. 1996. *Rare Birds in Britain and Ireland*. Collins London.
- De Juana, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la SEO 1993. Observaciones homologadas de aves raras en España y Portugal. Informe de 1991. *Ardeola* 40: 177-192.
- De Juana, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la SEO 1995. Observaciones homologadas de aves raras en España y Portugal. Informe de 1993. *Ardeola* 42: 97-113.
- Elias, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2004. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2002. *Anuário Ornitológico* 2: 1-20.

- Elias, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2005. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2003. *Anuário Ornitológico* 3: 1-21.
- Elias, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2006. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2004. *Anuário Ornitológico* 4: 1-15.
- Hudson, N. & the Rarities Committee. 2008. Report on rare birds in Great Britain in 2007. *British Birds* 101: 516-577.
- Jackson, C. 1994. Eider *Somateria mollissima* na Ria de Alvor. *Relatório Anual de A Rocha, ano de 1993*: 72-73.
- Jara, J., Costa, H., Elias, G., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2007. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2005. *Anuário Ornitológico* 5: 1-34.
- Le Grand, G. 1983. Bilan des observations sur les oiseaux d'origine Néartique effectuées aux Açores (jusqu' en Javier 1983). *Arquipélago* 4 : 73-83.
- Löfgren, L-E 1978. First record of the common gull *Larus canus* in Madeira. *Bocagiana* 46: 1-2.
- Martí, R. & Del Moral, J. (eds). 2003. *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
- Medeiros, F. M. 1991. A família Anatidae nos Açores. *Açoreana* 7 (2): 277-295.
- Mougin, J. L., F. Roux, P. A. Zino, C. Jouanin, J-C Stahl & B. Despin 1987. Les oiseaux visiteurs des îles Selvagens. *Boletim do Museu Municipal do Funchal* 39 (183): 5-24.
- Ogilvie-Grant, W. R. 1896. On the birds observed at the Salvage Islands, near Madeira. *Ibis* 2: 41-55.
- Zino, F., Biscoito, M. J., Zino, P. A. 1995. Birds of the archipelago of Madeira and the Selvagens new records and checklist. *Boletim do Museu Municipal do Funchal* 47 (262): 63-100.
- Jackson, C. 1994. Eider *Somateria mollissima* na Ria de Alvor. *Relatório Anual de A Rocha, ano de 1993*: 72-73.

———— CORRECÇÕES A ANUÁRIOS ORNITOLÓGICOS ANTERIORES ————

A foto de Chasco-de-barrete *Oenanthe leucopyga* apresentada na contra-capla do Anuário Ornitológico Volume 3 de 2005, é da autoria de Paulo Pinto e não de Ray Tipper, como na publicação e por lapso foi mencionado.

Noticiário Ornitológico, 2006 e 2007

Ornithological News, 2006 and 2007

Compilado por Alexandre H. Leitão e Nuno Cidraes-Vieira

Neste espaço apresentam-se observações ornitológicas efectuadas principalmente em 2006 e 2007, assim como alguns registos efectuados em anos anteriores e que apresentam especial interesse.

Devido ao grande volume de informação que nos vai chegando todos os anos, apenas é possível publicar uma selecção de registos. Esta selecção foi feita com base nos seguintes critérios:

- registos de espécies de ocorrência rara ou pouco comum em Portugal e que não necessitem de ser homologadas pelo Comité Português de Raridades;
- registos de espécies acerca das quais existe pouca informação publicada
- registos de espécies que, embora de ocorrência regular no país, se revistam de aspectos invulgares (observação de um número invulgar de indivíduos, observação em época considerada fora do normal, observação numa região onde não exista ocorrência bem documentada, observação de indivíduos com padrões de plumagem atípicos, etc.)

A sequência das espécies seguida é aquela proposta por AERC (2003).

Para cada observação indica-se sucessivamente:

- o distrito ou, no caso das observações de aves em ambiente marinho, a Zona Económica Exclusiva (ZEE); no caso das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e do Arquipélago das Selvagens, indica-se a ilha em

lugar do distrito;

- o concelho (no caso das Regiões Autónomas esta indicação só é incluída quando relevante);
- o local da observação e, quando necessário, a localidade mais próxima;
- o número de aves, e, quando possível, outras informações, nomeadamente idade, sexo, ave capturada, anilhada, abatida, etc.; data da observação;
- nome do(s) observador(es);

Sempre que tal se justifique, são apresentados comentários adicionais sobre os registos. Os dados apresentados são propriedade dos respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia, por exemplo:

«...110 indivíduos observados na Lagoa dos Patos, em 10 de Dezembro de 2005 (Pereira *in* Leitão & Cidraes-Vieira, 2007)».

Nota: a utilização do termo «raro» nesta secção destina-se unicamente a assinalar casos de espécies que, não sendo sujeitas a homologação pelo Comité Português de Raridades (CPR), são muito escassas no país ou numa dada região. Todos os registos de espécies sujeitas a homologação são apresentados no relatório do CPR.

PORTUGAL CONTINENTAL

Ganso-bravo *Anser anser*

2006 – Beja, Mértola, Mina de S. Domingos, Alb. da Tapada Grande, 2 inds., 16 de Fevereiro (N. Fonseca).

Portalegre, Monforte, Alb. das Esquilas, 5 inds., 4 de Novembro (L. Venâncio).

Santarém, Torres Novas, Paul do Boquilobo, 29 inds. em voo, 3 de Novembro (C. Noivo).

2007 – Beja, Ferreira do Alentejo, Alb. de Odivelas, 382 inds., 23 de Dezembro (J.L. Almeida); Mourão, Alb. do Alqueva, 386 inds., 30 de Dezembro (J.L. Almeida).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 61 inds., 29 de Novembro (K. Searle, K. Philipps); Tavira, Salinas do Arraial Ferreira Neto, 1 ind., 11 de Outubro (L. Gordinho); Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 1 de Dezembro (R. Eufrásia).

Porto, Espinho, Barrinha de Esmoriz, 2 inds., 24 de Novembro (P. Cardia, A. Faustino e outros).

Comentário: registos fora dos locais habituais de ocorrência da espécie, e concentrações importantes fora das zonas de invernada principais.

Tadorna *Tadorna tadorna*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 6 inds., 16 de Novembro (R. Eufrásia).

Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 1 ind., 28 de Janeiro a 5 de Março (G. Elias, M.M. Sousa, C. Noivo, J. Belo e outros).

Setúbal, Alcochete, Hortas, 203 inds., 29 de Janeiro (P. Fernandes).

2007 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 112 inds., 9 de Janeiro (C. Viney); Faro, Salgados de Faro, 2 casais com 8 e 9 crias respectivamente, 12 de Julho (G. Schreier).

Santarém, Benavente, Sapal de Pancas, 659 inds., 10 de Fevereiro (J. Jara).

Setúbal, Alcochete, Sítio das Hortas, 2 inds., 25 de Junho (A. Gonçalves) e 191 inds., 16 de Dezembro (R. Marcão, R. Silva).

Comentário: apresentam-se registos fora dos locais habituais de ocorrência da espécie, e concentrações elevadas, destacando-se a observação de Fevereiro de 2008, correspondente a uma das mais altas contagens efectuadas no nosso território; ainda um registo em local novo de reprodução para esta espécie rara como nidificante.



Tadorna, Salgados de Faro, Julho de 2007 (Georg Schreier)

Arrabio *Anas acuta*

2007 – Beja, Lagoa dos Patos, 648 inds., 28 de Fevereiro (J.L. Almeida).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 juv., 28 de Julho (R. Eufrásia).

Comentário: uma concentração elevada e um registo precoce para esta espécie.

Marreco *Anas querquedula*

2006 – Beja, Castro Verde, Alb. da Apariça, 12 inds., 15 de Março (L. Reino, P. Leitão, R. Morgado); Alvito, Lagoa dos Patos, 22 inds., 15 de Março (P. Leitão, R. Morgado).

Faro, Silves, observações na Lagoa dos Salgados: 77 inds., 12 de Março (R. Eufrásia), 1 casal, 23 de Abril (R. Eufrásia), 2 machos, 10 de Maio (R. Eufrásia), 1 macho, 27 de Maio a 1 de Junho (R. Eufrásia, J. Ministro, A.H. Leitão).

2007 – Faro, Silves, observações na Lagoa dos Salgados: 73 inds., 10 de Março (R. Eufrásia), 35 inds., 24 de Março (J. Edge), 1 macho, 17 de Maio (R. Skan, J. Winsper);

Portalegre, Elvas, Herdade de Maria Ribeira, 1 fêmea com 9 crias, 26 de Maio e 9 de Junho (L. Venâncio).

Santarém, Benavente, Vasa-Sacos, 7 inds., 11 de Março (J. Jara).

Setúbal, Alcácer do Sal, Batalha, 7 inds., 14 de Março (J. Jara).

Comentário: concentrações importantes desta espécie rara no nosso território e registos em plena época de reprodução, período em que esta espécie é bastante

escassa. Destaca-se o registo de nidificação no concelho de Elvas, em 2007, evento registado muito escassamente nas últimas décadas.

Pato-colhereiro *Anas clypeata*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 4 fêmeas com crias, entre 18 de Maio e 15 de Junho (R. Eufrásia).

2007 – Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua, 1 macho, 25 de Junho (M. Caetano).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 fêmea com 7 crias, 7 de Junho (R. Eufrásia).

Comentário: *espécie bastante rara como reprodutora no nosso território; registe-se a nidificação confirmada em dois anos consecutivos na Lagoa dos Salgados, que parece ser o único local de reprodução regular no nosso território.*

Pato-de-bico-vermelho *Netta rufina*

2006 – Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, Capela de S. Pedro, 1 fêmea com crias, 2 de Junho (L. Gordinho).

2007 – Portalegre, Elvas, Alb. de Maria Ribeira, 2 machos e 1 fêmea com 8 crias, 9 de Junho (L. Venâncio).

Comentário: *registos de nidificação em locais para os quais não existem dados.*

Zarro-comum *Aythya ferina*

2007 – Beja, Mértola, pequeno lago perto de Mértola, 1 fêmea com 2 crias, 2 a 4 de Junho (C.C. Moore).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 580 inds., 10 de Fevereiro (J.L. Santos, F.L. Santos).

Comentário: *um registo de nidificação deste pato raro como nidificante, e uma contagem elevada para esta espécie.*

Zarro híbrido *Aythya ferina x A. nyroca*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 macho, 18 de Fevereiro (N. Fonseca).

2007 – Faro, Silves, observações na Lagoa dos Salgados: 1 fêmea, 19 de Fevereiro (S. Wates, P. Walker); 1 macho, 21 de Maio (G. Schreier); 1 fêmea, 20 de Junho (L. Gordinho).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 1 macho, 27 de Dezembro de 2006 a 10 de Fevereiro de 2007 (J.L. Santos, F.L. Santos).

Pêrra *Aythya nyroca*

2006 – Faro, Castro Marim, Tanque de Altura: 2 inds., 24 e 25 de Agosto (C. Viney, A.H. Leitão); 2 inds., 12 de Outubro (P. Dediccoat, J. Taylor); Loulé, Caniçal de Vilamoura, 15 inds., 1 de Dezembro (M. Mendes).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 6 inds., 7 de Dezembro (J.L. Santos, F.L. Santos).

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 4 inds., 14 de Julho (J.L. Almeida).

Faro, Loulé, Quinta do Lago, 3 inds., 7 de Março (A.H. Leitão); Silves, Lagoa dos Salgados, 1 fêmea com crias, 4 de Junho (G. Schreier); Castro Marim, Tanque de Altura: 2 machos, 5 e 23 de Agosto (J. Jara, J. Farminhão); 2 machos, 9 de Outubro (L. Gordinho); Loulé, Vilamoura, 4 inds., 31 de Agosto (M. Mendes); Loulé, ETAR de Vilamoura, 3 inds., 2 de Novembro (R. Eufrásia).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 6 inds., 10 de Fevereiro (J.L. Santos, F.L. Santos).

Comentário: *registos desta espécie de ocorrência rara no nosso território, destacando-se algumas concentrações observadas no Algarve, pela invulgaridade dos números envolvidos; a concentração observada em Dezembro de 2006 em Vilamoura deverá ser uma das maiores documentadas para o nosso território.*



Perra, Salgados de Faro, Agosto de 2007 (Miguel Mendes)

Negrelho *Aythya marila*

2006 – Faro, Loulé, Rib^a. de S. Lourenço, 1 fêmea, 14 de Dezembro (A.H. Leitão, J. Alves).

Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos: 1 macho, 13 de Janeiro a 2 de Março (H. Cardoso, P. Henriques, C. Noivo, J. Belo); 1 macho, 7 e 8 de

Outubro (H. Cardoso).

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 1 ind., 24 de Novembro (H. Raposeira, P. Horta).

Faro, Loulé, Quinta do Lago, 4 inds., 7 de Março (A.H. Leitão).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Marinhas da Saragoça: 1 macho, 10 e 11 de Novembro (J. Jara); 2 inds., 15 de Novembro (A. Gonçalves).

Comentário: espécie escassa em Portugal, que habitualmente ocorre singularmente ou em pares; destaca-se a concentração observada no Algarve em 2007, pelos números envolvidos.

Merganso-de-poupa *Mergus serrator*

2007 – Faro, Vila do Bispo, frente ao Martinhal, 1 macho, 1 de Maio (S. Wates).

Comentário: registo tardio para esta espécie invernante.

Mergulhão-pequeno *Tachybaptus ruficollis*

2006 – Aveiro, lagoas da Universidade, 1 ad. a alimentar 2 crias recém-nascidas, 10 de Novembro (F. Leão).

Comentário: registo tardio de nidificação para a espécie.

Mergulhão-de-poupa *Podiceps cristatus*

2006 – Portalegre, Arronches/Campo Maior/Elvas, Alb. do Caia, 400 inds., 19 de Agosto (L. Venâncio).

Comentário: uma contagem das mais elevadas documentadas para Portugal.

Cagarraz *Podiceps nigricollis*

2006 – Évora, Alandroal, Alb. do Alqueva, Malhada das Taliscas, 1 ind., 13 de Dezembro (L. Gordinho).

Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 6 inds., 5 de Dezembro (A. Gonçalves).

2007 – Aveiro, Ovar, frente à Praia do Furadouro, 1 ind., 7 de Outubro (C. Noivo, A. Palavra).

Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua: 1 ind. a incubar e outro nas proximidades do ninho, 8 de Junho (M. Caetano, P. Pereira, G. Dias); 2 ads. e 2 crias, 25 de Junho (M. Caetano).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo: 6 ads., 27 de Junho (C. Viney); 114 inds., 10 de Outubro (L. Gordinho).

Viana do Castelo, Caminha, Foz do Minho, 2 inds., 31 de Dezembro (T. Rodrigues).

Comentário: observações em locais onde esta espécie é rara, algumas concentrações elevadas e uma observação em Junho, período em que o cagarraz é pouco frequente em Portugal. Destaca-se a confirmação de nidificação na região do Alentejo.

Pardela-de-barrete *Puffinus gravis*

2006 – ZEE, 20 milhas a W da Praia da Torreira, 8 inds., 28 de Outubro; entre as 10 e 25 milhas a W de Esposende, 57 inds., 30 de Outubro; entre as 5 e 25 milhas a W de Ovar, 6 inds., 1 de Novembro; entre as 2 e 10 milhas a W de Mira, 9 inds., 2 de Novembro (todas as observações por A.H. Leitão, C. Santos).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Ponta da Atalaia: 1 ind., 2 de Setembro (S. Wates); mesmo local, 1 ind., 29 e 30 de Setembro (S. Wates, R. Tomé, A.H. Leitão, H. Costa, H. Alonso, T. Marques, N. Pires, Z. Martins, J. Nunes); Lagos, c. de 5 kms a S da Praia da Luz, 1 ind., 9 de Novembro (A.H. Leitão, C. Santos);

Lisboa, Sintra, ao largo da Praia Grande, 1 ind., 11 e 23 de Setembro (M. Poot);

Comentário: trata-se de uma espécie cuja presença junto à costa continental portuguesa está mal documentada, sendo raramente avistada a partir de terra. O número de observações aqui publicados deverá reflectir um maior esforço de prospeção das águas junto à costa continental portuguesa, e também uma regularidade na ocorrência durante o período de passagem outonal.

Pardela-preta *Puffinus griseus*

2006 – Braga, Esposende, entre as 5 e as 25 milhas ao largo de Esposende, 33 inds., 30 de Outubro (A.H. Leitão, C. Santos).

Faro, Faro, 8 milhas a S de Faro, 1 ind., 9 de Abril (A. Luís, A.H. Leitão).

Leiria, Peniche, Cabo Carvoeiro, 54 inds./1h de contagem, 25 de Novembro (H. Cardoso).

Lisboa, Cascais, Cabo Raso, 6 inds., 20 de Outubro (A.H. Leitão, M. Armelin).

Setúbal, Sesimbra, 5 milhas a W do Cabo Espichel, 3 inds., 6 de Abril (A. Luís, A.H. Leitão).

ZEE, 18 milhas a W de Esposende, 1 ind., 4 de Maio (A.H. Leitão, C. Pereira); 15 milhas a W do Porto, 4 inds., 7 de Maio (A.H. Leitão, C. Pereira).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Cabo de S. Vicente, 8 inds. em passagem, 1 de Outubro (R. Tomé, A.H. Leitão, H. Costa, H. Alonso, T. Marques, N. Pires,

J.L. Santos, F.L. Santos).

Lisboa, Sintra, entre as 8 milhas a W do Cabo da Roca e 3 milhas a SW da Guia, 5 inds., 7 de Novembro (A.H. Leitão, C. Santos).

Comentário: algumas contagens elevadas desta espécie, e registos feitos durante os meses de Abril e Maio, período atípico para a presença desta espécie ao largo de Portugal.



Pardela-preta, ao largo do Cabo Raso, Novembro de 2007 (Alexandre H. Leitão)

Fura-bucho do Atlântico *Puffinus puffinus*

2006 – **Leiria**, Peniche, Cabo Carvoeiro, 3 inds., 16 de Novembro (H. Cardoso).

Lisboa, Cascais, Cabo Raso, 7 inds., 20 de Outubro (A.H. Leitão, M. Armelin).

Porto, Póvoa do Varzim, 5 milhas a W da Póvoa do Varzim, 13 inds., 30 de Outubro (A.H. Leitão, C. Santos).

2007 – **Faro**, Vila do Bispo, Cabo de S. Vicente, 3 inds., 1 de Outubro (A.H. Leitão, R. Tomé, J.L. Santos, N. Pires, J. Nunes, H. Alonso, F.L. Santos, T. Marques).

Setúbal, Odemira, 1 milha ao largo de Almogrove, 1 ind., 15 de Fevereiro (R. Guerreiro).

Comentário: espécie de ocorrência rara junto à costa continental portuguesa.

Fura-bucho das Baleares

Puffinus mauretanicus

2006 – **Leiria**, Peniche, Cabo Carvoeiro, 933 inds., 16 de Novembro (H. Cardoso).

2007 – **Lisboa**, Cascais, 2 kms a sul da Guia, 2300 inds., 15 de Novembro (M. Poot).

ZEE, 13 milhas a S da Guia, Cascais, 1300 inds., 17 de Novembro (A.H. Leitão, C. Santos).

Comentário: contagens elevadas para esta espécie

globalmente ameaçada. Note-se que as concentrações efectuadas em 2007 representam uma percentagem elevada da população mundial.

Casquilho *Oceanites oceanicus*

2006 – **Faro**, Portimão, Ria de Alvor, 1 ind., 24 de Outubro (C. Key).

Comentário: registo em local atípico para esta espécie marinha.

Alma-de-mestre *Hydrobates pelagicus*

2006 – **ZEE**, 10 milhas a oeste de Esposende, 800 inds., 30 de Outubro (A.H. Leitão, C. Santos).

Comentário: concentração elevada para este painho.

Painho-de-cauda-forçada

Oceanodroma leucorhoa

2006 – **Faro**, Vila do Bispo, Cabo de S. Vicente, 1 ind., 13 de Setembro (L. Gordinho); Vila do Bispo, Ponta da Torre, 18 inds., 25 de Outubro (S. Wates).

Leiria, Peniche, Cabo Carvoeiro, 4 inds., 8 de Dezembro (H. Cardoso).

Lisboa, Cascais, Cabo Raso, 2 inds., 20 de Outubro (A.H. Leitão).

2007 – **Faro**, Vila do Bispo, 1 milha a W do Cabo de S. Vicente, 1 ind. a bordo no navio «Noruega», 21 de Fevereiro (R. Guerreiro, A. Henriques).

ZEE, 200 milhas a SW do Cabo de S. Vicente, 1 ind., 21 de Janeiro (A.H. Leitão).

Alcatraz *Morus bassanus*

2006 – **Lisboa**, Cascais, Cabo Raso, 2564 inds./2h em passagem, 20 de Outubro (A.H. Leitão, M. Armelin).

ZEE, 6 milhas ao largo do Cabo Raso, 1444 inds./1h em passagem, 27 de Outubro (A.H. Leitão, C. Santos).

Comentário: contagens elevadas para esta espécie marinha.

Corvo-marinho-de-faces-brancas

Phalacrocorax carbo

2007 – **Portalegre**, Arronches/Elvas, Alb. do Caia, 1300 inds., 27 de Outubro (L. Venâncio).

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 20 inds., Abril a Julho (C. Noivo).

Comentário: registo importante no Ribatejo por se tratarem de aves que permaneceram no local desde o Inverno, entre elas 4 ou 5 adultos nupciais observados

em corte e transporte de material, sem haver, no entanto, verdadeiramente construção de ninho; estes registos culminam uma série de anos em que as aves vêm sendo observadas a permanecer no Paul do Boquilobo por cada vez mais tempo, inclusive durante a época de reprodução. Neste ano de 2007 foi pela primeira vez registada a nidificação em Portugal desta espécie.

Abetouro *Botaurus stellaris*

2006 – Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal: 2 inds., 21 de Março (H. Cardoso); 1 ind., 9 de Novembro (H. Cardoso).

Leiria, Caldas da Rainha, Paul da Tornada, 1 ind., 22 de Janeiro (H. Cardoso).

Portalegre, Elvas, Herdade da Alfarófia, 1 ind., 12 de Março (N. Domingos).

Setúbal, Sesimbra, Lagoa da Estacada, 1 ind. escutado, 31 de Maio (P. Fernandes).

Comentário: o número de observações desta espécie é extremamente escasso para Portugal.

Garçote *Ixobrychus minutus*

2007 – Portalegre, Elvas, Alb. do Alqueva, Alagada, 1 macho, 30 de Janeiro (L. Gordinho).

Setúbal, Alcácer do Sal, Açude da Murta, 1 ind., 1 de Dezembro (P. Pereira, M. Caetano, E. Gomes).

Comentário: a permanência de alguns indivíduos durante o Inverno é conhecida para algumas zonas húmidas do Algarve, estando os registos aqui apresentados fora destas áreas conhecidas.

Goraz *Nycticorax nycticorax*

2006 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 4 inds., 5 de Agosto (J.L. Almeida).

Évora, Alandroal, Alb. do Alqueva, nidificação de 14 casais, 27 de Maio (J.L. Almeida, L. Venâncio).

Leiria, Leiria, Rio Lis, 1 ad., 19 de Maio e 2 de Junho (anon.).

Setúbal, Alcochete, Sitio das Hortas: 18 inds., 27 de Janeiro (J. Viana); 19 inds., 27 de Fevereiro (J. Jara).

2007 – Évora, Alandroal, Juromenha, Alb. do Alqueva, 2 juvs., 29 de Junho (J.L. Almeida).

Faro, Castro Marim, Alb. de Beliche, 3 inds., 16 de Julho (K. Searle, K. Philipps).

Comentário: um registo de nidificação fora dos locais conhecidos como de ocorrência regular de reprodução, concentrações importantes para esta espécie rara, e ainda observações fora dos locais habituais de

ocorrência da espécie.

Papa-ratos *Ardeola ralloides*

2006 – Aveiro, Estarreja, Salreu, 1 ind., 17 e 19 de Maio (A. Pereira, R. Brito).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 3 inds., 22 de Junho (J.L. Almeida).

Évora, Alandroal, Alb. do Alqueva, nidificação de 2 casais, 27 de Maio (J.L. Almeida).

Faro, Castro Marim, perto de Corte Velha, 2 ads., 25 de Maio (L. Gordinho).

Santarém, Coruche, Quinta Grande, 1 ind., 20 de Dezembro (R. Matias, J. Andrade).

Setúbal, Grândola, Foros da Carregueira, 1 ind., 12 de Janeiro (C. Pereira).

2007 – Évora, Alandroal, Juromenha, Rib. de Mures, 2 inds., 28 de Abril (J.L. Almeida);

Mourão, Herdade do Espargueiro, 1 ind., 11 de Agosto (J.L. Almeida, M. David).

Setúbal, Alcácer do Sal, arrozais da Praça de Touros: 1 ind., 12 de Janeiro (P. Lourenço), 3

inds., 10 de Agosto (A. Gonçalves), 4 inds., 27 de Outubro (R. Caratão, P. Gomes); Alcácer do Sal,

Moinho da Ordem, 2 inds., 25 de Dezembro (C. Pereira).

Comentário: observação em locais pouco habituais para a espécie, e ainda registos que ilustram a presença da espécie durante o Inverno fora do Algarve, região esta onde é conhecida a ocorrência regular de registos durante este período. Destaque para a nidificação na Albufeira do Alqueva e para outros registos em data e local adequados à reprodução.

Carraceiro *Bubulcus ibis*

2005 – Viana do Castelo, Viana do Castelo, Veiga da Areosa, 30 inds., 4 de Dezembro (M. Cardoso, R. Marcão).

2006 – Aveiro, Murtosa, Ponta da Varela, 35 inds., 18 de Março (J.P. Tavares).

2007 – Aveiro, Murtosa, Ria de Aveiro, Bico do Muranzel, 34 inds., 6 de Outubro (J.P. Tavares).

Comentário: concentrações no noroeste do país, região onde a espécie é rara.

Garça-branca-grande *Casmerodius albus*

2006 – Braga, Esposende, Apúlia, 1 ind., 5 a 19 de Janeiro (A. Farinha).

Castelo Branco, Castelo Branco, Monte do Pombal, 2 inds., 1 de Abril (A.H. Leitão, C. Pacheco, D. Querido); Castelo Branco, Monte

das Corgas, 4 inds., 30 de Novembro (R. Lima, A. Montoya).

Coimbra, Figueira da Foz, Estuário do Mondego, 6 inds., 21 de Janeiro (R. Lopes).

Évora, Mourão, Herdade do Espargueiro, 3 inds., 21 de Outubro (J.L. Almeida).

2007 – Aveiro, Águeda, Pateira de Fermentelos, 1 ind., 16 de Novembro e 2 de Dezembro (S. Marques); Aveiro, zona norte da Ria, 8 inds., 17 de Novembro (A. Luís).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos: 22 ind., 8 de Janeiro (M. Armelin, D. Hurst) e 20 de Outubro (J.L. Almeida).

Castelo Branco, Castelo Branco, Rio Pônsul, 2 inds., 10 de Fevereiro (R. Lima, A. Montoya).

Coimbra, Figueira da Foz, Quinta do Canal, 6 inds., 1 de Março (D. Rodrigues); Montemor-o-Velho/Coimbra, Paul de Arzila, 6 inds., 21 de Outubro (G. Anacleto).

Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, 4 inds., 5 de Fevereiro (L. Gordinho); Montemor-o-Novo, Albs. da Anta e Poço da Rua, 12 inds., 8 de Novembro (M. Caetano, L. Guilherme).

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 4 inds., 24 de Agosto (J.L. Almeida).

Portalegre, Arronches, Alb. do Caia, 3 inds., 27 de Outubro (L. Venâncio).

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 5 inds., 8 de Novembro (C. Noivo).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 8 inds., 29 de Setembro (R. Silva); Alcochete, Ribeira das Enguias, 18 inds., 18 de Novembro (J. Jara).

Comentário: apesar de continuar a ser uma espécie pouco frequente o número de indivíduos observados tem aumentado, assim como se tem verificado uma expansão da área de ocorrência desta espécie.



Garça-branca-grande, Paul de Arzila, Outubro de 2007 (Gabriel Anacleto)

Garça-real *Ardea cinerea*

2006 – Beja, Moura, Rib^a. de Alcarrache, ninho com 2 juvs., 1 de Junho (L. Gordinho).

2007 – Évora, Évora, Alb. do Alqueva, Rio Degebe, 7 inds. em ninhos, 5 de Fevereiro (L. Gordinho); Alandroal, Várzea Redonda, 3 ninhos, 27 de Fevereiro (L. Gordinho).

Portalegre, Arronches, Santa Eulália, 2 ninhos com crias, 7 de Março (C. Pacheco, L. Venâncio).

Comentário: registos em locais de colonização recente como reprodutor.

Garça-vermelha *Ardea purpurea*

2006 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, nidificação de 1 casal, 11 de Junho (J.L. Almeida).

Viana do Castelo, Ponte de Lima, Lagoa de Bertandos, 1 ind., 17 a 19 de Março (E. Gonçalves).

2007 – Beja, Moura, charca a E de Santo Amador, 2 inds., 4 e 5 de Junho (C. Pacheco).

Braga, Esposende, Estuário do Cávado, 1 juv., 16 de Julho (G. Alexander).

Portalegre, Avis, Ribeira de Seda, 2 inds., 15 de Julho (J.L. Almeida); Castelo de Vide, Alb. da Póvoa, 1 ind., 5 de Agosto (F. Canário).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Melides, 1 ind., 3 de Novembro (J. Garzón).

Comentário: observações fora dos locais habituais para a espécie e um registo tardio.

Cegonha-preta *Ciconia nigra*

2006 – Aveiro, Estarreja, Salreu, 3 inds., 30 de Agosto (F. Leão).

Castelo Branco, Covilhã, Ponte Pedrinha, 9 inds., 17 de Setembro (A. Fonseca).

Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal, 1 juv., 23 de Novembro (H. Cardoso, D. Rodrigues).

Faro, Vila do Bispo, Sagres, 16 inds., 13 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor); Vila do Bispo, Cabranosa, 23 inds., 29 de Outubro (S. Wates).

Setúbal, Sesimbra, Cabo Espichel, 1 juv., 14 de Outubro (J.L. Santos, F.L. Santos).

Viana do Castelo, Caminha, Praia de Moledo, 2 inds., 12 de Agosto (M. Sant'ana).

Vila Real, Chaves, Várzea do Tâmega, 4 inds., 2 de Setembro (M. Fachada).

2007 – Bragança, Vinhais, sobre a vila, 1 ind., 8 de Maio (J. Branco).

Faro, Monchique, Rib^a. de Joana Mendes, 3 inds., 12 de Dezembro (A. Dias, R. Ferreira).

Comentário: registos de algumas concentrações elevadas e em locais onde a presença da cegonha-preta é pouco comum; ainda um registo de Inverno no Algarve, período em que a sua presença é rara nesta região.

Cegonha-branca *Ciconia ciconia*

2006 – Braga, Esposende, Rib^a. da Fonte Boa, 1 casal a criar, 27 de Abril (J. Jaques).

Faro, S. Brás de Alportel, aterro sanitário de Cortelha, 1200 inds., 2 de Agosto (G. Rosa, T. Marques); Silves, Várzea de Odolouca, 1038 inds., 30 de Agosto (A.H. Leitão).

Porto, Santo Tirso, 3 inds. na cidade, 13 de Março (N. Ribeiro); Porto, sobre a cidade, 6 inds., 26 de Junho (A.C. Pereira).

Viana do Castelo, Ponte de Lima, Carvalho, 1 ind., 9 de Junho (G. Alexander).

Comentário: duas concentrações elevadas e registos no extremo nordeste de Portugal, onde esta espécie é rara.

Íbis-preta *Plegadis falcinellus*

2006 – Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, 9 inds., 10 de Setembro (J.L. Almeida).

Santarém, Benavente, Paul do Trejoito, 62 inds., 16 de Fevereiro (P. Lourenço).

Setúbal, Alcácer do Sal, Moinho da Ordem, 77 inds., 7 de Março (P. Lourenço).

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 21 inds., 1 de Julho (J.L. Almeida, M. David).

Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, Atalaia das Ferrarias, 9 inds., 20 de Janeiro (J.L. Almeida).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 42 inds., 3 de Setembro (H. Costa).

Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 1 ind., 5 de Janeiro (H. Cardoso).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 386 inds., 5 de Agosto (A. Gonçalves); Oeiras, Tagus Park, 1 ind., 2 de Dezembro (M. Costa).

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 2 ads., Abril a Julho (C. Noivo).

Setúbal, Sesimbra, Lagoa Pequena, 1 ind., 1 de Novembro (M. Estevens, J. Simão, M. Castro); Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 37 inds., 15 de Dezembro (M. Caetano, P. Pereira, E. Gomes, D. Medinas); Alcochete, Barroca d’Alva, 372 inds., 28 de Dezembro (J. Guilherme); Palmela, Zambujal, 162 inds., 27 de Dezembro (P. Lourenço).

Comentário: espécie rara durante o século passado, tem vindo a aumentar o nº e frequência de forma acentuada nos últimos anos. Apresentam-se concentrações elevadas tendo em conta os locais, assim como observações em zonas húmidas onde a presença desta espécie é pouco comum.

Colhereiro *Platalea leucorodia*

2006 – Aveiro, Águeda, Pateira de Fermentelos, 1 juv., 12 de Agosto (R. Rocha).

Braga, Esposende, Fão, 2 inds., 24 de Setembro (G. Alexander).

Évora, Alandroal, Alb. do Alqueva, nidificação de 2 casais, 27 de Maio (J.L. Almeida, L. Venâncio).

Porto, Gaia, Cabedelo, 1 ind., 14 de Outubro (P. Guimarães).

Viana do Castelo, Caminha, Estuário do Minho, 2 inds., 7 de Outubro (M. Cardoso e outros).

2007 – Aveiro, Estarreja, Salreu, 42 inds., 28 de Março e 2 de Abril (R. Brito).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 206 inds., 29 de Setembro (J.L. Almeida);

Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua, 74 inds., 15 de Agosto (M. Caetano).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo: 200 inds., 12 de Julho (L. Gordinho); 500 inds., 19 de Setembro (R. Tipper, D. Taylor).

Viana do Castelo, Caminha, Estuário do Minho, 3 inds., 29 de Dezembro (T. Rodrigues).

Comentário: concentrações elevadas para esta espécie, e observações em zonas húmidas do litoral norte, onde a espécie é rara. Apresentamos ainda um registo de nidificação na albufeira do Alqueva, que constitui local de colonização recente para a espécie.

Framingo-comum *Phoenicopterus roseus*

2006 – Coimbra, Figueira da Foz, Ilha da Murraceira, 1050 inds., 5 de Outubro (D. Rodrigues);

Portalegre, Arronches, Alb. do Caia, 3 juvs., 26 de Setembro a 11 de Outubro (L. Venâncio).

2007 – Aveiro, Murtosa, braço norte da Ria de Aveiro, 500 inds., 10 de Agosto a 2 de Setembro (J.P. Tavares).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 376 inds., 5 de Outubro (J.L. Almeida).

Évora, Montemor-o-Novo, Alb. da Caldeira, 240 inds., 18 de Agosto (C. Pereira, C. Vilhena, P. Vilhena e outros).

Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 54

inds., 24 de Dezembro (P. Fernandes).

Santarém, Benavente, Paul de Belmonte, 440 inds., 23 e 24 de Janeiro (N. Cidraes-Vieira); Golegã, Paul do Boquilobo, 52 inds., 19 de Novembro (C. Noivo).

Comentário: registos de concentrações elevadas em locais onde até há pouco tempo a espécie ocorria raramente.

Peneireiro-cinzeno *Elanus caeruleus*

2006 – Vila Real, Montalegre, Tourém, 1 ind., 25 de Julho (C. Pereira).

2007 – Lisboa, Vila Franca de Xira, lezírias da Ponta da Erva, 38 inds., 18 de Julho (A.H. Leitão, J. Jara).

Portalegre, Elvas, próximo de Terrugem, 7 casais com ninho em construção ou já a incubar numa área com cerca de 13,5ha, 4 de Março (C. Pacheco).

Comentário: uma concentração elevada, um registo distante da área habitual de ocorrência, e um registo interessante de reprodução em regime semi-gregário, pouco habitual na Península Ibérica.

Milhafre-preto *Milvus migrans*

2006 – Évora, Arraiolos, Herdade da Mesquita, 1 ind., 4 de Fevereiro (A.H. Leitão). **Faro**, Vila do Bispo, Vale Santo, 1 ind., 1 de Novembro (P. Pinto).

2007 – Évora, Évora, Alb. de N^a. Sr^a. da Tourega, 1 ind., 12 de Janeiro (P. Pereira).

Comentário: dois registos bastante precoces e um registo tardio para este migrador estival.

Milhafre-real *Milvus milvus*

2007 – Portalegre, Monforte, Prazeres, dormitório com 72 inds., 4 de Fevereiro (J.L. Almeida).

Comentário: registo importante pelo número de aves envolvidas.

Britango *Neophron percnopterus*

2006 – Faro, Vila do Bispo, Sagres, 1 ind., 1 a 15 de Dezembro (C. Noivo, A. Palavra, R. Tipper).

2007 – Beja, Castro Verde, Rib^a. de Maria Delgada, 1 ind. de 1^o calendário, 11 de Dezembro (P. Pereira).

Comentário: observações em datas tardias para esta espécie estival.

Grifo *Gyps fulvus*

2006 – Faro, Vila do Bispo, Sagres, 860 inds., 12 de Outubro (S. Holmes).

Lisboa, Cascais, S. Domingos de Rana, 1 ind., 12 de Novembro (R. Tomé, T. Tomé).

Setúbal, Alcácer do Sal, St^a. Catarina, 1 ind., 18 de Novembro (C. Vilhena).

Vila Real, Montalegre, Planalto da Mourela, 12 inds., 14 de Maio (C. Pereira, M. Pimenta, M.L. Santarém, D. Gonçalves, A. Machado).

2007 – Lisboa, Loures, saída da A8 para Lousa, 1 ind., 11 de Agosto (N. Sarmento).

Portalegre, Arronches, Herdade do Rico, 250 inds., 13 de Maio (L. Venâncio).

Setúbal, Seixal, Pinhal de Frades, 1 ind., 20 de Outubro (C. Pacheco, G. Rosa); Sesimbra, Rib^a. da Apostiça, 10 inds., 1 de Novembro (M. Estevens, J. Simão, M. Castro).

Comentário: duas concentrações elevadas para o nosso território e observações fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.



Abutre-preto, Herdade da Achada, Março de 2007 (Ricardo Guerreiro)

Águia-cobreira *Circus gallicus*

2006 – Faro, Vila do Bispo, Vale Santo, 20 inds., 1 de Dezembro (C. Noivo, A. Palavra).

Lisboa, Sintra, Serra de Sintra, 1 ind., 15 de Dezembro (A. Pena); Sintra, Monge, 2 inds., 24 de Dezembro (N. Mezia).

2007 – Évora, Montemor-o-Novo, Serra de Monfurado, 1 ind., 28 de Dezembro (M. Caetano).

Comentário: uma concentração elevada para esta espécie, e registos de Inverno em locais onde a sua presença não é habitual.

Águia-sapeira *Circus aeruginosus*

2006 – Beja, Aljustrel, Alb. da Aroeira, 1 fêmea, 13 de Maio (T. Marques, G. Rosa); Castro Verde, Casével, 1 ind., 24 de Junho (G. Rosa).

2007 – Beja, Beja, Monte da Apariça, 1 casal com 2 crias, 20 de Junho (C. Pacheco).

Comentário: *observações em habitat pouco utilizado por esta espécie no nosso país.*

Tartaranhão-cinzento *Circus cyaneus*

2006 – Aveiro, Estarreja, Salreu, 1 fêmea, 28 de Abril (J. Neto).

Faro, Castro Marim, Azinhal, 1 macho, 19 de Abril (N. Fonseca).

Comentário: *registos tardios em zonas de Invernada.*

Açor *Accipiter gentilis*

2006 – Faro, Portimão, Morgado do Reguengo, 1 fêmea adulta, 17 de Julho e 9 de Agosto (N. Fonseca).

2007 – Faro, Castro Marim, Azinhal, 1 fêmea, 15 de Maio (N. Fonseca); Lagos, 7 kms a norte de Bensafrim, 1 ind. em parada, 27 de Abril (S. Wates); S. Brás de Alportel, Parises, ninho com 2 crias, 15 de Maio (J.T. Tavares, A.H. Leitão, L. Palma).

Comentário: *registos que ilustram a presença desta espécie como reprodutora no extremo sul do território continental.*

Águia-imperial-ibérica *Aquila adalberti*

2006 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 juv., 6 de Julho (C. Viney).

Portalegre, Elvas, 1 imaturo nas imediações da cidade, 18 de Março (L. Venâncio); Elvas, Torre da Bolsa, 1 ind., 2 de Abril (N. Domingos).

2007 – Évora, Vidigueira, Serra de Portel, 1 ad., 27 de Fevereiro (J. Rodrigues).

Faro, Vila do Bispo, Cabranosa, 1 juv., 6 de Outubro (J. Ministro, S. Wates e outros).

Portalegre, Avis, Alb. do Maranhão, 1 sub-ad., 8 de Julho (J.L. Almeida).

Comentário: *observações fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Águia-real *Aquila chrysaetos*

2006 – Faro, Alcoutim, Martim Longo, 1 imat., 13 de Maio (G. Schreier, R. Schmiegelt); Vila do Bispo, Cabranosa, 1 juv., 1 de Outubro (C. Key, R. Eufrásia).

Lisboa, Cadaval, Serra de Montejunto, 1 ind., 20 de Setembro (P. Marques).

2007 – Guarda, Seia, 3 kms a norte de Seia, 1 ad., 15 de Novembro (C. Pacheco, R. Neves).

Santarém, Benavente, entre Bate-Orelhas e Vasa-Sacos, 1 imat., 3 de Fevereiro (J. Jara); Benavente, Herdade de Pancas, 1 juv., 10 de Março (J. Rodrigues).

Comentário: *registos fora dos locais habituais de ocorrência desta espécie.*

Águia-calçada *Hieraaetus pennatus*

2006 – Évora, Mourão, Malhadas da Ameada, 1 ind., 28 de Dezembro (L. Gordinho);

Faro, Faro, Ludo, 7 inds., 22 de Dezembro (P. Dedicat, J. Taylor, G. Schreier).

Lisboa, Oeiras, Linda-a-Velha, 1 ind., 5 de Dezembro (J. Guilherme).

Portalegre, Elvas, Monte da Alagada, 1 ind., 11 de Dezembro (L. Gordinho).

2007 – Évora, Évora, Alb. de N^a. Sr^a. da Tourega, 1 ind., 19 de Janeiro (N. Mezia).

Faro, Faro, Ludo: 5 inds., 8 de Fevereiro (C. Viney); 11 inds., 10 de Março (C. Viney); Vila do Bispo, Sagres, 520 inds., 2 de Outubro (R. Tomé, H. Costa e outros).

Lisboa, Lisboa, Lumiar, 1 ind., 6 de Janeiro (P. Catry).

Portalegre, Elvas, perto do Rio Caia, 1 ind., 30 de Janeiro (L. Gordinho).

Comentário: *registos de Inverno fora do Algarve, uma concentração de Inverno invulgar e uma concentração elevada de aves em passagem migratória por Sagres.*

Águia de Bonelli *Hieraaetus fasciatus*

2006 – Faro, Castro Marim, Azinhal, 1 ad., 21 de Julho (N. Fonseca).

Setúbal, Alcácer do Sal, Herdade do Pinheiro: 1 ad., 21 de Janeiro (J.T. Tavares, J. Neiva, D. Viana); mesmo local, 2 ads., 28 de Março (C. Pereira, J. Ministro); Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 2 inds., 11 de Novembro (M. Armelin, D. Hurst).

2007 – Lisboa, Loures, Vale do Trancão, 1 ad. e 1 sub-ad., 22 de Julho (C.D. Santos, J. Rodrigues).

Comentário: *registos fora dos locais habituais de ocorrência desta espécie.*

Águia-pesqueira *Pandion haliaetus*

2006 – Bragança, Miranda do Douro, Alb. de

Miranda do Douro, 1 ind., 29 e 30 de Abril (C.D. Romai).

Faro, Vila do Bispo, entre Beliche e Martinhal, 2 inds., 1 de Dezembro (C. Noivo, A. Palavra).

Porto, Gaia/Porto, Estuário do Douro, 1 ind., 31 de Dezembro (P. Cardia, A.S. Pinto).

2007 – Faro, Aljezur, Rib^a. de Aljezur: 1 ad., 1 de Julho (A.H. Leitão) e 3 de Setembro (N. Macedo, T. Macedo); S. Brás de Alportel, Moinhos da Menta, 2 juvs., 10 de Outubro (J.T. Tavares, G. Schreier); Monchique, Serra de Monchique, 1 ind., 4 de Novembro (J.L. Almeida).

Comentário: *observações em locais onde a presença desta águia é rara, e observações em período estival perto do último local de reprodução conhecido para Portugal Continental.*

Francelho *Falco naumanni*

2006 – Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal, 2 fêmeas, 21 de Março (H. Cardoso).

Faro, Faro, Vale de Carneiros, 1 macho, 27 de Outubro (N. Fonseca).

Comentário: *observações fora da área tradicional de ocorrência da espécie.*

Esmerilhão *Falco columbarius*

2006 – Beja, Odemira, Cabo Sardão, 1 fêmea/imat., 10 de Dezembro (A.H. Leitão).

Évora, Portel, cerca de 3 km a sul de Portel, 1 ind., 3 de Fevereiro (P. Pereira); Évora, S. Mansos, 1 ind., 10 de Novembro (P. Pereira).

Faro, Vila do Bispo, Vale Santo: 1 ind., 12 de Outubro (S. Holmes); 1 fêmea/imat., 6 de Novembro (S. Wates).

2007 – Beja, Odemira, Touril de Baixo, 1 fêmea/imat., 10 de Janeiro (A.H. Leitão); Odemira, Estibeira, 1 macho, 11 de Dezembro (A.H. Leitão).

Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal, 1 ind., 9 de Janeiro (H. Cardoso, P. Tenreiro, D. Rodrigues).

Évora, Mora, Ribeira de Raia, 1 macho, 23 de Dezembro (G. Dias).

Faro, Vila do Bispo, Hortas do Tabual, 1 macho, 21 de Março (S. Wates); Castro Marim, Azinhal, 1 macho, 14 de Novembro (N. Fonseca).

Porto, Porto, saída do Carvalhido na VCI, 1 macho, 18 de Novembro (M. Poot, P. Geraldès, P.C. Rodrigues).

Comentário: *registos desta invernante rara em locais onde a presença é pouco habitual.*

Falcão-da-rainha *Falco eleonorae*

2006 – Faro, Vila do Bispo, Cabranosa, 1 ind., 30 de Setembro (R. Eufrásia).

2007 – Beja, Mértola, Mina de S. Domingos, 1 ad. fase clara, 4 de Junho (C.C. Moore).

Faro, Monchique, Serra de Monchique, 1 ad., 21 de Agosto (J.L. Almeida); Vila do Bispo, Vale Santo: 1 ad., 25 de Agosto (J. Ministro); 1 ind. de 2º calendário, 1 de Setembro (S. Wates); Vila do Bispo, Cabranosa: 1 ad., 3 de Setembro (S. Wates, T. Marques); 1 juv., 6 de Setembro (A.H. Leitão, G. Foggytt).

Leiria, Nazaré, Sítio, 3 inds., 29 de Maio (J. Ximénis).

Comentário: *espécie de ocorrência rara no nosso território.*

Galeirão-comum *Fulica atra*

2007 – Faro, Castro Marim, ETAR de Castro Marim, 2 crias com 1 semana, 25 de Fevereiro (A. García).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 21000 inds., 11 de Dezembro (A.H. Leitão).

Comentário: *uma concentração bastante elevada e um registo de reprodução em data precoce.*

Grou *Grus grus*

2006 – Aveiro, Aveiro, estrada para Cacia, 1 ind., 24 de Dezembro (J.P. Tavares).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Pousada José da Mota, 1 ind., 30 de Outubro (R. Lima, S. Infante, S. Vieira, A. Montoya).

2007 – Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 1 imat., 21 de Março (C. Noivo, F. Canais).

Comentário: *registos em locais de presença pouco habitual para esta espécie.*

Abetarda *Otis tarda*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 macho imat., 4 de Julho (J. Ministro, R. Eufrásia, N. Correia).

Setúbal, Grândola, Silha do Pascoal, 2 inds. em voo, 4 de Junho (C. Vilhena).

Comentário: *observações feitas fora das áreas tradicionais de ocorrência da espécie.*

Ostraceiro *Haematopus ostralegus*

2007 – Faro, Portimão, Ria de Alvor, 248 inds., 24 de Agosto (J.L. Almeida).

Comentário: *uma concentração elevada para esta espécie.*

Pernilongo *Himantopus himantopus*

2006 – Braga, Esposende, Estuário do Cávado, 3 inds., 10 de Maio (J. Jaques).

Évora, Mourão/Alandroal, Alb. do Alqueva, nidificação de 239 casais, 20 a 30 de Maio (J.L. Almeida).

2007 – Aveiro, Aveiro, Salinas das Pirâmides: 27 inds., 5 de Janeiro (A. Reis); 60 inds., 24 de Novembro (R. Cordeiro).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 625 inds., 12 de Julho (L. Gordinho).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 1200 inds., 22 de Julho (A.H. Leitão).

Comentário: *duas concentrações elevadas, um registo fora dos locais habituais e dois registos que ilustram a invernada a norte do Tejo, facto não registado até há poucos anos.*

Alfaiate *Recurvirostra avosetta*

2006 – Évora, Alandroal, Alb. do Alqueva, Várzea Redonda, 36 inds., 11 de Dezembro (L. Gordinho); Reguengos de Monsaraz, Alb. do Esporão, 1 ind., 18 de Dezembro (L. Gordinho).

2007 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1084 inds., 16 a 19 de Janeiro (L. Gordinho).

Santarém, Benavente, Vale Frades, 2 inds., 4 de Junho (A. Gonçalves).

Comentário: *uma concentração elevada, uma observação fora da área de reprodução tradicional, em data e local adequados à reprodução. Apresentam-se ainda registos em zonas húmidas do interior, onde esta espécie é de ocorrência rara.*

Alcaravão *Burhinus oedicnemus*

2006 – Faro, Vila do Bispo, Praia do Zavial, 52 inds., 19 de Janeiro (S. Wates).

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 65 inds., 8 de Janeiro (M. Armelin, D. Hurst).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 70 inds., 28 de Outubro e 30 de Dezembro (P. Dediccoat, J. Taylor); Faro, perto do Aeroporto, 55 inds., 11 de Dezembro (G. Schreier).

Comentário: *observações importantes pelos números envolvidos algo elevados.*

Perdiz-do-mar *Glareola pratincola*

2006 – Évora, Mourão/Alandroal, Alb. do Alqueva, total de 325 casais, 20 a 30 de Maio (J.L. Almeida).

2007 – Faro, Portimão, Ria de Alvor, 2 inds., 9 de Abril (C. Key).

Lisboa, Azambuja, junto à praia fluvial da Azambuja, 2 ads., 20 de Junho (D. Leitão).

Comentário: *uma observação que ilustra a colonização da albufeira do Alqueva, e registos fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Borrelho-pequeno-de-coleira

Charadrius dubius

2006 – Santarém, Benavente, entre Vasa-Sacos e Bate-Orelhas, 2 inds., 26 de Dezembro (J. Jara).

2007 – Beja, Alvito, Monte Ruivo, 6 inds., 8 de Janeiro (M. Armelin, D. Hurst).

Évora, Mourão, perto da Alb. de Mourão, 3 inds., 4 de Janeiro (L. Gordinho); Montemor-o-Novo, Alb. da Anta, 5 inds., 31 de Dezembro (M. Caetano); Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua, 15 inds., 14 de Dezembro (M. Caetano).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind., 30 de Dezembro (P. Dediccoat, J. Taylor).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 2 inds., 22 de Dezembro (A. Gonçalves).

Comentário: *limícola rara como invernante em Portugal.*

Borrelho-grande-de-coleira

Charadrius hiaticula

2006 – Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, Alto do Zambujeiro, 6 ads., 10 de Maio (L. Gordinho); Reguengos de Monsaraz, Alb. do Esporão, 7 ads., 12 de Maio (L. Gordinho).

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 10 inds., 20 de Agosto (P. Pereira, M. Caetano).

Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua: 5 inds., 5 de Setembro (M. Caetano, P. Pereira, E. Gomes); 5 inds., 29 de Dezembro (C. Pereira, C. Vilhena, R. Ceia).

Portalegre, Elvas, Alb. do Caia, 32 inds., 19 de Maio (L. Venâncio).

Comentário: *esta espécie tem vindo a ser registada com mais frequência em zonas húmidas do interior, pelo que apenas colocamos as concentrações mais importantes registadas.*

Borrelho-de-coleira-interrompida*Charadrius alexandrinus*

2006 – Évora, Montemor-o-Novo, Alb. da Caldeira, 10 inds., 21 de Janeiro (C. Pereira, C. Vilhena, A. Chambel, P. Vilhena); Mourão, Alb. de Mourão, 2 inds., 13 de Dezembro (L. Gordinho).

2007 – Évora, Mourão, Alb. de Mourão, 1 ad., 23 de Fevereiro (L. Gordinho); Reguengos de Monsaraz, Alb. do Esporão, 2 ads., 23 de Fevereiro (L. Gordinho); Montemor-o-Novo, Albs. do Poço da Rua e das Banhas, 20 inds., 18 de Agosto (C. Pereira, C. Vilhena, P. Vilhena e outros).

Comentário: espécie raramente observada em zonas húmidas distantes do litoral.

Borrelho-ruivo *Charadrius morinellus*

2006 – Faro, Vila do Bispo, arribas a norte da Praia do Telheiro, 1 ind., 1 de Novembro (M. Telfer).

2007 – Beja, Castro Verde, perto de Rolão, 5 inds., 13 de Setembro (S. Webster, C. Webster, S. Wates); Odemira, Cabo Sardão, 7 inds., 2 de Novembro (C.C. Moore).

Faro, Vila do Bispo, Vale Santo: 5 inds., 5 de Setembro (C. Pereira); 1 ind., 3 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor).

Comentário: registos na migração pós-nupcial desta espécie rara em Portugal.

Tarambola-dourada *Pluvialis apricaria*

2007 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 28 de Maio (D. Hurst); Vila Real de Santo António, perto do Sapal do Rato, 1 ind., 10 de Julho (L. Gordinho).

Comentário: registos em datas atípicas para a presença desta espécie no nosso território.

Tarambola-cinzenta *Pluvialis squatarola*

2006 – Portalegre, Elvas, Alb. do Caia, 1 ind., 6 a 15 de Maio (L. Venâncio).

2007 – Portalegre, Elvas, Alb. do Caia, 3 inds., 19 de Maio (L. Venâncio).

Comentário: registos no interior onde esta espécie é raramente observada.

Abibe *Vanellus vanellus*

2006 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 4 juvs. não-voadores, 22 de Junho (J.L. Almeida).

2007 – Beja, Cuba, Monte da Palheta, 1 casal com 2 crias, 1 de Junho (T. Marques); Alvito, Lagoa dos Patos, 80 inds. incluindo 4 juvs. recém-voadores, 7

de Julho (J.L. Almeida).

Comentário: registos de nidificação desta espécie reprodutora rara e irregular no nosso país.

Seixoeira *Calidris canutus*

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 3 inds., 5 de Outubro (A. Gonçalves).

Comentário: registo de interior desta espécie que em Portugal ocorre basicamente em estuários.

Pilrito-das-praias *Calidris alba*

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 1 ind., 5 de Outubro (A. Gonçalves).

Comentário: espécie escassamente registada em zonas húmidas do interior.

Pilrito de Temminck *Calidris temminckii*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 16 de Maio (R. Eufrásia); Faro, Salgados de Faro, 3 inds., 16 de Dezembro (M. Mendes, R. Eufrásia).

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 1 ad., 14 de Maio (C.C. Moore).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 14 de Maio (R. Skan, J. Winsper); Castro Marim, Cerro do Bufo: 1 ind., 17 de Agosto (J. Jara); 2 inds., 19 de Setembro (R. Tipper, D. Taylor).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 1 ad., 25 de Agosto e 1 juv., 7 de Outubro (C.C. Moore).

Setúbal, Palmela, Zambujal, 2 juvs., 21 de Outubro (C.C. Moore); Alcochete, Barroca d'Alva, 1 ind., 15 de Dezembro (A. Gonçalves).

Comentário: espécie de ocorrência rara em Portugal.

Pilrito-de-bico-comprido *Calidris ferruginea*

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos: 1 ind., 20 de Agosto (M. Caetano, P. Pereira); 5 inds., 5 de Outubro (A. Gonçalves).

Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua, 8 inds., 22 de Setembro (M. Caetano).

Comentário: limícola raramente observada no interior do território.

Pilrito-escuro *Calidris maritima*

2007 – Faro, Lagos, Praia D. Ana, 1 ind., 1 de Janeiro (P. Pereira).

Comentário: observação no Algarve onde a espécie raramente é registada.

Narceja-galega *Lymnocyptes minimus*

2006 – Beja, Castro Verde, Rib^a. de Maria Delgada, 1 ind., 28 de Dezembro (P. Pereira).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 4 inds., 28 de Dezembro (T. Valkenbrug, J. Valkenburg, R. Eufrásia).

Lisboa, Vila Franca de Xira, junto às Marinhas da Saragoça, 5 inds., 15 de Março (C. Pereira).

Santarém, Benavente, várzea de Samora Correia: 5 inds., 12 de Fevereiro (C. Pereira); 10 inds., 21 de Dezembro (C. Pereira).

Setúbal, Grândola, Arrozaís da Comporta: 10 inds., 1 de Janeiro (C. Pereira, J. Pereira), 5 inds., 26 de Fevereiro (C. Pereira, P. Geraldés, A.H. Leitão); Grândola, Carvalhal, 4 inds., 12 de Janeiro (C. Pereira); Alcácer do Sal, Moinho da Ordem: 9 inds., 19 de Janeiro (C. Pereira); 4 inds., 21 de Dezembro (C. Pereira).

Vila Real, Chaves, Várzea do Tâmega, 1 ind., 2 de Setembro (M. Fachada).

2007 – Évora, Alandroal, Alb. do Alqueva, Rib^a. do Lucefécit, 1 ind., 1 de Fevereiro (L. Gordinho).

Comentário: registos importantes pelos números envolvidos, desta espécie raramente observada no nosso território, assim como observações em locais onde é pouco habitual a sua presença, como as zonas de Chaves, Alqueva e Castro Verde.

Narceja-comum *Gallinago gallinago*

2006 – Faro, Portimão, Alb. dos Álamos, 1 ind., 1 de Junho (N. Fonseca); Castro Marim, Salinas de Castro Marim, 1 ind., 17 de Julho (M. Caetano, P. Pereira, G. Dias, E. Gomes, D. Medinas).

Comentário: registos em datas precoces para esta invernante.

Maçarico-de-bico-direito *Limosa limosa*

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 764 inds., 25 de Fevereiro (J.L. Almeida).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1325 inds., 17 de Janeiro (L. Gordinho); mesmo local, 1750 inds., 12 de Julho (L. Gordinho).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 400 inds., 1 de Abril (L. Gordinho).

Comentário: registos de concentrações importantes tendo em conta os locais das observações.

Fuselo *Limosa lapponica*

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 2 inds., 11 de Março (P. Pereira, M. Caetano, E. Gomes, G.

Dias, F. Paiva).

Comentário: espécie raramente registada fora das grandes zonas estuarinas.

Maçarico-galego *Numenius phaeopus*

2007 – Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua, 1 ind., 5 de Agosto (M. Caetano, P. Pereira).

Comentário: limícola pouco frequente no interior do território.

Maçarico-real *Numenius arquata*

2007 – Portalegre, Elvas, Alb. do Caia, 2 inds., 13 de Maio (L. Venâncio).

Comentário: observação no interior onde a espécie é escassamente registada.

Perna-vermelha-bastardo *Tringa erythropus*

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 4 inds., 5 de Outubro (A. Gonçalves).

Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua, 2 inds., 22 de Setembro (M. Caetano).

Faro, Castro Marim, Sapal de Castro Marim, 40 inds., 9 a 12 de Julho (L. Gordinho).

Comentário: observações de passagem pelo interior do território, onde é rara a sua presença e uma concentração invulgar pelos números envolvidos.

Perna-vermelha-comum *Tringa totanus*

2006 – Évora, Arraiolos, Vale Melão, 5 inds., 4 de Fevereiro (A.H. Leitão); Montemor-o-Novo, Albs. da Caldeira e da Defesa Grande, 4 inds., 12 de Março (C. Pereira, A. Pereira, C. Vilhena, M. David, R. Tomé).

Faro, Tavira, Salinas de Santa Luzia, 2 ads. com comportamento de defesa de território, 30 de Junho (A.H. Leitão); Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind. com comportamento agressivo para com o obs., 6 de Julho (C. Viney).

Comentário: concentrações em zonas húmidas do interior, onde a espécie é rara, e dois registos de possível nidificação desta limícola rara como reprodutora.

Perna-verde *Tringa nebularia*

2006 – Évora, Évora, Alb. de N^a. Sr^a. da Tourega, 7 inds., 13 de Outubro (P. Pereira).

2007 – Évora, Montemor-o-Novo, Alb. do Poço da Rua, 8 inds., 22 de Setembro (M. Caetano); Évora, Alb. de N^a. Sr^a. da Tourega, 14 inds., 26 de Setembro e 19 de Outubro (M. Caetano, L.

Guilherme, P. Silva, C. Ferreira).

Setúbal, Seixal, Ponta dos Corvos, 60 inds., 11 de Setembro (H. Costa).

Comentário: concentrações importantes em zonas húmidas do interior onde a espécie é rara, e uma concentração elevada para esta espécie na zona do Seixal.

Maçarico-bique-bique *Tringa ochropus*

2006 – Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 15 inds. num tanque, 6 de Agosto (C. Pereira, A.H. Leitão).

2007 – Faro, Lagos, Paul de Lagos, 1 ind., 22 de Junho (L. Gordinho).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 19 inds., 26 de Agosto (A.H. Leitão, J.T. Tavares).

Comentário: duas concentrações importantes pelos números envolvidos e um registo precoce de passagem.

Maçarico-de-dorso-malhado *Tringa glareola*

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 4 inds., 20 de Agosto (M. Caetano, P. Pereira).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 3 inds., 22 de Julho (G. Schreier, R. Eufrásia).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 3 inds., 7 de Março (G. Schreier); Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 13 inds., 20 de Agosto (J.L. Santos) e 9 inds., 26 de Agosto (A.H. Leitão, J.T. Tavares).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 5 inds., 22 de Dezembro (A. Gonçalves).

Comentário: observações relevantes pelos números envolvidos para este migrador de passagem raro em Portugal.

Maçarico-das-rochas *Actitis hypoleucos*

2006 – Faro, Aljezur, Rib^a. de Odeceixe, 18 inds., 9 de Agosto (C. Pereira).

Setúbal, Seixal, Sapal de Corroios, 45 inds., 18 de Julho (C. Pereira).

Comentário: concentrações elevadas para esta limícola que raramente se agrega em bandos.

Rola-do-mar *Arenaria interpres*

2007 – Portalegre, Ponte de Sôr, Alb. de Montargil, 1 juv., 25 e 26 de Agosto (R. Marcão, A. Tomás).

Comentário: são bastante escassos os registos desta espécie no interior.

Falaropo-de-bico-grosso *Phalaropus fulicarius*

2006 – Setúbal, Alcochete, Salinas do Samouco, 1 ind., 29 de Dezembro a 10 de Janeiro (A. Rocha, J. Jara, A.H. Leitão, J. Alves, Faisca e outros).

2007 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind. de 1º Inv., 10 a 28 de Outubro (L. Gordinho, P. Dedicoat, J. Taylor).

Comentário: espécie rara fora do ambiente marinho.

Moleiro do Ártico *Stercorarius pomarinus*

2006 – Lisboa, Cascais, Cabo Raso, 53 inds. em passagem, 20 de Outubro (A.H. Leitão, M. Armelin).

Comentário: contagem importante na passagem pós-nupcial.

Moleiro-pequeno *Stercorarius parasiticus*

2006 – Aveiro, Ovar, ao largo da Praia do Furadouro, 16 inds., 16 de Abril (C. Noivo, A. Palavra).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind., 28 de Outubro (K. Kampson, C. Viney); Portimão, Ria de Alvor, 1 ind., 29 de Outubro (N. Pereira, S. Pereira).

Leiria, Óbidos, junto ao Aeródromo, 1 ind., 1 de Outubro (H. Cardoso); Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 1 ind., 11 de Novembro (H. Cardoso).

Comentário: observações em habitats atípicos para o nosso território, e uma contagem elevada para esta espécie durante a passagem primaveril.

Alcaide *Stercorarius skua*

2006 – Faro, Loulé, quebra-mar da doca de Quarteira, 1 ind., 16 de Julho (D. Hurst).

Leiria, Peniche, Cabo Carvoeiro, 150 inds. em passagem, 6 de Dezembro (H. Cardoso).

Setúbal, Grândola, 2 milhas a W da Praia da Comporta, bando de 33 inds., 11 de Novembro (A.H. Leitão, R. Guerreiro).

Comentário: uma contagem elevada para a passagem outonal, uma concentração elevada para esta espécie que raramente se agrupa em bandos desta dimensão, e um registo em terra onde muito escassamente é observada.

Gaivota-de-cabeça-preta

Larus melanocephalus

2006 – Faro, Castro Marim, Horta das Dragas, 100 inds. em alimentação, 8 de Novembro (N. Fonseca).

2007 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1420 inds., 13 de Dezembro (A.H. Leitão, A. Rocha, P. Lourenço, J. Alves).

Comentário: uma concentração elevada para a região, assim como um registo de alimentação longe do litoral, fenómeno este conhecido para outros locais, como Espanha, mas novo para Portugal. Este mesmo fenómeno foi novamente observado no mesmo local, em Dezembro de 2007.

Gaivota-pequena *Larus minutus*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 2 inds., 16 e 18 de Janeiro (R. Eufrásia, N. Fonseca).

Lisboa, Cascais, Cabo Raso, 10 inds. em passagem, 11 de Novembro (R. Lima, N. Pires).

Setúbal, Palmela, Zambujal, 1 juv., 3 de Janeiro, 18 de Fevereiro (P. Henriques, J. Carvalho); Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 1 ind. de 1º Inv., 18 de Novembro (J.L. Santos); Alcochete, Rib^a. das Enguias, 1 ind., 16 de Dezembro (J.L. Santos, F.L. Santos).

2007 – Coimbra, Figueira da Foz, Estuário do Mondego, 1 ind. de 1º Inv., 11 de Janeiro (H. Cardoso, P. Tenreiro).

Faro, Vila Real de Santo António, Quinta da Azeda, 1 ind. de 1º Inv., 6 de Fevereiro (C. Viney).

Porto, Gaia, Cabedelo, 1 ad., 25 de Março (P. Cardia).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 1 ad., 10 de Fevereiro (J.L. Santos, F.L. Santos).

Comentário: observações desta migradora e invernante rara no nosso território, cujo número de registos documentados são escassos.

Guincho-comum *Larus ridibundus*

2006 – Évora, Mourão, observações na Alb. do Alqueva: nidificação de 1 casal, 20 de Maio (J.L. Almeida), 2 ads. numa ilha com comportamento agonístico, 1 de Junho (L. Gordinho); Mourão, Açude do Canhão Velho, 10 ads., 31 de Maio (L. Gordinho).

Portalegre, Elvas, Alb. do Caia, 1 casal a nidificar, 19 de Maio (L. Venâncio).

2007 – Coimbra, Figueira da Foz, Ilha da Murraceira, 3 ninhos, 1 de Maio (D. Rodrigues).

Comentário: registos de nidificação desta espécie reprodutora rara no nosso território.

Gaivota de Audouin *Larus audouinii*

2006 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo: 19 inds. incluindo 6 ads. a incubar, 26 de Maio (L. Gordinho); 20 ads. e 7 crias, 18 de Junho (K. Searle, K. Philipps).

Lisboa, frente a Oeiras, 2 inds. de 2º Inverno, 29 de Janeiro (C.C. Moore).

Setúbal, Almada, Fonte da Telha, 1 juv., 9 de Agosto (M. Piazzi).

2007 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo e Esteiro da Carrasqueira: 9 ninhos com 3 ovos cada, 3 de Junho, (C.C. Moore); 210 inds., 12 de Agosto (J. Jara); Tavira, Salinas de Santa Luzia e Salinas das Quatro Água, 322 inds., 4 de Agosto (J. Jara).

Setúbal, Sesimbra, Cabo Espichel, 1 juv., 30 de Agosto (R. Guerreiro).

Comentário: observações que ilustram a presença continuada desta espécie como reprodutora, e concentrações elevadas para o Algarve. Apresentam-se ainda observações fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.

Gaivota-de-bico-riscado *Larus delawarensis*

2006 – Leiria, Alcobaça, Baía de S. Martinho do Porto: 2 ads., 15 de Janeiro (P. Henriques, H. Cardoso); 2 inds. de 2º Inverno, 2 e 3 de Março (C. Noivo, J. Belo); Peniche, Molhe-Leste, 1 ad., 24 de Dezembro (J.L. Santos, F.L. Santos).

Setúbal, Sesimbra, Lagoa de Alb., 1 ad., 16 de Fevereiro (P. Fernandes, R. Durão).

2007 – Beja, Odemira, Estuário do Mira, 1 ind. de 1º Inv., 11 de Dezembro (A.H. Leitão).

Faro, Portimão, Praia da Rocha, 1 ind., 25 de Dezembro (C. Silva).

Leria, Peniche, Porto de Peniche, 1 ad., 11 de Fevereiro a 9 de Março (H. Cardoso, M. Canaverde, L. Gordinho, A. Rocha, N. Barros, J. Guilherme).

Lisboa, Cascais, Cabo Raso, 1 ind. de 1º Inv., 6 de Março (C.C. Moore).

Porto, Gaia, Cabedelo: 2 inds., 4 e 5 de Janeiro (C.C. Moore); 1 ind., 11 de Janeiro (P. Cardia, A.S. Pinto).

Setúbal, Seixal, 1 ind., 26 e 28 de Dezembro (H. Costa, M. Estevens).

Comentário: gaivota de origem americana rara em Portugal Continental.

Famego *Larus canus*

2005 – Aveiro, Murtosa, Praia da Torreira, 16 inds., 24 de Dezembro (J.P. Tavares).

2006 – Faro, Silves, Rio Arade, Falacho, 1 ind. de 1º Inv., 18 de Dezembro (T. Valkenburg, J. Valkenburg).

2007 – Beja, Odemira, Estuário do Mira, 3 inds. de 1º Inv., 10 de Dezembro (A.H. Leitão).

Braga, Esposende, Estuário do Cavado, 2 inds. de 1º Inv., 17 de Dezembro (A.H. Leitão, P.C. Rodrigues).

Leiria, Alcobaça, S. Martinho do Porto, 2 inds. de 1º Inv., 31 de Outubro (H. Cardoso).

Porto, Gaia, Cabedelo: 2 inds., 25 de Março (P. Cardia).

Comentário: registos desta invernante pouco frequente fora da Costa do Estoril.

Gaivota-de-patas-amarelas *Larus michahellis*

2006 – Beja, Castro Verde, Alb. da Apariça, 1 ad., 29 de Março (P. Leitão).

Comentário: as observações desta espécie no interior são raras, se exceptuarmos os locais no extremo norte, onde nidifica.

Gaivotão-real *Larus marinus*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 2 inds., 2 de Janeiro (R. Eufrásia); Portimão, Ria de Alvor, 1 ind., 25 de Novembro (C. Key, K. Wilson); Vila do Bispo, Porto da Baleeira, 1 ind. de 1º Inv., 19 de Dezembro (S. Wates).

Lisboa, Sintra, falésias da Praia da Samarra, 1 ind. a incubar, 11 de Junho (A. Gonçalves).

2007 – Beja, Odemira, Estuário do Mira, 1 ind. de 4º Inv., 10 de Dezembro (A.H. Leitão).

Faro, Olhão, porto recreativo de Olhão, 1 ad., 2 de Janeiro (T. Valkenbrug, J. Valkenburg).

Lisboa, Sintra, falésias da Praia da Samarra, 1 ninho com 2 ovos, 24 de Junho (A. Gonçalves).

Setúbal, Sines, Porto de Sines, 3 inds., 9 de Janeiro (A.H. Leitão); Grândola, Caldeira de Tróia, 1 ad., 16 de Fevereiro (R. Matias); Sines, praia da Ribª de Moinhos, 1 ind. de 1º Inv., 10 de Dezembro (A.H. Leitão).

Comentário: observações na metade sul do território, onde a espécie é rara, e dois registos de hibridação com a gaivota-de-patas-amarelas, sendo este o primeiro registo deste tipo para Portugal.



Gaivotão-real, Praia da Samarra, Maio de 2006 (António Gonçalves)

Tagaz *Sterna nilotica*

2006 – Évora, Mourão/Alandroal, Alb. do Alqueva, nidificação de 469 casais, 20 a 30 de Maio (J.L. Almeida); Mourão, Ribª de Alcarrache, 300 inds., 1 de Junho (L. Gordinho).

Comentário: observações que ilustram a colonização da Albufeira do Alqueva como zona de reprodução.

Garajau-grande *Sterna caspia*

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 10 inds., 1 de Dezembro (R. Eufrásia); Castro Marim, foz da Ribª. das Choças: 1 ind., 26 de Junho (N. Fonseca); 18 inds., 30 de Agosto (J. Jara); Portimão, junto à ponte do Arade, 3 ads., 5 de Julho (A.H. Leitão).

2007 – Évora, Mourão, Ribª de Alcarrache, 2 inds., 4 de Maio (J.L. Almeida).

Faro, Faro, Salinas do Aeroporto, 10 inds., 21 de Janeiro (N. Cidraes-Vieira); Castro Marim, sobre o Guadiana junto ao sapal de Venta Moinhos, 1 ind., 2 de Junho (J. Knight); Castro Marim, Sapal de Castro Marim: 8 inds., 8 de Julho (L. Gordinho); 26 inds., 18 de Agosto (J. Jara); Vila Real de Santo António, Esteiro da Carrasqueira, 28 inds., 11 de Outubro (L. Gordinho).

Comentário: observações em datas tardias ou precoces, e concentrações relevantes desta invernante pouco comum no nosso território.

Garajau-de-bico-preto *Sterna sandvicensis*

2006 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 420 inds., 1 de Setembro (J. Jara).

Comentário: uma das maiores concentrações registadas para o nosso território.

Gaivina-comum *Sterna hirundo*

2006 – Setúbal, Alcácer do Sal, Pinheiro Torto, Estuário do Sado, nidificação confirmada, 13 de Maio (H. Costa); Alcácer do Sal, Salinas da Batalha, 1 casal a nidificar, 4 de Junho (J. Jara); Alcochete, Salinas do Samouco, 1 ind., 22 de Dezembro (P. Pereira).

2007 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo: 1 ind., 8 de Março (K. Searle, K. Philipps); 1 ind., 30 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor).

Setúbal, Alcácer do Sal, Salinas da Batalha, 1 casal a nidificar, 15 de Julho (J. Jara); Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 3 inds., 15 de Dezembro (M. Caetano, P. Pereira, E. Gomes, D. Medinas).

Comentário: *observações de Inverno, período em que é bastante rara a ocorrência desta espécie; um registo precoce em Março e confirmações de nidificação desta espécie rara e irregular como reprodutora.*

Gaivina do Ártico *Sterna paradisaea*

2006 – Faro, Castro Marim, Azinhal, 1 ind. em voo ao longo do Guadiana, 16 de Agosto (N. Fonseca).

Comentário: *observação em local atípico para esta ave de hábitos marinhos no nosso território.*

Chilreta *Sterna albifrons*

2006 – Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, 17 casais a nidificar, 20 de Maio (J.L. Almeida).

Faro, Vila Real de Santo António, Foz do Guadiana, 5 inds., 7 de Dezembro (C. Viney).

Porto, Gaia, Baía de S. Paio, 2 inds., 17 de Agosto (A.C. Pereira).

Setúbal, Alcochete, Salinas do Samouco, 281 inds., 27 de Julho (M. Armelin).

2007 – Faro, Vila Real de Santo António, Foz do Guadiana, 12 inds., 1 de Janeiro (P. Dedicoat, J. Taylor); Castro Marim, Cerro do Bufo: 5 inds., 9 de Janeiro (C. Viney); 7 inds., 17 de Janeiro (C. Viney).

Comentário: *uma concentração elevada para esta espécie e um registo fora dos locais habituais de ocorrência; destaca-se a presença continuada de aves no troço terminal do Guadiana durante o Inverno 2006/7.*

Gaivina-dos-pauis *Chlidonias hybrida*

2006 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, nidificação de 12 casais, 30 de Maio (J.L. Almeida).

Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, nidificação de 4 casais, 20 de Maio (J.L. Almeida).

Setúbal, Alcochete, Marinhas da Atalaia, 2 inds., 1 de Novembro (L. Gordinho).

2007 – Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind. de 1º Inv., 24 de Outubro e 7 de Novembro (G. Schreier, G. Elkins, E. Elkins, P. Dedicoat, J. Taylor).

Comentário: *registos de reprodução desta nidificante escassa e irregular, e registos tardios na passagem outonal.*

Gaivina-preta *Chlidonias niger*

2007 – Coimbra, Figueira da Foz, Estuário do Mondego, 1 ind., 11 de Janeiro (H. Cardoso).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 2 inds., 7 de Novembro (G. Schreier, P. Dedicoat, J. Taylor).

Comentário: *uma data tardia e uma data atípica para a presença desta espécie em Portugal.*

Torda-mergulheira *Alca torda*

2006 – Aveiro, Murtosa, Ria de Aveiro, 2 inds., 8 de Janeiro (J.P. Tavares).

Leiria, Peniche, Cabo Carvoeiro, 718 inds. em passagem, 8 de Dezembro (H. Cardoso); Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 1 ind., 27 de Dezembro (H. Cardoso).

Comentário: *observações em habitats pouco habituais para esta espécie no nosso território, e uma contagem elevada de aves em passagem.*

Cortiçol-de-barriga-preta *Pterocles orientalis*

2006 – Faro, Castro Marim, Quinta das Choças, 1 ind., 27 de Outubro (N. Fonseca).

Comentário: *observação feita fora dos locais habituais de ocorrência.*

Pombo-bravo *Columba oenas*

2007 – Évora, Mourão, Abegoaria, 350 inds., 4 de Janeiro (L. Gordinho).

Comentário: *contagem invulgar pelos números envolvidos, elevados para o nosso território.*

Rola-turca *Streptopelia decaocto*

2006 – Setúbal, Sines, 10 milhas a W de Sines, 1 ind., 14 de Abril (A. Luís, A.H. Leitão).

Comentário: *observação feita em habitat atípico para esta espécie.*

Rola-brava *Streptopelia turtur*

2006 – Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 1 ind., 27 de Dezembro (J.L. Santos, F.L. Santos).

Viseu, Tondela, Póvoa de S. Catarina, 1 ind., 26 de Fevereiro (M. Nunes).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Fortaleza de Sagres, 37 inds/10 mins. em passagem nocturna, 5 de Setembro (R. Tomé, J. Ministro, C. Pereira, C. Cruz, N. Pires, H. Alonso, A.H. Leitão).

Comentário: registos precoces e tardios, e uma contagem elevada que ilustra a passagem outonal pelo nosso território.

Cuco-rabilongo *Clamator glandarius*

2006 – Évora, Évora, perto do Aterro Sanitário, 1 ind., 27 de Outubro (G. Dias).

Faro, Portimão, Ribeira da Torre, 1 ind., 20 de Janeiro (N. Fonseca).

2007 – Faro, Portimão, Quinta da Rocha, Ria de Alvor, 1 sub-ad., 27 de Janeiro (C. Key).

Comentário: dois registos precoces e um registo tardio desta espécie migradora estival.

Bufo-pequeno *Asio otus*

2006 – Faro, Faro, Vale Carneiros, 1 ind., 26 de Junho (N. Fonseca).

Lisboa, Lisboa, jardins do Instituto Superior Técnico, 1 ind., 28 de Março (A. Vaz, L. Gordinho, P. Beja); Vila Franca de Xira, Ponta da Erva: 1 ind., 6 de Maio (R. Tomé e outros); 1 ind., 7 de Agosto (R. Tomé, P. Catry, H. Alonso).

Santarém, Benavente, Porto Alto, dormitório com 8 inds., 12 de Março (J. Andrade).

2007 – Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ind. morto, 9 de Agosto (A. Gonçalves); Oeiras, Nova Oeiras, várias regurgitações, 9 de Dezembro (R. Tomé e outros).

Portalegre, Portalegre, próximo de Terrugem, 1 ind. a incubar, 4 de Março (C. Pacheco).

Comentário: espécie cujo estatuto em Portugal se encontra mal documentado.

Coruja-do-nabal *Asio flammeus*

2006 – Aveiro, Aveiro, zona do salgado, 2 inds., 13 e 21 de Janeiro (A. Luis).

Lisboa, Oeiras, Paço d'Arcos, 1 ind., 16 de Janeiro (A. Chambel).

Setúbal, Alcácer do Sal, arrozais da Carrasqueira, 8 inds., 15 de Janeiro (C. Pereira).

2007 – Beja, Moura, perto do Mte. dos Pereiros, 1 ind., 4 de Janeiro (L. Gordinho).

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 6 inds., 8 de Janeiro (J.L. Almeida); Vila do Bispo, próximo do Forte de Beliche, 3 inds., 9 de Janeiro (S. Wates).

Comentário: registos em locais onde a presença desta coruja é pouco habitual, e duas concentrações importantes pelos números envolvidos.

Andorinhão-preto *Apus apus*

2006 – Aveiro, Aveiro, Campus da Universidade, 1 ind., 1 de Dezembro (G. Elias).

Faro, Castro Marim, Azinhal, 1 ind., 10 de Fevereiro (N. Fonseca).

Lisboa, Lisboa, Telheiras, 1 ind., 22 de Janeiro (M. Braga).

2007 – Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 2500 inds. em bando misto com andorinhão-pálido, 21 de Agosto (A.H. Leitão, P. Fernandes, C. Pereira, A. Pereira).

Comentário: uma concentração elevada para esta espécie, e registos precoces e tardios nesta nidificante estival.

Andorinhão-pálido *Apus pallidus*

2006 – Bragança, Vimioso, Algosó, 5 inds., 12 de Junho (G. Elias, M.M. Sousa).

Setúbal, Almada, Cova da Piedade, 1 ind. a entrar para o ninho, 9 de Setembro (C. Pereira).

Vila Real, Chaves, centro histórico da cidade, nidificação confirmada, 14 de Junho (G. Elias, M.M. Sousa); Chaves, Vidago, vários inds., 3 de Julho (G. Elias, M.M. Sousa, J. Conde); Vila Real, centro da cidade, nidificação confirmada, 4 de Julho (C. Pereira); Vila Real, Barragem da Cimeira, 3 inds., 5 de Julho (C. Pereira); Montalegre, Castelo de Montalegre, 4 inds., 22 de Julho (C. Pereira).

Comentário: confirmações de nidificação nas regiões mais a norte do território, onde a presença desta espécie se encontra mal documentada; ainda um registo tardio de ocupação de ninho.

Andorinhão-real *Apus melba*

2006 – Bragança, Miranda do Douro, 10 inds., 5 de Março (C.D. Romai).

2007 – Beja, Odemira, campos a norte de Almogrove, 500 inds., 6 de Outubro (J. Ministro).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 2 inds., 19 de Fevereiro (S. Wates, P. Walker); Monchique,

Serra de Monchique, 340 inds. em passagem, 19 de Março (J.L. Almeida).

Comentário: duas concentrações importantes pelos números envolvidos, e dois registos precoces de chegada às áreas de reprodução.

Abelharuco *Merops apiaster*

2006 – Portalegre, Arronches, sobre a vila, 1 ind., 12 de Março (L. Venâncio).

2007 – Faro, Loulé, sobre o Caniçal de Vilamoura, 2 ou 3 inds. em passagem, 21 de Outubro (J.M. Pereira).

Comentário: registos precoces e tardios para esta nidificante estival.

Rolieiro *Coracias garrulus*

2007 – Faro, Portimão, Vale Pessegueiros, 2 inds., 16 a 23 de Maio (K. Lancaster, I. Borjesson); Vila do Bispo, Cabranosa e Vale Santo, 2 inds., 20 de Agosto a 1 de Setembro (S. Wates, C. Pereira).

Comentário: observações fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.

Poupa *Upupa epops*

2006 – Bragança, Carrazeda de Ansiães, Foz-Tua, 1 ind., 8 de Janeiro (H. Cardoso, A. Ventura).

Comentário: registo de Inverno desta espécie estival na região norte.

Toricolo *Jynx torquilla*

2006 – Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Rosmaninhal, 1 ind. a vocalizar, 10 de Novembro (C. Pacheco).

Lisboa, Oeiras, Estação Agronómica, 1 ind., 14 de Novembro (P. Noronha); Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ind., 26 de Novembro (A. Gonçalves).

2007 – Évora, Évora, Herdade da Mitra, 1 ind., 4 de Dezembro (M. Caetano).

Leiria, Peniche, Berlengas, 1 ind., 15 de Setembro (A. Xeira).

Comentário: observações tardias desta espécie sobretudo estival, e uma observação em local onde raramente é registada, como é o caso da Berlenga.

Pica-pau-malhado-pequeno *Dendrocopos minor*

2007 – Bragança, Mogadouro, centro da vila, 1 ind., 2 de Dezembro (C. Santos).

Lisboa, Lisboa, Campolide, 1 ind., 7 de Dezembro (T. Catry).

Comentário: registos em meio urbano onde esta espécie é de presença rara.

Calhandrinha *Calandrella brachydactyla*

2007 – Beja, Castro Verde, Belver, 1 ind., 24 de Fevereiro (P. Pereira).

Faro, Vila do Bispo, Vale Santo, 110 inds., 26 de Agosto (J. Ministro, C. Pereira).

Comentário: um registo precoce e uma concentração elevada na migração pós-nupcial.

Laverca *Alauda arvensis*

2006 – ZEE, 20 milhas a oeste de S. Jacinto, 3 inds., 1 de Novembro (A.H. Leitão, C. Santos).

Comentário: observação feita em habitat atípico para esta espécie.

Andorinha-das-barreiras *Riparia riparia*

2005 – Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 1 ind., 20 de Dezembro (C. Noivo).

2006 – Aveiro, Estarreja, Salreu, 2000 inds., 28 de Março (R. Brito, A.C. Pereira).

Évora, Portel, açude do Barranco da Alandroeira, 4 inds., 19 de Dezembro (L. Gordinho).

2007 – Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 2000 inds., 27 de Julho (A. Gonçalves).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Sto. André, 1 ind., 15 de Dezembro (M. Caetano, P. Pereira, E. Gomes, D. Medinas).

Comentário: duas concentrações elevadas e registos de Inverno desta andorinha escassamente observada neste período.

Andorinha-das-rochas *Ptyonoprogne rupestris*

2006 – Beja, Odemira, Zambujeira do Mar, 250 inds., 24 de Novembro (A.H. Leitão).

2007 – Faro, Castro Marim, Vale do Andreu, 110 inds., 11 de Janeiro (L. Gordinho).

Comentário: concentrações de Inverno elevadas para esta espécie.

Andorinha-das-chaminés *Hirundo rustica*

2006 – Faro, Portimão, Ria de Alvor, 1 ad. e 4 juvs. do ano, 29 de Janeiro (C. Key).

Comentário: registo de nidificação involuntariamente precoce para esta espécie.

Andorinha-daúrica *Hirundo daurica*

2006 – Aveiro, Aveiro, Campus da Universidade, 1 ind., 1 de Dezembro (G. Elias).

Faro, Tavira, Rio Séqua, 10 inds., 8 de Dezembro (C. Viney); Tavira, Currais dos Boeiros, 3 inds., 27 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor).

Lisboa, Sintra, Malveira da Serra, 1 ind., 16 de Dezembro (A. Gonçalves).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Praia do Zavial, 1 ind., 1 de Janeiro (S. Wates); Castro Marim, Cerro do Bufo, 10 inds., 9 de Janeiro (C. Viney); Loulé, Rib^a. da Menalva, 1 ind., 18 de Dezembro (N. Fonseca).

Comentário: *observações que ilustram a presença de algumas aves desta espécie durante o período de Inverno, no que é uma situação raramente registada em Portugal. Destaca-se o registo em Aveiro, pela latitude a que a observação foi feita.*

Andorinha-dos-beirais *Delichon urbicum*

2007 – Leiria, Alcobaça, centro da cidade, 1 juv. não-voador, 10 de Setembro (J. Reis).

Comentário: *registo de reprodução em data bastante tardia para esta espécie.*

Petinha de Richard *Anthus richardi*

2005 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 29 de Dezembro (J. Ministro, J.T. Tavares).

2006 – Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 2 inds., 2 a 8 de Janeiro (R. Skan, C. Key, R. Eufrásia); mesmo local, 1 ind., 1 de Fevereiro (R. Eufrásia); Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind., 31 de Janeiro (C. Viney, J. Edge); Portimão, Ria de Alvor, 1 ind., 13 de Março (C. Key); Vila do Bispo, Vale Santo, 1 ind., 30 de Outubro (S. Wates); Loulé, Vilamoura, 1 ind., 26 de Novembro (G. Schreier); Vila do Bispo, Beliche, 1 ind., 1 de Dezembro (C. Noivo, A. Palavra); Vila do Bispo, Fortaleza de Sagres, 1 ind., 9 de Dezembro (M. Villaécija, F. Chiclana).

Leiria, Óbidos, junto ao aeródromo, 3 inds., 1 de Novembro (H. Cardoso).

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 1 ind., 30 de Janeiro e 6 de Fevereiro (C. Noivo).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Vale Santo, 1 ind., 23 de Fevereiro (S. Wates); mesmo local, 1 ind., 28 de Agosto (C. Pereira, A. Pereira); Vila do Bispo, Cabranosa, 1 ind., 5 de Setembro (C. Pereira). Odemira, Cabo Sardão, 8 inds., 1 e 2 de Abril e 10 inds., 1 e 2 de Novembro (C.C. Moore).

Santarém, Benavente, Pancas, 1 ind., 27 de Janeiro (C.C. Moore); Benavente, Bate-Orelhas, 1 ind., 18 de Fevereiro (J.L. Santos).

Setúbal, Alcácer do Sal, Carrasqueira, 1 ind., 4 de Fevereiro (C.C. Moore); Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 1 ind., 1 de Abril (L. Gordinho); Sesimbra, Cabo Espichel: 1 ind., 20 de Janeiro (C.C. Moore); 4 inds., 10 de Março (C.C. Moore); 24 inds., 20 a 27 de Outubro (C.C. Moore).

Comentário: *invernante e migradora de passagem rara em Portugal.*



Petinha de Richard, Vilamoura, Novembro de 2006 (Georg Schreier)

Alvéola-amarela *Motacilla flava*

2006 – Évora, Mourão, Alb. do Alqueva, Alto do Zambujeiro, 1 macho a defender território, 19 de Maio (L. Gordinho).

Faro, Tavira, Salinas de Tavira, 1 ind., 19 de Fevereiro (J. Ministro); Portimão, Morgado do Reguengo, 1 macho da subsp. *M. f. thunbergii*, 8 de Setembro (N. Fonseca); Silves, Lagoa dos Salgados: 1 macho da subsp. *M. f. flavissima*, 14 de Setembro (L. Gordinho, G. Martins); 1 macho da subsp. *M. f. thunbergii*, 15 de Setembro R. Eufrásia).

2007 – Coimbra, Coimbra, Choupal, 1 ind., 13 de Fevereiro (H. Afonso).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 1 macho da subsp. *M. f. thunbergii*, 16 de Setembro (R. Eufrásia).

Leiria, Peniche, Berlengas, 6 inds., 15 de Setembro (A. Xeira).

Comentário: *registos referentes a subespécies raramente observadas em Portugal, um registo em data precoce, uma observação fora dos locais habituais de ocorrência, e ainda um registo de reprodução possível*

em local onde anteriormente não fora detectada.

Ferreirinha-alpina *Prunella collaris*

2006 – Faro, Loulé, Rocha da Pena, 10 inds., 1 de Dezembro (D. Paulo).

Lisboa, Sintra, Cabo da Roca, 11 inds., 5 de Janeiro (R. Matias).

Comentário: concentrações importantes para esta espécie invernante pouco comum.

Rouxinol-comum *Luscinia megarhynchos*

2006 – Lisboa, Torres Vedras, Carreiras, 1 macho a cantar, 3 de Março (R. Matias).

2007 – Portalegre, Avis, Ervedal, 1 ind., 3 de Março (A. Xeira).

Comentário: observações em datas precoces para esta nidificante estival.

Cartaxo-nortenho *Saxicola rubetra*

2006 – Viana do Castelo, Ponte de Lima, 1 macho, 25 de Março (G. Alexander).

2007 – Braga, Esposende, terrenos a norte da cidade, 1 macho, 26 de Fevereiro (G. Alexander).

Leiria, Peniche, Berlengas, 2 inds., 15 de Setembro (A. Xeira).

Comentário: dois registos na região Norte, em datas bastante precoces para esta espécie migradora estival, e uma observação feita fora dos locais habituais de ocorrência.

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

2007 – Faro, Vila do Bispo, Praia do Castelejo, 1 imat., 30 de Novembro (A.H. Leitão); Vila do Bispo, Vale Santo, 1 ind., 1 de Dezembro (P. Pinto).

Guarda, Seia, planalto central da Serra da Estrela, 2 inds., 3 de Novembro (G. Elias, M.M. Sousa, E. Martins).

Santarém, Benavente, Pancas, 1 ind., 15 de Novembro (A. Gonçalves).

Comentário: observações em datas tardias para esta espécie.

Chasco-preto *Oenanthe leucura*

2006 – Bragança, Mirandela, entre Sobreira e Milhais, Rio Tua, 1 casal, 25 de Junho (S. Ribeiro, T. Santos).

2007 – Évora, Reguengos de Monsaraz, zona limítrofe da vila, 1 ind., 3 de Novembro (P. Grilo).

Comentário: registos feitos fora da área de distribuição

conhecida.

Melro-de-colar *Turdus torquatus*

2006 – Faro, Vila do Bispo, entre Zambujal e Zavial, 6 inds., 19 de Janeiro (S. Wates); Vila do Bispo, Praia do Zavial, 10 inds. a 11 de Fevereiro e 2 machos a 22 de Março (S. Wates).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Cabranosa: 1 ind., 5 de Setembro (C. Pereira); 3 inds., 29 de Outubro (R. Tomé, A.H. Leitão).

Guarda, Seia, Cântaro Magro, 3 inds., 3 de Novembro (G. Elias, M.M. Sousa, E. Martins).

Setúbal, Sesimbra, alto da Serra da Arrábida, 1 ind., 2 de Novembro (R. Belo).

Comentário: um registo em local pouco habitual para a espécie e uma observação em início de Setembro, precoce relativamente ao conhecido; apresentam-se também concentrações relevantes deste melro invernante raro no nosso território.



Melro-de-colar, Zavial, Março de 2006 (Simon Wates)

Tordo-zornal *Turdus pilaris*

2005 – Faro, Vila do Bispo, Praia do Zavial, 4 inds., 30 de Dezembro (S. Wates).

2006 – Évora, Montemor-o-Novo, Herdade dos Nabos, 6 inds., 4 de Fevereiro (A.H. Leitão).

Faro, Vila do Bispo, Sagres, 5 inds., 6 de Novembro (S. Wates).

Portalegre, Campo Maior, Herdade do Baldio, 2 inds., 18 de Novembro (L. Venâncio).

Setúbal, Sesimbra, Lagoa Pequena, 3 inds., 15 e 27 de Fevereiro (P. Fernandes, R. Durão).

Viana do Castelo, Ponte de Lima, Lagoas de Bertandos, 150 inds., 19 de Novembro (E. Gonçalves).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Vale Santo, 2 inds.,

25 de Outubro (G. Schreier, G. Elkins, E. Elkins).
Santarém, Mação, Degolados, 10 inds., 24 de Fevereiro (R. Marcão); Golegã, Paul do Boquilobo, 5 inds., 20 de Novembro (C. Noivo).

Comentário: *observações na metade sul do território, onde esta espécie é rara, e uma concentração invulgarmente elevada nas Lagoas de Bertandos.*

Tordo-pinto *Turdus philomelos*

2007 – Coimbra, Mira, Casal de S. Tomé, 1 casal a nidificar, 2 de Junho (J. Petronilho).

Comentário: *registo de nidificação fora da área tradicional de reprodução desta espécie.*

Fuinha-dos-juncos *Cisticola juncidis*

2006 – Vila Real, Montalegre, Salto, 812m alt., 1 ind., 22 de Junho (C. Pereira); Boticas, Lavradas, 955m alt., 1 ind., 27 de Junho (C. Pereira); Montalegre, arredores da vila, 966m alt., 1 ind., 24 de Julho (C. Pereira).

Comentário: *registos a altitudes pouco usuais para esta espécie, típica de zonas baixas*

Felosa-dos-juncos *Acrocephalus schoenobaenus*

2006 – Lisboa, Oeiras, Estação Agronómica, 1 macho a cantar, 12 de Abril (R. Tomé);

2007 – Faro, Vila do Bispo, Pousada de Sagres, 1 ind. a cantar, 10 de Maio (S. Wates, T. Farr, J. Dake, M. Seery, A. Grinter).

Comentário: *espécie raramente observada na passagem primaveril.*

Felosa-pálida *Hippolais opaca*

2007 – Faro, Vila do Bispo, Sagres, 1 ind., 13 de Setembro (S. Wates).

Comentário: *passeriforme escassamente registado no nosso território.*

Toutinegra-de-barrete *Sylvia atricapilla*

2006 – ZEE, 20 milhas a W de Esposende, 1 macho, 30 e 31 de Outubro (A.H. Leitão, C. Santos).

Comentário: *observação em habitat atípico para esta espécie.*

Toutinegra-tomilheira *Sylvia conspicillata*

2006 – Faro, Vila do Bispo, junto a Vale Santo, 3 inds., 1 a 3 de Novembro (M. Tefer, S. Wates); Vila do Bispo, Cabranosa, 1 macho, 18 de Dezembro (M. Mendes, R. Eufrásia).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Estuário do Tejo, 2 inds., 14 de Abril (A. Gonçalves); Vila Franca de Xira, Marinhas da Saragoça, 2 juvs., 31 de Agosto (C. Pereira, P. Fernandes).

Comentário: *observações em datas tardias para esta nidificante estival, e registos em datas e habitat adequados à reprodução em local novo para a espécie.*

Toutinegra-de-bigodes *Sylvia cantillans*

2007 – Évora, Mourão, perto do Monte da Coitada, 1 fêmea, 3 de Janeiro (L. Gordinho).

Faro, Castro Marim, Vale do Andreu, 1 ind., 11 de Janeiro (L. Gordinho).

Comentário: *observações em datas precoces para esta espécie.*

Felosinha-comum *Phylloscopus collybita*

2006 – Lisboa, Oeiras, Estação Agronómica, 1 ind. a cantar, 15 de Maio (R. Tomé, T.M. Tomé).

2007 – Faro, Vila do Bispo, próximo da Raposeira, 1 ind. a cantar, 8 de Maio (S. Wates).

Comentário: *passeriforme raramente registado na passagem pré-nupcial na metade sul do território.*

Felosinha-ibérica *Phylloscopus ibericus*

2006 – Faro, Portimão, Ribeira da Torre, 1 ind., 14 de Fevereiro (N. Fonseca).

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 1 ind., 4 de Janeiro (C. Noivo).

Comentário: *observações em datas precoces para esta espécie nidificante estival.*

Felosa-musical *Phylloscopus trochilus*

2006 – ZEE, 15 milhas ao largo do Cabo Mondego, 1 ind., 3 de Novembro (C. Santos, A.H. Leitão).

2007 – Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 1 ind., 14 de Julho (J.L. Almeida).

Comentário: *observação em habitat atípico e uma observação em data precoce para esta espécie.*

Estrelinha-de-poupa *Regulus regulus*

2006 – Faro, Faro, Ludo, 2 inds., 24 de Janeiro (C. Viney); Portimão, Morgado do Reguengo, 3 inds., 21 de Fevereiro (N. Fonseca).

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 1 ind., 4 e 13 de Janeiro (C. Noivo); Sardeal, Cabeça de Mós, 1 ind., 8 de Janeiro (R. Marcão); Sardeal, Palhota, 1 ind., 14 de Janeiro (R. Marcão).

2007 – Lisboa, Cascais, estação de c.f. de Carcavelos, 1 ind., 25 de Novembro (A.H. Leitão).

Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo André, 2 inds., 15 de Dezembro (P. Pereira, M. Caetano, E. Gomes, D. Medinas).

Comentário: *espécie rara na metade sul do território.*

Chapim-carvoeiro *Parus ater*

2006 – Setúbal, Seixal, Pinhal da Verdizela, 1 ind., 2 de Janeiro (C. Pereira);

2007 – Setúbal, Setúbal, Casais da Serra, macho a cantar, 19 de Maio (G. Elias, M.M. Sousa); Setúbal, perto de Aldeia de Irmãos, 1 macho a cantar, e perto do Outão, 1 macho a cantar e 2 juvs. do ano, 7 de Junho (G. Elias, R. Guerreiro); Setúbal, perto da Serra de S. Luís, 1 ind., 7 de Junho (R. Guerreiro); Sesimbra, centro urbano, 1 ind., 28 de Dezembro (G. Elias).

Comentário: *registos que ilustram uma expansão da área de distribuição conhecida para este chapim.*

Papa-figos *Oriolus oriolus*

2006 – Braga, Fafe, Lameirinha, 1 macho, 8 de Dezembro (P.C. Rodrigues).

2007 – Faro, Lagos, Mata do Barão de S. João, bando com 8 inds., 6 de Setembro (R. Tomé).

Comentário: *um registo bastante tardio e uma concentração invulgar para esta espécie que raramente se agrupa em bandos desta dimensão.*

Picanço-de-dorso-ruivo *Lanius collurio*

2006 – Leiria, Caldas da Rainha, junto à foz do Rio Real, 1 juv., 14 de Outubro (H. Cardoso).

Viseu, Castro Daire, Gralheira, 2 casais a alimentar crias, 29 de Julho (C. Pereira).

Comentário: *uma observação feita fora dos locais habituais de ocorrência da espécie, e um registo que ilustra a presença desta espécie a sul do Douro.*

Picanço-barreteiro *Lanius senator*

2007 – Faro, Vila do Bispo, Cabranosa, 99 inds., 5 de Setembro (A.H. Leitão, H. Alonso, C. Pereira).

Comentário: *concentração elevada para esta espécie.*

Pega-rabilonga *Pica pica*

2006 – Évora, Reguengos de Monsaraz, junto à Esc. Sec. de Reguengos, 300 inds., 12 de Outubro (P. Grilo).

Comentário: *concentração invulgar pelos números envolvidos.*

Gralha-de-bico-vermelho

Pyrrhocorax pyrrhocorax

2006 – Faro, Vila do Bispo, Sagres, 90 inds., 31 de Agosto (R. Tomé, T.M. Tomé).

2007 – Beja, Castro Verde, 2 inds. observados numa colónia de francelho, 10 de Julho (I. Catry).

Comentário: *uma concentração elevada e um registo feito fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Pardal-espanhol *Passer hispaniolensis*

2006 – Beja, Moura, perto da Póvoa de S. Miguel, 374 inds., 21 de Dezembro (L. Gordinho).

2007 – Faro, Castro Marim, 250 inds., 24 de Outubro (G. Schreier, G. Elkins, E. Elkins).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 50 inds., 14 de Janeiro (A. Gonçalves).

Comentário: *concentrações importantes pelos números envolvidos, destacando-se a observação feita na Ponta da Erva, pois trata-se de um local onde a presença desta espécie é escassa no Inverno.*

Pardal-montês *Passer montanus*

2006 – Braga, Esposende, Gândara, 200 inds., 17 de Setembro (G. Alexander);

2007 – Santarém, Salvaterra de Magos, Rib^a. de Muge, 150 inds., 25 de Agosto (D. Leitão);

Comentário: *concentrações elevadas para este passeriforme.*

Pardal-francês *Petronia petronia*

2006 – Faro, Portimão, Morgado do Reguengo, 35 inds., 11 de Janeiro (N. Fonseca); Castro Marim, Quinta das Choças, 7 inds., 27 de Dezembro (N. Fonseca).

2007 – Faro, Vila do Bispo, Ingrina, 2 inds., 12 de Fevereiro (S. Wates); Vila do Bispo, Cabranosa, 3 inds., 29 de Agosto (C. Pereira).

Comentário: *espécie rara no Algarve, destacando-se a observação de Janeiro de 2006 pelo invulgar número de aves envolvido.*

Tentilhão-montês *Fringilla montifringilla*

2005 – Viana do Castelo, Ponte de Lima, Lagoa de Bertandos e S. Pedro de Arcos, 100 inds., 4 de Dezembro (M. Cardoso, R. Marcão).

2006 – Viana do Castelo, Ponte de Lima, Lagoa de Bertandos, 80 inds., 5 de Março (M. Cardoso).

Comentário: *observações respeitantes a concentrações invulgares para esta espécie invernante de ocorrência irregular em Portugal Continental.*

Cruza-bico *Loxia curvirostra*

2006 – Coimbra, Lousã, Serra da Lousã, 3 inds., 2 de Abril (F. Romão).

Faro, Portimão, Morgado do Reguengo, 8 inds., 21 de Fevereiro (N. Fonseca).

Lisboa, Oeiras, Estádio Nacional, 6 inds., 20 de Maio (R. Tomé, A. Chambel); mesmo local, 3 inds., dos quais 2 juvs., 10 de Junho (L. Gordinho).

Setúbal, Seixal, observações na Mata da Verdizela: 6 inds. a 18 de Janeiro, 2 inds. a 27 de Fevereiro e 3 inds. a 7 de Março (todas as obs. por C. Pereira).

2007 – Faro, Faro, Quinta do Ludo, 2 inds., 6 de Maio (T. Farr); Aljezur, cabeços da Samouqueira, 2 inds., 4 de Setembro (J. Ministro).

Comentário: observações em regiões onde a sua presença é rara.



Cruza-bico, Morgado do Reguengo, Fevereiro de 2006 (Nelson Fonseca)

Bico-grossudo *Coccothraustes coccothraustes*

2006 – Santarém, Abrantes, Pego, 40 inds., 1 de Fevereiro e 50 inds., 23 de Fevereiro (R. Marcão).

Comentário: espécie que raramente se agrupa em bandos desta dimensão.

Escrevedeira-das-neves *Plectrophenax nivalis*

2006 – Braga, Esposende, Praia da Apúlia, 5 inds., 14 de Novembro (J. Farinha).

Guarda, Seia, Torre, Serra da Estrela, 2 inds., 3 de Janeiro (J. Conde).

Comentário: passeriforme de ocorrência rara no nosso território.

Escrevedeira-dos-caniços *Emberiza schoeniclus*

2007 – Beja, Serpa, Ínsua, 3 inds., 5 de Janeiro (L. Gordinho).

Santarém, Abrantes, junto ao Pego, 3 inds., 9 de Janeiro (R. Marcão).

Comentário: registos feitos em locais onde a presença da espécie é rara.

 ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Marrequinha *Anas crecca*

2006 – S. Miguel, Achada das Furnas, 41 inds., 5 de Fevereiro (C. Pereira);

2007 – S. Miguel, Achada das Furnas, 41 inds., 5 de Fevereiro (C. Pereira, N. Grangé); Lagoa das Furnas, 108 inds., 1 de Dezembro (C. Pereira e outros);

Comentário: concentrações elevadas para esta espécie pouco comum no arquipélago.

Pato-real *Anas platyrhynchos*

2006 – S. Miguel, Ponta Delgada, 1 macho, 13 a 17 de Janeiro (S. Rodebrand, J.P. Tavares);

2007 – Corvo, Caldeirão, 1 ind., 27 de Outubro (I. Torsson, S. Aberg);

S. Miguel, Lagoa Azul, 3 inds., 1 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson);

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Caturro *Aythya collaris*

2006 – Faial, Lagoa de Pedro Miguel, 1 macho, 14 de Outubro a 1 de Novembro (D. Vargas, F. Jiguet, J. Bried, P.-A. Crochet);

Flores, Poço da Alagoinha, 2 machos e 2 fêmeas, 14 de Fevereiro (S. Rodebrand); Lagoa Seca, 7 inds., 2 a 7 de Novembro (S. Rodebrand);

S. Miguel, observações na Lagoa Verde e Lagoa Azul: 3 machos e 4 fêmeas, 13 de Janeiro a 1 de Março (S. Rodebrand, R. Guerreiro, P. Ulrik, J. Hansen), 2 juvs., 12 de Outubro (C. Pereira, C. Silva), 3 inds., 18 de Dezembro (C. Pereira);

Terceira, Cabo da Praia, 3 inds., 1 de Novembro (P. Alfrey); Paul da Praia, 2 inds., 10 de Novembro (K. Haataja, H. Palojarvi); mesmo local, 1 fêmea,

19 a 31 de Dezembro (J. Bried e outros);

2007 – Corvo, Caldeirão, 3 fêmeas, 22 de Outubro a 15 de Novembro (P. Alfreedy, B. Carlsson);

Flores, Lagoa Rasa, 5 inds., 21 de Outubro (S. Rodebrand, J.-M. Breider, P. Forsberg, B. Carlsson);

Pico, Lagoa do Caiado, 3 inds., 2 de Novembro (C. Pereira);

S. Jorge, Fajã dos Cubres, 1 macho, 3 e 4 de Março (M. Oivukka, C. Petander, P. Kuttu); mesmo local, 1 macho, 6 e 7 de Outubro (S. Rodebrand);

S. Miguel, observações na Lagoa Azul e Lagoa Verde: 5 inds., 27 de Janeiro (S. Rodebrand), 5 inds., 12 de Novembro (B. Carlsson, N. de Vries), 10 inds., 5 a 9 de Dezembro (C. Pereira, C. Ribeiro); observações na Lagoa das Furnas: 1 macho, 1 a 21 de Janeiro (T. Valkenburg, C. Pereira, R. Ceia), 6 inds., 26 de Outubro a 10 de Novembro (C. Pereira, C. Ribeiro, J.P. Tavares, L. Costa e outros);

Terceira, Lagoa do Negro, 2 inds., 2 de Novembro (P.-A. Crochet, E. Didner);

Comentário: o número de observações desta espécie feitas nos Açores tem vindo a aumentar, muito devido a um maior esforço por parte dos observadores. Publicam-se apenas os registos mais relevantes, quer devido ao número de aves envolvidas, quer aos locais de observação.



Caturro, Lagoa Azul, S. Miguel, Outubro de 2006 (Carlos Pereira)

Cagarra *Calonectris diomedea*

2006 – Pico/Faial, canal Pico/Faial, 3 inds., 7 de Janeiro (J. Bried);

2007 – Graciosa, ao largo do Ilhéu da Praia, 574 inds., 11 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro);

Comentário: observações feitas em datas precoce e tardia para a presença da cagarra em águas açorianas.

Pardela-de-barrete *Puffinus gravis*

2006 – S. Jorge, 2 milhas a SW da Ponta dos Rosais, 50 inds., 26 de Agosto (R. Guerreiro);

2007 – S. Miguel, Boca da Ribeira, 104 inds. em 30 mins., 16 de Setembro (C. Pereira);

ZEE, Banco Princess Alice, 120 inds., 28 de Outubro (N. Barros);

Comentário: concentrações importantes pelos números envolvidos.

Fura-bucho do Atlântico *Puffinus puffinus*

2007 – Santa Maria, Ilhéu da Vila, 1 ind. a incubar, 29 de Junho (J. Bried, P. Geraldès, V. Paiva);

Comentário: segundo registo de reprodução fora do grupo ocidental.

Garça-real *Ardea cinerea*

2006 – S. Miguel, Lagoa das Furnas, 21 inds., 15 de Fevereiro (R. Guerreiro);

2007 – S. Miguel, observações na Lagoa das Furnas: 16 inds., 1 de Março (C. Pereira), 17 inds., 19 de Outubro (C. Pereira, C. Silva), 17 inds., 31 de Dezembro (C. Silva);

Comentário: concentrações elevadas para esta espécie pouco comum neste arquipélago.

Milhafre *Buteo buteo rothschildii*

2006 – S. Miguel, perto da Lagoa das Furnas, 25 inds., 17 de Outubro (C. Pereira);

2007 – S. Miguel, Ribeirinha, Ribeira Grande, 16 inds., 28 de Fevereiro (C. Pereira);

Comentário: registos interessantes pelo número de aves envolvidas.

Galeirão-comum *Fulica atra*

2006 – S. Miguel, Lagoa das Furnas, 18 inds., 17 de Janeiro (J.P. Tavares);

2007 – S. Miguel, Lagoa Azul, 24 inds., 19 de Outubro (C. Pereira, C. Silva); Lagoa Verde, 27 inds., 5 de Dezembro (C. Pereira);

Comentário: registos de concentrações elevadas para os Açores.

Borrelho-grande-de-coleira

Charadrius hiaticula

2006 – Faial, Porto da Horta, 1 ind., 16 e 26 de Janeiro (J. Bried, V. Neves);

Graciosa, Ilhéu da Praia, 1 juv., 5 a 7 de Setembro (R. Guerreiro);

Pico, Madalena, 1 ind., 19 de Abril (R. Guerreiro);

Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 9 de Fevereiro (J. Bried);

2007 – Pico, Lajes do Pico, 2 inds., 8 de Outubro (R. Guerreiro);

S. Maria, Anjos, 2 inds., 26 de Setembro (S. Parejo, C. Pereira e outros); Aeroporto, 5 inds., 27 de Novembro (S. Parejo);

S. Miguel, Mosteiros, 1 ind., 22 de Setembro (C. Ribeiro); Aeroporto João Paulo II, 2 inds., 16 e 27 de Novembro (S. Parejo);

Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 5 de Setembro (J. Bried, P. Pedro); mesmo local, 2 inds., 19 de Outubro (C. Macet); mesmo local, 3 inds., 15 de Dezembro (J. Bried);

Comentário: espécie de ocorrência rara nos Açores.

Borrelho-de-coleira-interrompida

Charadrius alexandrinus

2007 – S. Maria, Aeroporto de S. Maria, 445 inds., 28 de Setembro (S. Parejo, C. Pereira); mesmo local, 690 inds., 27 de Novembro (S. Parejo);

Comentário: registos referentes a algumas das concentrações mais elevadas registadas nos Açores.

Tarambola-cinzenta *Pluvialis squatarola*

2007 – Graciosa, Ilhéu da Praia, máx. de 7 inds., 7 a 13 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro);

S. Miguel, ETAR de Ponta Delgada, 8 inds., 30 de Novembro (C. Pereira); Aeroporto João Paulo II, 6 inds., 5 de Dezembro (S. Parejo);

Terceira, Cabo da Praia, 5 inds., 15 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro);

Comentário: espécie pouco comum na região, apresentando-se aqui registos referentes às maiores concentrações.

Seixoeira *Calidris canutus*

2006 – Terceira, Cabo da Praia, 3 inds., 16 e 17 de Janeiro (S. Rodebrand);

2007 – Flores, Fajã Grande, 3 inds., 18 de Outubro (C. Macet);

Terceira, Cabo da Praia, 4 inds., 24 e 25 de Janeiro (S. Rodebrand);

Comentário: espécie raramente observada em números superiores aos aqui apresentados, sendo estas as maiores concentrações registadas para o biénio considerado.

Pilrito-pequeno *Calidris minuta*

2007 – Pico, Madalena, 1 ind., 6 de Novembro (C. Pereira);

S. Maria, Prainha, 1 juv., 22 de Abril (C. Silva, J. Benedicto);

S. Miguel, Praia da Ribeira Grande, 3 inds., 12 de Outubro (C. Pereira, C. Silva); Achada das Furnas, 1 ind., 25 de Outubro (C. Pereira); Mosteiros, 1 ind., 1 de Novembro (R. Guerreiro, N. Barros);

Comentário: observações desta espécie escassamente registada na região, destacando-se a observação efectuada a 12 de Outubro de 2007, pelo número de indivíduos envolvidos.

Pilrito-peitoral *Calidris melanotos*

2006 – Terceira, observações no Cabo da Praia: 3 juvs., 15 de Setembro a 6 de Outubro (J.-P. Sibley, S. Sibley, J.-M. Breider, D. Occhiato), 1 ad., 9 de Novembro (K. Haataja, H. Palojärvi);

2007 – Corvo, 4 inds., 19 de Outubro (P. Alfrey);

Flores, Ponta Delgada, 1 ind., 4 a 18 de Outubro (C. Inskipp, T. Inskipp); Aeroporto, 2 inds., 10 a 17 de Outubro (C. Inskipp, T. Inskipp, V. Stork, T. Joppejan);

Pico, Lajes do Pico, 1 juv., 22 de Setembro a 14 de Outubro (T. Andersen, M. Pettersen, J. Quaresma);

S. Maria, Ginjal, 1 ind., 27 e 28 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo);

S. Miguel, Achada das Furnas: 1 ind., 25 de Junho (C. Pereira) e 4 inds., 28 de Outubro (C. Pereira);

Terceira, Cabo da Praia, 2 ads., 21 de Agosto (I. Sahi, J. Riihimäki) e 4 inds., 11 de Outubro (H. Westerberg, S. Rodebrand, T. Cooney e outros);

Comentário: limícola de origem neártica, de ocorrência rara nos Açores.



Pirlito-peitoral, achada das furnas, s. Miguel, setembro de 2007 (carlos pereira)

Pirlito-de-bico-comprido *Calidris ferruginea*

2006 – Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 11 de Setembro (R. Guerreiro);

2007 - S. Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind., 23 de Novembro (C. Ribeiro); ETAR de Ponta Delgada, 1 ind., 30 de Novembro (C. Pereira);

Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 7 de Dezembro (J. Bried);

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Pirlito-de-uropígio-branco *Calidris fuscicollis*

2006 – Corvo, Caldeira, 2 inds., 12 de Setembro (J.-P. Sibley); mesmo local, 3 inds., 21 a 23 de Outubro (P. Alfrey);

Terceira, observações no Cabo da Praia: 8 inds., 16 e 17 de Janeiro (S. Rodebrand), 4 inds., 5 de Setembro (B. Carlsson, I. Torsson), 2 inds., 22 de Setembro (J.-M. Breider), 9 inds., 19 de Outubro (P. Alfrey), 5 inds., 24 de Outubro e 2 de Novembro (B. Carlsson);

2007 – Corvo, 3 inds., 17 de Outubro (P. Alfrey, R.-M. Lafontaine);

Flores, Fajã Grande, 10 inds., 9 de Outubro (C. Inskipp, T. Inskipp, S. Rodebrand); Aeroporto de Santa Cruz, 12 inds., 10 de Outubro (T. Inskipp, C. Inskipp); Ponta do Albarnaz, 6 inds., 18 de Outubro (V. Stork, T. Koppejan, S. Rodebrand);

Pico, Lajes do Pico, 2 inds., 14 de Outubro (J. Quaresma); Madalena, 2 inds., 2 de Novembro (P.-A. Crochet, E. Didner);

S. Miguel, Lagoa Azul, 7 inds., 12 de Outubro (C. Ribeiro, A. Nava); Lagoa das Furnas, 2 inds., 19 de Outubro (C. Pereira, C. Silva); Mosteiros, 2 inds., 19 a 25 de Outubro (C. Pereira, C. Silva, C. Ribeiro e outros); Ribeira Grande, 2 inds., 11 de

Novembro (C. Ribeiro);

Terceira, observações no Cabo da Praia: 15 inds., 14 a 21 de Outubro (T. Clooney, E. Didner, P.-A. Crochet, I. Torsson, S. Aberg), 2 inds., 7 de Novembro (I. Torsson, S. Aberg), 1 ind., 7 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro);

Comentário: espécie de distribuição neártica, e que vem sendo mais frequentemente registada na região; note-se que as maiores concentrações foram registadas durante o mês de Outubro, naquela que parece ser a melhor altura para a observação desta espécie nos Açores, com um máximo de 15 exemplares observados no Cabo da Praia no Outono de 2007.



Pirlito-de-uropígio-branco, Mosteiros, S. Miguel, Outubro de 2007 (Carlos Ribeiro)

Milherango *Limosa limosa*

2006 – S. Miguel, Canada Larga, 1 ind., 26 de Outubro (C. Pereira); Covoada, 1 ind., 16 de Novembro (C. Pereira); Aeroporto João Paulo II, 1 ind., 6 de Dezembro (C. Pereira);

2007 – Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 24 de Julho (J. Bried); mesmo local, 4 inds., 5 de Setembro (J. Bried, P. Pedro); mesmo local, 6 inds., 3 de Novembro (I. Torsson, S. Aberg);

Comentário: observações desta espécie pouco habitual na região, com destaque para o registo feito no mês de Julho, período atípico para a presença da espécie.

Perna-verde *Tringa nebularia*

2006 – Pico, Lajes do Pico, 2 inds., 11 e 15 de Abril (R. Guerreiro);

S. Miguel, Lagoa Azul, 2 inds., 13 de Janeiro (S. Rodebrand);

2007 – Pico, observações nas Lajes do Pico: 3 inds., 8 de Outubro (R. Guerreiro), 2 inds., 5 de Novembro (C. Pereira);

S. Maria, Ginjal, 2 inds., 24 a 28 de Setembro

(C. Pereira, S. Parejo); Ribeira, 2 inds., 25 e 27 de Novembro (S. Parejo);

S. Miguel, Achada das Furnas, 2 inds., 3 de Outubro (C. Pereira);

Terceira, Cabo da Praia, 2 juvs., 5 de Setembro (J. Bried, P. Pedro);

Comentário: *observações respeitantes a dois ou mais exemplares desta espécie frequente na região; habitualmente apenas são registados indivíduos isolados.*

Perna-amarela-pequeno *Tringa flavipes*

2006 – Corvo, Caldeirão, 1 ind., 6 de Outubro (A. McMillan);

Flores, Lagoa Rasa, 1 ind., 7 e 8 de Outubro (D. Occhiato);

Terceira, observações no Cabo da Praia: 3 inds., 3 a 9 de Outubro (D. Occhiato), 2 inds., 19 de Outubro (P. Alfrey), 1 ind., 30 de Outubro e 2 de Novembro (P. Beja, B. Carlsson);

2007 – Corvo, 1 ind., 1 a 17 de Outubro (C. Inskipp, T. Inskipp, P. Alfrey);

Faial, Lagoa de Pedro Miguel, 1 ind., 10 de Novembro (M. Laranjo, H. Fraga);

Flores, Ponta Delgada, 1 ind., 11 de Outubro (R. Sottorf);

Pico, Madalena, 1 ind., 10 de Setembro (J. Hart); Lagoa do Capitão, 1 ind., 1 de Novembro (C. Pereira);

S. Miguel, Lagoa Verde, 2 inds., 19 a 29 de Outubro (C. Pereira, C. Silva e outros); mesmo local, 1 ind., 31 de Outubro a 2 de Novembro (C. Pereira, R. Guerreiro, N. Barros); Achada das Furnas, 1 ind., 25 a 28 de Outubro (C. Pereira e outros);

Terceira, observações no Cabo da Praia: 1 juv., 5 de Setembro (J. Bried, P. Pedro), 2 inds., 19 a 24 de Setembro (T. Andersen, M. Pettersen, H. Westerberg), 1 ind., 27 de Outubro a 7 de Novembro (I. Torsson, S. Aberg); Lagoa do Ginjal, 1 ind., 20 de Setembro (T. Andersen, M. Pettersen); Aeroporto das Lajes, 1 ind., 20 de Outubro (V. Stork, T. Koppejan);

Comentário: *limícola de origem neártica, de ocorrência rara nos Açores.*



Perna-amarela, Lagoa Verde, S. Miguel, Outubro de 2007 (Carlos Pereira)

Maçarico-pintado *Actitis macularius*

2006 – Faial, Porto Pim, 2 inds., 2 de Novembro (J. Bried);

Flores, Lajes, 1 ind., 30 de Janeiro a 10 de Fevereiro (S. Rodebrand); mesmo local, 1 juv., 17 de Outubro (S. Rodebrand); observações na Fajã Grande, 1 ind., 17 de Abril (S. Newson), 1 juv., 10 e 11 de Setembro (J.-P. Siblet), 1 ind., 3 a 7 de Novembro (S. Rodebrand); Santa Cruz, 1 ind., 20 a 24 de Dezembro (A. Ollé, P. Serrano, T. Mampel, J. M-Aledo);

Pico, observações nas Lajes do Pico: 1 ad., 12 e 14 de Agosto (D. Parnaby, S. Parnaby), 2 juvs., 25 de Setembro (J. Quaresma), 1 juv., 16 de Novembro (S. Rodebrand, C. Cederroth); a sul do Calhau, 1 juv., 20 de Setembro (J.-P. Siblet, S. Siblet) e 1 ind., 2 de Novembro (P.-A. Crochet, F. Jiguet); Madalena, 1 ind., 2 de Novembro (P.-A. Crochet, F. Jiguet);

S. Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind., 20 de Outubro (P.-A. Crochet); Fajã dos Vimas, 1 ind., 21 de Outubro (P.-A. Crochet);

S. Miguel, observações na Lagoa das Furnas: 1 ad., 6 de Agosto (D. Parnaby, S. Parnaby), 1 ind., 30 de Setembro a 10 de Outubro (D. Moreno, M. Mustafá, C. Pereira); Povoação, 1 ind., 30 de Setembro (D. Occhiato); Lagoa das Sete Cidades, 3 inds., 25 de Outubro a 6 de Novembro (S. Haavisto, J. Ness, C. Damián e outros); Ponta Delgada, 1 ind., 28 de Outubro e 4 de Novembro (P. Rodrigues, P.-A. Crochet);

Terceira, observações no Cabo da Praia: 1 ind., 5 e 15 de Setembro (B. Carlsson, I. Torsson, J.-P. Siblet, S. Siblet), 3 inds., 3 a 6 de Outubro (D. Occhiato), 1 ind., 3 a 10 de Novembro (B.

Carlsson, K. Haataja, H. Palojarvi), 1 ind., 21 a 31 de Dezembro (A. Ollé, P. Serrano, T. Mampel, J. M-Aledo);

2007 – Corvo, 3 inds., 14 de Outubro (D. Mitchell, B. Carlsson);

Flores, Fajã Grande, 3 inds., 31 de Outubro (K. de Rouck, D. Collin);

Pico, Lajes do Pico, 2 inds., 8 de Outubro (R. Guerreiro); mesmo local, 3 inds., 2 de Novembro (P.-A. Crochet, E. Didner);

S. Miguel, observações na Lagoa Azul: 2 inds., 1 a 28 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson, S. Haavisto, R.-M. Lafontaine), 3 inds., 23 a 27 de Outubro (C. Ribeiro, C. Pereira e outros), 2 inds., 2 de Outubro (R. Guerreiro, N. Barros); Lagoa das Furnas, 2 inds., 19 de Outubro (C. Pereira, C. Silva);

Comentário: como se constata pelo número de observações aqui apresentados, trata-se de uma limícola regularmente observada na região, embora em efectivos reduzidos.



Maçarico-pintado, Lagoa Azul, S. Miguel, Outubro de 2007 (Carlos Ribeiro)

Guincho-comum *Larus ridibundus*

2006 – S. Miguel, Porto de Ponta Delgada, 105 inds., 15 de Janeiro (S. Rodebrand); mesmo local, 75 inds., 10 de Novembro (C. Pereira);

Terceira, Baía da Praia da Vitória, 560 inds., 16 de Janeiro (S. Rodebrand);

2007 – Faial, S. Bárbara, 24 inds., 23 e 25 de Janeiro (J. Bried); mesmo local, 35 inds., 26 de Dezembro (J. Bried);

S. Miguel, Porto de Ponta Delgada, 180 inds., 25 de Novembro (C. Pereira);

Terceira, Baía da Praia da Vitória, 250 inds., 25 a 27 de Janeiro (S. Rodebrand);

Comentário: concentrações relevantes pelos números

envolvidos, destacando-se a espectacular observação feita em Janeiro de 2007 na Terceira, uma das maiores documentadas para a região.

Gaivota-de-bico-riscado *Larus delawarensis*

2006 – Faial, Porto da Horta, 2 inds. de 1º Inv., 31 de Dezembro (J. Bried);

Flores, Lajes, 2 ads., 22 e 25 de Dezembro (A. Ollé, P. Serrano, T. Mampel, J. M-Aledo);

S. Miguel, Lagoa das Sete Cidades, 2 inds., 13 de Janeiro a 14 de Fevereiro (S. Rodebrand, P. Ulrik, J. Hansen); observações no Porto de Ponta Delgada: 3 inds., 13 a 20 de Fevereiro (R. Guerreiro, P. Ulrik, J. Hansen) e 4 inds., 25 de Março (B. Carlsson);

Terceira, observações na Baía da Praia da Vitória: 3 inds., 9 a 13 de Fevereiro (J. Bried, S. Rodebrand), 6 inds., 19 de Dezembro (J. Bried), 25 inds., 27 de Dezembro (A. Ollé, P. Serrano, T. Mampel, J. M-Aledo);

2007 – S. Miguel, observações no Porto de Ponta Delgada: 4 inds., 19 de Janeiro (J. Bried), 5 inds., 11 de Fevereiro (C. Pereira), 4 inds., 8 e 29 de Março (C. Pereira), 4 inds., 29 de Abril (C. Pereira, A. Pereira), 2 inds., 4 de Dezembro (C. Ribeiro);

Terceira, Baía da Praia da Vitória, 26 inds., 25 a 27 de Janeiro (S. Rodebrand); mesmo local, 14 inds., 8 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro);

Comentário: apresentam-se observações relevantes pelos números envolvidos.



Gaivota-de-bico-riscado, Praia da Vitória, Novembro de 2007 (Joël Bried)

Gaiivotão-real *Larus marinus*

2006 – Flores, Santa Cruz, 7 inds., 30 de Janeiro a 11 de Fevereiro (S. Rodebrand);

S. Miguel, Porto de Ponta Delgada, 2 inds., 5 de Dezembro (C. Pereira);

Terceira, Baía da Praia da Vitória, 8 inds., 17 de

Janeiro a 13 de Fevereiro (S. Rodebrand);
2007 – Corvo, Aeroporto, 2 juvs., 30 de Outubro (I. Torsson, S. Aberg);

Faial, Horta, 3 inds., 17 de Janeiro (J. Bried);
S. Miguel, observações no Porto de Ponta Delgada: 4 inds., 19 de Janeiro (J. Bried), 7 inds., 19 de Fevereiro (C. Pereira), 4 juvs., 28 de Fevereiro a 17 de Março (C. Pereira, T. Valkenburg), 3 inds., 13 de Abril (C. Pereira); observações na Ribeira Grande: 3 juvs., 28 de Janeiro (T. Valkenburg), 8 inds., 16 de Fevereiro (T. Valkenburg), 4 inds., 26 de Março (C. Pereira), 2 inds., 4 de Abril (C. Pereira, A. Pereira), 1 ind., 1 de Junho (C. Pereira); Praia do Pópulo, 2 juvs., 22 a 28 de Fevereiro (C. Pereira); Vila Franca do Campo, 3 juvs., 2 a 15 de Março (C. Pereira);

Comentário: *invernante que aparentemente é frequente nos Açores, embora em números reduzidos; apresentam-se registos referentes a dois ou mais exemplares juntos.*



Gaiivotão-real, Ponta Delgada, Dezembro de 2006 (Carlos Pereira)

Gaiivota-tridáctila *Rissa tridactyla*

2007 – S. Miguel, Porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 1 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson); frente à Boca da Ribeira do Nordeste, 78 inds., 29 de Fevereiro (J. Valkenburg, T. Valkenburg);

Terceira, em frente ao Cabo da Praia, 5 ads., 25 e 26 de Janeiro (S. Rodebrand);

Comentário: *espécie raramente registada a partir das ilhas; note-se o número elevado de aves observado em*

Fevereiro em S. Miguel.

Garajau-comum *Sterna hirundo*

2006 – Faial, Horta, 1 ind., 15 de Dezembro (J. Bried);

S.ª Maria, Vila do Porto, 1 ind. de 1º Inv., 17 de Janeiro (J. Bried);

2007 – Terceira, porto de pesca de Praia da Vitória, 1 ind., 7 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro);

Comentário: *registos tardios e uma observação precoce deste nidificante estival comum no Arquipélago dos Açores.*

Garajau-rosado *Sterna dougallii*

2007 – S. Miguel, Porto de Ponta Delgada, 5 inds., 1 de Dezembro (G. Dias);

Comentário: *observação em período em que a espécie é escassamente registada.*

Bufo-pequeno *Asio otus*

2007 – ZEE, 110 milhas náuticas a SSW do Faial, 1 ind., 28 de Outubro (N. Barros);

Comentário: *registo em habitat atípico para esta rapina nocturna.*

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

2006 – Corvo, Caldeirão, 1 casal, Maio (J. Hering);
S. Miguel, Achada das Furnas, 3 inds., 8 de Outubro (C. Pereira);

2007 – S.ª Maria, Aeroporto de S. Maria, 6 inds., 24 de Setembro (C. Pereira, S. Parejo);

S. Miguel, Achada das Furnas, 3 inds., 18 de Setembro (C. Pereira); Planalto dos Graminhais, 2 inds., 19 de Setembro (C. Pereira);

Comentário: *observações de concentrações desta espécie migradora de passagem frequente, mas pouco comum; ainda um registo em período de nidificação na ilha do Corvo.*

Priolo *Pyrrhula murina*

2007 – S. Miguel, Lagoa das Furnas, 2 inds., 1 de Dezembro (C. Pereira, C. Ribeiro, S. Parejo e outros);

Comentário: *merece destaque esta observação por tratar-se do registo mais a oeste de que se tem conhecimento, desta espécie endémica habitualmente confinada a uma área exígua da ilha de S. Miguel.*

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

Marrequinha *Anas crecca*

2006 – **Madeira**, Lagoa do Lugar de Baixo, 2 inds., 22 a 25 de Novembro (J. Martin);

2007 – **Madeira**, Lagoa do Caramujo, 4 inds., 30 de Dezembro (G. Silva);

Comentário: *espécie raramente registada na região.*

Pato-real *Anas platyrhynchos*

2006 – **Madeira**, Ribeira da Janela, 3 inds., 21 de Janeiro (D. Mangsbo);

2007 – **Madeira**, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 macho, 3 de Janeiro (C. Fagundes, H. Romano); mesmo local, 2 machos, 22 de Fevereiro (C. Fagundes, H. Romano); mesmo local, 1 macho, 17 de Agosto (M. Ullman);

Comentário: *anatídeo de ocorrência rara na Madeira.*

Cagarra *Calonectris diomedea*

2007 – **Madeira**, ao largo da Lagoa do Lugar de Baixo, 6 inds., 13 de Janeiro (P. Veron, S. Veron, C. Kinnersly);

Comentário: *observação em data precoce para a presença desta espécie na Madeira.*

Alma-negra *Bulweria bulwerii*

2007 – **Madeira**, Porto Moniz, 1200 inds./h ao final da tarde, 29 de Agosto (S. Addinall);

Comentário: *contagem elevada para esta espécie.*

Pardela-de-barrete *Puffinus gravis*

2006 – **Madeira**, observações de aves em passagem por Porto Moniz: 4272 inds., 24 de Agosto (E. Christophersen, L. Mortensen, T. Jansen), 1551 inds., 27 de Agosto (O. Jonsson, J. Segergren, E. Christophersen, L. Mortensen), 5023 inds., 1 de Setembro (P. Eriksson, U. Carlsson), 6600 inds., 2 de Setembro (P. Eriksson, U. Carlsson), 1500 inds., 4 de Setembro (L. Dehlin, L. Nilsson, P. Muhr, B. Andersson), 3000 inds., 11 de Setembro (M. Altieri);

2007 – **Madeira**, Entre a Madeira e as Desertas, 1 ind., 3 de Março (I. Fagundes, L. Dias); Porto Moniz, 4200 inds. em passagem, 16 de Setembro (F. Ishoi);

Comentário: *números elevados da passagem desta ave marinha pela ilha da Madeira, indiciando ser este um dos locais mais importantes para a observação da sua*

migração; ainda um registo em data atípica.

Pardela-preta *Puffinus griseus*

2006 – **Madeira**, observações de aves em passagem por Porto Moniz: 6 inds., 22 de Agosto (E. Christophersen, L. Mortensen), 9 inds., 1 de Setembro (P. Eriksson, U. Carlsson), 3 inds., 4 de Setembro (L. Dehlin, L. Nilsson, P. Muhr, B. Andersson);

2007 – **Madeira**, observações de aves em passagem por Porto Moniz: 1 ind., 16 e 17 de Agosto (M. Ullman), 1 ind., 3 de Outubro (J. Vickerman);

Comentário: *espécie de ocorrência rara na região.*

Fura-bucho do Atlântico *Puffinus puffinus*

2006 – **Madeira**, em passagem por Porto Moniz, 996 inds., 8 de Setembro (L. Dehlin, L. Nilsson, P. Muhr, B. Andersson);

2007 – **Madeira**, observações de aves em passagem por Porto Moniz: 8300 inds., 16 de Setembro (F. Ishoi); 3500 inds., 17 de Setembro (F. Ishoi), 3000 inds., 18 de Setembro (F. Ishoi), 10500 inds., 19 de Setembro (F. Ishoi);

Comentário: *contagens de aves em passagem que envolvem números impressionantes.*

Pintainho *Puffinus assimilis*

2006 – **ZEE**, 75 milhas a N da Madeira, 6 inds., 25 de Setembro (C. Noivo, A.H. Leitão);

Comentário: *trata-se de uma observação que envolve números elevados, dado que esta pardela habitualmente é observada isolada ou em pares.*

Freira do Bugio *Pterodroma feae*

2007 – **Desertas**, Bugio, 6 milhas a W do Bugio, 11 inds., 24 de Novembro (R. Guerreiro);

Comentário: *observação rara pelo número de aves envolvidas.*

Roquinho *Oceanodroma castro*

2006 – **ZEE**, Banco Ampère, cerca de 200 milhas a NE de Porto Santo, 28 inds. em 2 bandos, 27 de Setembro (C. Noivo, A.H. Leitão);

Comentário: *uma concentração elevada para esta espécie marinha que raramente é encontrada em bandos desta dimensão.*

Alcatraz *Morus bassanus*

2006 – Madeira, frente a Porto Moniz, 1 ind., 21 de Janeiro (D. Mangsbo);

2007 – Desertas, ao largo, 1 ad., 2 de Fevereiro (N. Crouch);

Madeira, Porto Moniz, 2 inds., 29 de Janeiro (A.H. Leitão);

ZEE, 15 milhas a norte da Madeira, 1 ad., 1 de Fevereiro (A.H. Leitão); 50 milhas a NE de Porto Santo, 2 inds., 11 de Fevereiro (A.H. Leitão); cerca de 190 milhas a WNW da Ponta do Pargo, 1 juv., 17 de Novembro (R. Guerreiro);

Comentário: espécie raramente registada junto ao arquipélago da Madeira.

Papa-ratos *Ardeola ralloides*

2006 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 27 e 28 de Maio (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: registo referente a espécie de ocorrência rara na região.

Carraceiro *Bubulcus ibis*

2004 – ZEE, 31°17'N e 16°00'W, 160km a S da Madeira, 1 ind., 8 e 9 de Novembro (R. Wynn);

2006 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 25 de Novembro (J. Martin); mesmo local, 2 inds., 4 de Dezembro (G. Boomhouwer);

2007 – Madeira, observações na Lagoa do Lugar de Baixo: 3 inds., 25 de Janeiro (N. Crouch), 1 ind., 22 de Outubro (C. Fagundes, H. Romano), 1 ind., 3 de Novembro a 31 de Dezembro (J. Martin, H. Romano, C. Fagundes, M. Suárez, G. Silva); Porto do Funchal, 1 ind., 29 de Janeiro (A.H. Leitão); Ponta de S. Lourenço, 3 inds., 12 de Dezembro (G. Silva);

Comentário: espécie escassamente registada na região, destacando-se o número elevado de observações aqui apresentados.

Garça-branca-pequena *Egretta garzetta*

2007 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 10 inds., 30 de Janeiro (N. Crouch); zona velha do Funchal, 8 inds., 25 de Novembro (C. Gutierrez);

Comentário: apresentamos observações de concentrações elevadas para esta região, onde esta espécie é pouco comum.

Garça-real *Ardea cinerea*

2007 – Desertas, Deserta Grande, 1 ind., 2 de Fevereiro (N. Crouch);

Porto Santo, Tanque, 7 inds., 6 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: uma observação nas Desertas, onde esta espécie é de ocorrência rara, e uma concentração elevada tendo em conta a região.

Gavião *Accipiter nisus*

2007 – Desertas, Deserta Grande, 2 inds., 16 de Julho (C. Fagundes);

Comentário: apesar de residente na ilha da Madeira, esta espécie raramente é registada nas Desertas.

Galeirão-comum *Fulica atra*

2006 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 35 inds., 16 de Janeiro (D. Mangsbo);

2007 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 36 inds., 29 de Dezembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: observações de concentrações elevadas.

Ostraceiro *Haematopus ostralegus*

2007 – Madeira, Marina do Funchal, 1 ind., 29 de Setembro (J. Vickerman);

Comentário: migrador de passagem escasso na região.

Abibe *Vanellus vanellus*

2004 – ZEE, 31°17'N e 16°00'W, 160km a S da Madeira, 1 ind., 8 de Novembro (R. Wynn);

Comentário: uma observação fora dos habitats de ocorrência habitual da espécie, referindo-se certamente a uma ave em passagem.

Taralmbola-cinzenta *Pluvialis squatarola*

2007 – Desertas, Deserta Grande, 1 ind., 13 de Agosto (S. Minton);

Madeira, Ribeira Brava, 1 ind., 1 de Fevereiro (N. Crouch); Porto Moniz, 1 ind., 29 de Agosto e 2 de Setembro (T. Epple, J. Vermehren); Ponta da Cruz, 1 ad., 19 de Setembro (P. Saarinen, A. Saarinen);

Comentário: limícola escassamente registada na Madeira.

Borrelho-grande-de-coleira *Charadrius hiaticula*

2007 – Madeira, Machico, 2 inds., 19 de Agosto e 25 de Setembro (M. Ullman, J. Vickerman); Funchal, 1 ind., 24 de Setembro (J. Vickerman); Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 22 de Outubro (C. Fagundes, H. Romano); mesmo local, 1 ind. 15 de Novembro a 31 de Dezembro (C. Durdin, C. Fagundes, H. Romano, R. Guerreiro, M.

Suárez, G. Silva); Porto do Funchal, 3 inds., 10 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano);

Porto Santo, Ponta da Calheta, 2 inds., 24 de Setembro (P. Saarinen, A. Saarinen);

Comentário: espécie raramente observada neste arquipélago.

Seixoeira *Calidris canutus*

2006 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 27 de Agosto (C. Fagundes, H. Romano);

2007 – Madeira, Porto do Funchal, 2 inds., 4 a 19 de Agosto (M. Ullman, L. Teugels, M. van Heutte); S. Vicente, 2 juvs., 24 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: espécie raramente observada na Madeira.

Pilrito-pequeno *Calidris minuta*

2007 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 12 de Novembro a 31 de Dezembro (C. Fagundes, H. Romano, M. Suárez, G. Silva); Ribeira de Machico, 1 ind., 17 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: espécie cujo número de registos efectuados na Madeira é escasso.

Pilrito-de-bico-comprido *Calidris ferruginea*

2006 – Madeira, foz da Rib^a. de Machico, 1 ind., 6 de Janeiro (D. Hurst);

2007 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 12 a 15 de Novembro (C. Durdin, C. Fagundes, H. Romano); mesmo local, 2 inds., 24 a 29 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano); mesmo local, 1 ind., 22 de Dezembro (G. Silva); Ribeira de Machico, 1 ind., 17 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: registos desta espécie de ocorrência rara.

Pilrito-de-peito-preto *Calidris alpina*

2006 – Madeira, Machico, 12 inds., 30 de Abril (L. Dias);

2007 – Madeira, observações na Lagoa do Lugar de Baixo: 4 inds., 25 de Novembro (M. Suárez, G. Silva), 3 inds., 1 a 22 de Dezembro (G. Silva, M. Suárez), 4 inds., 31 de Dezembro (G. Silva);

Comentário: observações referentes às maiores concentrações observadas no arquipélago, desta espécie habitualmente presente durante a passagem migratória, mas sempre em números reduzidos. Destaca-se a impressionante concentração observada

em 2006, provavelmente a maior documentada para a região.

Milherango *Limosa limosa*

2007 – Porto Santo, Tanque, 1 ind., 8 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: uma observação desta limícola de ocorrência rara na região.

Fuselo *Limosa lapponica*

2007 – Madeira, 3,5 milhas a SE da Ponta do Sol, 8 inds., 26 de Abril (R. Guerreiro); Funchal, 1 ind., 14 de Novembro (C. Gutierrez, M. Suárez); Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 12 de Novembro a 1 de Dezembro (C. Fagundes, H. Romano, M. Suárez, G. Silva, R. Guerreiro); S. Vicente, 1 ind., 24 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: registos deste migrador de passagem escasso na região.



Fuselo, Lagoa do Lugar de Baixo, Novembro de 2007 (Ricardo Guerreiro)

Maçarico-galego *Numenius phaeopus*

2007 – Madeira, Porto Moniz, 164 inds. em passagem, 15 de Agosto (S. Minton); mesmo local, 170 inds. em passagem, 16 de Agosto (M. Ullman);

Porto Santo, Miradouro dos Morenos, 51 inds., 8 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: registos de concentrações elevadas para o arquipélago da Madeira.

Perna-verde *Tringa nebularia*

2006 – Porto Santo, Tanque, 1 ind., 1 a 6 de Dezembro (R. Goater, G. Boomhouwer);

2007 – Madeira, Machico, 1 ind., 23 de Maio (C. Fagundes); mesmo local, 1 ind., 15 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano); Lagoa do Lugar de

Baixo, 1 ind., 29 de Novembro a 31 de Dezembro (C. Fagundes, G. Silva, M. Suárez); Tanque do Santo da Serra, 1 ind., 2 de Dezembro (M. Suárez, G. Silva);

Porto Santo, Tanque, 2 inds., 24 de Setembro (P. Saarinen, A. Saarinen); mesmo local, 3 inds., 27 de Setembro (I. Fagundes, J. Nunes);

Comentário: migrador de passagem raro na região.

Perna-vermelha *Tringa totanus*

2007 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 2 inds., 10 e 11 de Março (H. Romano, N. Fernandes);

Machico, 1 ind., 23 de Maio (C. Fagundes);

Comentário: observações desta limícola escassamente registada na região.

Maçarico-bastardo *Tringa glareola*

2007 – Porto Santo, Tanque, 1 ind., 8 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: observação desta espécie com escassos registos para a região.

Alcaide *Stercorarius skua*

2006 – Madeira, Lido, 1 ind., 26 de Março (T. Evald); frente a Porto Moniz, 1 ind., 1 de Setembro (P. Eriksson, U. Carlsson);

2007 – Madeira, ao largo da Ponta de S. Lourenço, 1 ind., 29 de Janeiro (A.H. Leitão); Ponta da Cruz, 1 ind., 29 de Agosto (A. Sandberg); Porto Moniz, 1 ind., 2 de Setembro (T. Epple); mesmo local, 1 ind., 23 de Setembro (F. Ishol);

Porto Santo, 8 milhas a norte do Ilhéu de Fora, 1 ad., 6 de Fevereiro (A.H. Leitão);

Comentário: ave marinha de presença rara no arquipélago.

Moleiro do Ártico *Stercorarius pomarinus*

2006 – Madeira, frente a Porto Moniz: 8 inds., 23 de Agosto (E. Christophersen, L. Mortensen);

2007 – Madeira, observações de aves em passagem por Porto Moniz: 4 inds., 4 de Setembro (T. Epple, J. Vermehren), 12 inds., 8 de Setembro (A. Sandberg), 13 inds., 9 de Setembro (A. Sandberg), 5 inds., 10 de Setembro (A. Sandberg), 18 ads., 17 de Setembro (F. Ishoi), 6 inds., 18 de Setembro (F. Ishoi);

ZEE, 158 milhas a NW da Ponta do Pargo, 1 ad., 28 de Abril (R. Guerreiro);

Comentário: contagens elevadas para a passagem outonal, e uma observação na passagem pré-nupcial,

período em que esta espécie é raramente observada na região.



Moleiro do Ártico, ao largo da Ponta do Pargo, Novembro de 2007 (Ricardo Guerreiro)

Moleiro-pequeno *Stercorarius parasiticus*

2006 – Madeira, observações de aves em passagem por Porto Moniz, 7 inds., 23 de Agosto (E. Christophersen, L. Mortensen), 10 inds., 26 de Agosto (O. Jonsson, J. Segergren);

2007 – Madeira, observações de aves em passagem por Porto Moniz: 6 inds., 19 de Agosto (S. Minton), 17 inds., 21 de Agosto (J. Piette) 26 ads, 6 de Setembro (A. Sandberg);

Comentário: contagens elevadas tendo em conta que a espécie é raramente registada na região.

Guincho-comum *Larus ridibundus*

2006 – Madeira, Porto do Funchal, 25 inds., 18 a 5 de Março (D. Mansbo, H. Hoiby); Porto do Funchal, 15 inds., 24 de Novembro (J. Martin);

2007 – Madeira, observações no Porto do Funchal: 14 inds., 7 de Janeiro (C. Fagundes, H. Romano), 18 inds., 25 de Janeiro (N. Crouch);

Porto Santo, Porto de Abrigo, 1 ind., 29 de Setembro (I. Fagundes, J. Nunes); Tanque, 1 ind., 31 de Dezembro (I. Fagundes, J. Nunes);

Comentário: concentrações elevadas para este invernante raro na Madeira, e ainda registos em Porto Santo onde a presença desta espécie está mal documentada.

Gaivota-de-bico-riscado *Larus delawarensis*

2006 – Madeira, observações no Porto do Funchal: 4 inds., 18 a 22 de Janeiro (D. Mansbo), 1 ind. de 1º Inv., 25 de Fevereiro (G. Elias), 2 inds. de 2º ano, 5 de Março (H. Hoiby), 3 inds., 21 de Março

(T. Evald), 2 inds., 26 de Novembro (J. Martin);
2007 – Madeira, Porto do Funchal, 1 ind. de 1º Inv., 29 de Dezembro (C. Fagundes, H. Romano);
Comentário: *gaiivota de origem neártica de ocorrência rara na região.*

Gaiivota-d'asa-escura *Larus fuscus*

2006 – Madeira, observações no Porto do Funchal: 8 inds., 9 a 15 de Julho (D. Charles), 35 inds., 24 de Novembro (J. Martin);

Porto Santo, Porto de Abrigo, 1 ind., 8 de Julho (A. Tarozzi);

2007 – Madeira, Porto do Funchal, 3 inds., 24 de Janeiro (N. Crouch); Porto do Funchal, 5 inds., 30 de Setembro (J. Vickerman);

Comentário: *invernante raro na região.*

Gaiivota-tridáctila *Rissa tridactyla*

2006 – Desertas, Deserta Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 20 de Janeiro (D. Mangsbo);

2007 – Madeira, mar da Calheta, 1 ind., 26 de Fevereiro (C. Gomes);

ZEE, 120 milhas a norte da Madeira, 9 inds., 23 de Janeiro (A.H. Leitão);

Comentário: *observações desta espécie que raramente ocorre em latitudes tão a sul como as aqui apresentadas.*

Garajau-comum *Sterna sandvicensis*

2006 – Madeira, Porto do Funchal, 1 ind., 25 de Fevereiro (G. Elias);

2007 – Madeira, Porto do Funchal, 1 ind., 9 de Dezembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: *espécie raramente registada na Madeira.*

Garajau-rosado *Sterna dougallii*

2006 – Madeira, observações no Porto do Funchal: 2 inds., 7 de Janeiro (C. Fagundes), 1 ad., 22 e 31 de Janeiro (D. Mangsbo, K. Fries);

2007 – Madeira, Porto do Funchal, 2 inds., 7 a 31 de Janeiro (C. Fagundes, H. Romano, P. Veron, S. Veron, C. Kinnersly, N. Crouch); mesmo local, 2 inds., 27 de Novembro a 9 de Dezembro (R. Guerreiro, C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: *espécie pouco comum neste arquipélago, apresentando-se observações que ilustram a presença de alguns exemplares em período de Inverno, o que constituem observações inusitadas deste nidificante estival no Paleártico Ocidental.*

Gaivina-comum *Sterna hirundo*

2006 – Madeira, em passagem por Porto Moniz, 600 inds., 3 de Setembro (L. Dehlin, L. Nilsson, P. Muhr, B. Andersson); Porto do Funchal, 2 inds., 10 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano); mesmo local, 1 ind., 22 de Novembro (J. Martin);

2007 – Madeira, Porto do Funchal, 2 inds., 10 de Novembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: *uma contagem elevada na passagem pós-nupcial e registos tardios para esta espécie estival.*

Rola-brava *Streptopelia turtur*

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 1 ind., 18 de Julho (A. Tarozzi); Ponta do Pargo, 1 ind., 7 de Setembro (L. Dehlin, L. Nilsson, P. Muhr, B. Andersson);

Porto Santo, Campo de Golfe, 2 inds., 28 de Agosto (O. Jonsson, J. Segergren);

ZEE, cerca de 280 kms a NE da Madeira, 1 juv., 25 de Setembro (C. Noivo, A.H. Leitão);

2007 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 3 de Janeiro (C. Fagundes, H. Romano); Ponta do Pargo, 1 ind., 27 de Julho (Y. Salm, B. Lange);

Comentário: *migrador de passagem raro na região.*

Pombo da Madeira *Columba trocaz*

2007 – Madeira, Miradouro dos Balcões, 20 inds., 27 de Novembro (R. Guerreiro, I. Fagundes, M. Suárez);

Comentário: *esta espécie endémica da Madeira raramente é observada em concentrações desta dimensão.*

Poupa *Upupa epops*

2006 – Porto Santo, Campo de Golfe, 50 inds., 28 de Agosto (O. Jonsson, J. Segergren);

Comentário: *observação de uma concentração elevada para a região.*

Laverca *Alauda arvensis*

2004 – ZEE, 31°26'N e 17°13'W, 2 inds., 5 de Novembro (R. Wynn); 31°17'N e 16°00'W, 160km a S da Madeira, 3 inds., 8 de Novembro, (R. Wynn);

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 25 inds., 19 de Janeiro (D. Mangsbo); mesmo local, 2 inds., 27 de Novembro (G. Boomhouwer);

2007 – Madeira, Quinta do Furão, 1 ind., 15 de Novembro (C. Durdin); Ponta do Pargo, 3 inds., 29 de Novembro (C. Fagundes);

ZEE, 197 milhas a NW da Ponta do Pargo, 1 ind. a bordo do navio, 14 de Novembro (R. Guierreiro);
Comentário: trata-se de um invernante raro nesta região. Publicam-se registos na Madeira, assim como aves em passagem em ambiente marinho.

Andorinha-das-chaminés *Hirundo rustica*

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 25 inds., 1 de Março (H. Hoiby);

2007 – Madeira, Ponta do Pargo, 3 inds., 15 de Fevereiro (H. Romano);

ZEE, 80 milhas a leste de Porto Santo, 1 ind., 14 de Fevereiro (A.H. Leitão);

Comentário: migrador de passagem pouco comum, ocorrendo habitualmente em baixos números.

Andorinha-dos-beirais *Delichon urbicum*

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 6 inds., 1 de Março (H. Hoiby); Machico, 7 inds., 23 de Março (T. Evald); Ponta de S. Lourenço, 2 inds., 12 de Abril (A. Svensson);

2007 – Madeira, Ponta do Pargo, 2 inds., 20 de Outubro (H. Romano, C. Fagundes);

Comentário: migrador de passagem pouco frequente, embora regular.

Petinha-dos-prados *Anthus pratensis*

2007 – Madeira, Porto Moniz, 1 ind., 27 de Novembro (R. Guerreiro);

Comentário: migrador de passagem escasso nesta região.

Alvéola-branca *Motacilla alba*

2006 – Madeira, Porto Moniz, 1 ind., 19 de Janeiro a 2 de Fevereiro (D. Mangsbo, K. Fries);

Porto Santo, Tanque, 1 ind., 9 de Outubro (S. Masur); mesmo local, 2 inds., 6 de Dezembro (G. Boomhouwer);

2007 – Madeira, Seixal, 1 ind., 20 de Outubro (C. Fagundes, H. Romano); S. Vicente, 2 inds., 27 de Dezembro (C. Fagundes, H. Romano);

Porto Santo, Tanque, 1 ind., 27 de Setembro (I. Fagundes, J. Nunes); mesmo local, 2 inds., 30 de Dezembro (I. Fagundes, J. Nunes); Praia da Calheta, 1 ind., 31 de Dezembro (I. Fagundes, J. Nunes);

Comentário: invernante raro no Arquipélago da Madeira.

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 1 ind., 3 de Fevereiro (K. Fries); mesmo local, 1 ind., 1 de Março (H. Hoiby); Ponta do Pargo, 15 inds., 8 de Outubro (S. Masur); mesmo local, 1 ind., 14 de Outubro (I. Fagundes);

Porto Santo, Campo de Golfe. 1 ind., 27 de Fevereiro (G. Elias);

2007 – Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 30 inds., 19 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano); Paul da Serra, 6 inds., 21 de Setembro (I. Fagundes, J. Nunes); Ponta do Pargo, 10 inds., 28 de Setembro (J. Vickerman);

Porto Santo, Tanque, 1 macho adulto, 24 de Setembro (P. Saarinen, A. Saarinen); mesmo local, 2 inds., 27 de Setembro (I. Fagundes);

Comentário: apresentam-se registos em Porto Santo, onde a presença deste migrador de passagem está mal documentada, assim como concentrações importantes. Destacam-se ainda registos na passagem pré-nupcial, incluindo duas observações em Fevereiro, mês em que a presença do chasco-cinzento é rara.

Felosinha-comum *Phylloscopus collybita*

2004 – ZEE, 130km a S da Madeira, 1 ind., 7 de Novembro (R. Wynn); 120km a S da Madeira, 1 ind., 10 de Novembro (R. Wynn);

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 1 ind., 19 de Janeiro (D. Mangsbo); Funchal, Jardim Botânico, 1 ind., 30 de Dezembro (G. Boomhouwer);

2007 – Desertas, Deserta Grande, 1 ind., 30 de Novembro (R. Guerreiro);

Porto Santo, Tanque, 3 inds., 30 de Dezembro (I. Fagundes, J. Nunes);

Comentário: esta espécie é de ocorrência rara neste arquipélago, pelo que todas as observações são relevantes.

Felosinha-musical *Phylloscopus trochilus*

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 2 inds., 30 de Novembro (G. Boomhouwer);

2007 – Porto Santo, Tanque, 2 inds., 6 de Setembro (C. Fagundes, H. Romano);

Comentário: trata-se de um migrador de passagem raro nesta região.

Estorninho-malhado *Sturnus vulgaris*

2006 – Madeira, Ponta do Pargo, 30 inds., 5 de Fevereiro (C. Fagundes); Ponta de S. Lourenço, 6 inds., 27 de Novembro (G. Boomhouwer);

2007 – Madeira, Caniçal, 42 inds., 28 de Novembro (R. Guerreiro, I. Fagundes, M. Suárez); Ponta do Pargo, 4 inds., 29 de Novembro (C. Fagundes); Ponta de S. Lourenço, 50 inds., 12 de Dezembro (G. Silva);

Comentário: algumas concentrações importantes deste invernante raro neste arquipélago.

Pintarroxo *Carduelis cannabina*

2006 – Madeira, Ponta de S. Lourenço, 200 inds., 3 de Fevereiro (K. Fries);

2007 – Madeira, Paul da Serra, 100 inds., 2 de Setembro (T. Epple);

Comentário: concentrações elevadas para esta espécie pouco comum na Madeira.

ARQUIPÉLAGO DAS SELVAGENS

Pardela-de-barrete *Puffinus gravis*

2006 – Selvagem Grande/Selvagem Pequena, travessia, 10 inds., 2 de Setembro (R. Matias);

Comentário: espécie raramente registada nesta região.

Calca-mar *Pelagodroma marina*

2006 – Selvagem Grande, 1 ad. no ninho, 5 de Setembro (R. Matias);

Comentário: registo extremamente tardio de reprodução para esta espécie que habitualmente faz a postura durante os meses de Março e Abril.

Alcatraz *Morus bassanus*

2007 – Selvagem Grande, 1 adulto em voo para oeste, 3 de Abril (H. Alonso);

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Garça-real *Ardea cinerea*

2006 – Selvagem Grande, 8 inds., 8 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, planalto, 1 ind., 31 de Março e 1 de Abril (H. Alonso); Chão dos Caramujos, 2 inds., 5 de Abril (H. Alonso);

Comentário: uma concentração importante e registos na Primavera, período em que a presença desta espécie é menos frequente.

Peneireiro-vulgar *Falco tinnunculus*

2006 – Selvagem Grande, Chão dos Caramujos, 1 fêmea/juv., 31 de Julho (R. Matias); 1 juv./fêmea, 18 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, Chão dos Calcamares, 1 ind., 1 de Abril (H. Alonso); junto à casa, 1 ind., 11 de Abril (H. Alonso); 2 inds., 11 e 12 de Maio (H. Alonso);

Comentário: espécie pouco frequente na região.

Maçarico-das-rochas *Actitis hypoleucos*

2006 – Selvagem Grande, 1 ind., 3 de Setembro (R. Matias); 2 inds., 8 de Setembro (R. Matias);

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Rola-brava *Streptopelia turtur*

2006 – Selvagem Grande, 18 inds., 5 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, 3 inds., 29 de Março (H. Alonso); junto à casa, 10 inds., 14 de Abril (H. Alonso); 5 inds., 13 de Maio (H. Alonso); 5 inds., 13 de Maio (H. Alonso);

Comentário: registos que ilustram a ocorrência desta espécie cuja presença nas Selvagens se encontra mal documentada.

Andorinha-das-barreiras *Riparia riparia*

2007 – Selvagem Grande, 1 ind. encontrado morto, 15 de Maio (H. Alonso);

Comentário: migrador de passagem de ocorrência rara neste arquipélago.

Andorinha-das-chaminés *Hirundo rustica*

2006 – Selvagem Grande, 1 ad., 28 de Junho (R. Matias); 1 ad., 3 de Julho (R. Matias); 1 juv., 6 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, trilho da Baía das Cagarras, pelo menos 5 inds., 27 de Março (H. Alonso); junto à casa, 2 inds., 3 de Abril (H. Alonso); Chão dos Caramujos, 3 inds., 23 de Abril (H. Alonso); 8 inds., 9 de Maio (H. Alonso);

Comentário: registos que ilustram a presença deste migrador de passagem na região, cujo estatuto se encontra mal documentado.

Andorinha-dos-beirais *Delichon urbicum*

2006 – Selvagem Grande, 2 ads., 1 de Julho (R. Matias); 2 ads., 20 de Julho (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, trilho da Baía das Cagarras, pelo menos 5 inds., 27 de Março (H. Alonso); 4 inds., 2 de Maio (H. Alonso); pelo menos 43 inds. na ilha, 13 de Maio (H. Alonso);

Comentário: migrador de passagem pouco comum na região.

Alvéola-amarela *Motacilla flava*

2007 – Selvagem Grande, 2 inds., 10 de Maio (H. Alonso); 10 inds., 12 de Maio (H. Alonso);

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Rabirruivo-preto *Phoenicurus ochruros*

2006 – Selvagem Grande, 1 juv., 9 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, 1 macho, 10 de Maio (H. Alonso);

Comentário: registos deste migrador de passagem raro nas Selvagens.

Rabirruivo-de-testa-branca

Phoenicurus phoenicurus

2007 – Selvagem Grande, junto à casa, 1 ind., 6 e 7 de Abril (H. Alonso); 4 inds., 11 de Maio (H. Alonso);

Comentário: espécie pouco frequente nestas ilhas, destacando-se o número de aves presentes a 11 de Maio.

Cartaxo-nortenho *Saxicola rubetra*

2006 – Selvagem Grande, 1 ind. encontrado morto, 15 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, 2 inds., 11 de Maio (H. Alonso);

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

2006 – Selvagem Grande, 4 inds., 7 de Setembro (R. Matias); 4 inds., 11 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, Chão dos Caramujos, 1 ind., 12 de Maio (H. Alonso);

Comentário: migrador de passagem pouco frequente neste arquipélago.

Rouxinol-pequeno-dos-caniços

Acrocephalus scirpaceus

2006 – Selvagem Grande, 1 juv., 7 de Setembro (R. Matias); 1 ind., 14 de Setembro (R. Matias);

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Toutinegra-de-barrete *Sylvia atricapilla*

2007 – Selvagem Grande, junto à casa, 1 ind., 27 de Março (H. Alonso);

Comentário: migrador de passagem pouco frequente na região.

Papa-amoras *Sylvia communis*

2006 – Selvagem Grande, 1 ind., 2 de Setembro (R. Matias); 2 inds., 9 de Setembro (R. Matias);

Comentário: migrador de passagem cuja presença neste arquipélago se encontra mal documentado.

Felosa-poliglota *Hippolais polyglotta*

2006 – Selvagem Grande, 2 inds., 4 de Setembro (R. Matias);

Comentário: espécie raramente registada nestas ilhas.

Felosinha-musical *Phylloscopus trochilus*

2006 – Selvagem Grande, 38 inds., 5 de Setembro (R. Matias);

Comentário: contagem anormalmente elevada para estas ilhas, deste migrador de passagem regular na região.

Taralhão-cinzento *Muscicapa striata*

2006 – Selvagem Grande, 4 inds., 4 de Setembro (R. Matias); 3 inds., 10 e 11 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, min. de 6 inds., 10 de Maio (H. Alonso);

Comentário: migrador de passagem pouco comum mas regular na região, apresentando-se contagens elevadas para a região.

Papa-moscas *Ficedula hypoleuca*

2006 – Selvagem Grande, 2 inds., 4 de Setembro (R. Matias);

2007 – Selvagem Grande, min. de 5 inds., 10 a 12 de Maio (H. Alonso);

Comentário: registos que ilustram a passagem desta espécie migradora.

Caspian Gull *Larus cachinnans* at Beja: a new species for Portugal

Gaivota do Cáspio Larus cachinnans em Beja: uma nova espécie para Portugal

C.C. Moore

Introduction

In most winters, the municipal landfill area, south of Beja, holds numbers of Red Kite *Milvus milvus*, White Stork *Ciconia ciconia*, Black-headed Gull *Larus ridibundus* and around 1500 large Larids, mainly Lesser Black-backed Gull *L. fuscus* in immature plumage. Usually these last birds are accompanied by very small numbers of Yellow-legged Gull *L. michabellis*, some of which remain in the area well into the early spring.

On 18 April 2006, while watching a small flock of gulls at the western end of the landfill, I briefly glimpsed a very pale, large, white-headed gull which had mixed features of 'adult' mantle and head, juvenile flight feathers and a tail pattern more reminiscent of a 2nd winter Yellow-legged Gull. Luckily it re-appeared later at the northern corner of the area, floating on a large rainwater pool, and I was able to observe it for several hours in flat afternoon light at ranges down to 100 m, using a 60x tripod-mounted telescope, while it preened, fed and flew.

Having lost my camera to theft, I was reduced to sketching the bird and taking extensive notes but at least I was able to compare it with recent observations made in Oman of Caspian Gull types *L. cachinnans (sensu lato)*. Disconcertingly, I could not immediately reconcile it with those observations, not least because of the apparent age of the bird. Thus, I travelled to Castro Marim on 19 April to upgrade my knowledge of Yellow-legged Gull and there became ever more convinced that the bird was significantly different in many important ways from that species. Several of the field sketches made at Beja are included with this record to indicate just how striking was this individual.

The bird was seen last at Beja landfill on the 23

April, when few gulls of any kind were present and when the area was visited in early May, no large gulls remained.

Six months later, extensive research in the literature had convinced me that it was indeed a Caspian Gull *L. cachinnans* in fairly typical 1st summer plumage and I submitted the record in 2007. The Portuguese Rarities Committee accepted the record in April 2008, the committee's consulting expert agreeing with the aging as second calendar year.

Description

It was a gracile bird, in size larger and taller than Lesser Black-backed Gull; longer and taller, though not as large as the largest Yellow-legged Gull, lacking that species' heavy bill and chest. It was predominantly white-bodied.

In shape the bird was especially distinctive with elongate wings and neck, a remarkably saurian head shape with elongate bill, sloping acrocephaline forehead and "Prussian" nape, a weak sunken breast in silhouette and long spindly, etiolated legs. On the water it floated remarkably like a phalarope *Phalaropus sp*; often it tilted forward, tail elevated, like Slender-billed Gull *L. genei*.

On the ground it alternated between an ugly flat-footed walk and a ballerina pose, at times holding the wings slightly akimbo; it flashed its underwing rather conspicuously when landing and when feeding on rubbish. The flight itself was graceful but heavy.

In flight the upperwing pattern was distinctively four-shaded, with tar-brown lesser coverts, secondaries and outer primaries, sepia-brown greater coverts with broad pale tips and pale greyish median coverts, lightly streaked.




Fig. 1 Field sketch of heads of three gull species present at Beja, April 2006: note the extreme acrocephaline head, long bill and collapsed breast shape in this 1st summer type Caspian Gull.




Fig. 2 Field sketch of Caspian Gull, 1st summer type, Beja, April 2006: note the dainty small-gull posture on the water, with tail and head elevated. The wing-bars are very conspicuous.

On the perched bird this pattern produced a series of wing-bars from dark lesser coverts to broad, pale, greater covert tips. Tertiaries deep brown, tipped cleanly paler.

The inner primaries were especially distinctive, each translucent greyish-white with darker frames, forming, when spread, a beautiful venetian-blind

effect, more reminiscent of Herring Gull *L. argentatus* than Yellow-legged Gull.

The rather greyish scapulars, each with a prominent sepia shaft, framed the greyish mantle. At the highest magnification, many mantle feathers, not much darker than those of Black-headed Gull, and certainly paler than Yellow-legged Gull, were seen to have a fine sepia shaft too.

The underwing, framed by dark primary tips, dark leading edge feathers and dark uniform secondaries, was strikingly white with very broad stone-white primary bases and median covert bases. The lesser coverts had an unusual white centre and the prominent axillaries, with their sepia shafts, were reminiscent of those of juvenile Audouin's Gull *L. audouinii*.

The tail, remindful of a 2nd winter Yellow-legged Gull, was almost entirely white with a smooth, broad terminal band of sepia-brown; a fine filigree of sepia lay immediately proximal, forming a second tail-bar, similar to that of 1st winter Ring-billed Gull *L. delawarensis*.

The head and neck, more like that of an adult large gull, were predominantly white and initially incongruous, juxtaposed against the unmoulted juvenile flight feathers.

There were fine shadows around the eye and the rear neck was streaked, the streaking running forward in ever-smaller stroke marks onto neck and breast sides. This "scarf" of oily sepia-brown was noticeable even on the flying bird.

The bird's bill, seen alongside immature Lesser Black-backed Gull and Yellow-legged Gull, was longer and thicker than the former, longer and thinner than the latter with a virtual absence of gonydeal angle. The bill had a pale horn base spreading along the upper mandible to the nostril; the lower, distal half of the bill was dark horn, tipped paler. Bill and forehead ran together to accentuate the reptilian appearance. The gape was distinctly long, running to a point below the eye. The eye was small, dark and set well forward in the head, adding to the saurian effect.



Fig. 3 Field sketch of Caspian Gull, 1st summer type, Beja, April 2006: note the open-wing posture and distinctive upwring pattern with framed inner primaries very noticeable.

The legs seemed absurdly elongate and weak, in colour a washed out translucent greyish-pink, like a freshwater shrimp. Oddly, it often dangled these spindly legs like a spoonbill *Platalea sp.* when landing and taking off.

Discussion

In 1982, Peter Grant galvanised gull identification with his book *Gulls: a guide to identification*, although even by 1986 when he revised the book, Herring Gull was still a single species. In the two decades since then, Klein & Gruber (1997), Garner *et al.* (1997) and many others have revolutionised the way we think about large white-headed gulls. In 1998, Lars Jonsson, in a seminal paper, based on an exhaustive photographic and illustrative analysis, suggested that “the birding community must be prepared to treat *L. cachinnans* and *L. michabellis* as taxonomic species” using the name *cachinnans* to clearly delineate a taxon which had been confusedly described and named over the years (Jonsson, 1998). By 2002, Pierre Yésou could justify the existence of about ten discernibly different taxa within the *argentatus-cachinnans-fuscus* complex (Yésou, 2002). Along with Armenian Gull *L. armenicus* and American Herring Gull *L. smithsonianus*, the taxa included pink-legged *L. argentatus* from the British Isles northwards, yellow-legged *L. michabellis* from the Mediterranean to the Atlantic islands and pink-

straw-legged *L. cachinnans* from the northern Black Sea to Kazakhstan (Olsen and Larsson, 2004). In 2007, Sangster *et al.* in their taxonomic recommendations for British Birds confirmed the belief, based on field evidence and phylogenetic study, that *L. cachinnans* is a good species (Sangster *et al.*, 2007). Many observers have indicated that Caspian Gull is indeed an especially distinctive taxon (e.g. Bakker *et al.*, 2000), being very white-headed, with rapid moult of body features and a precocious advance towards adult plumage. This ties in well with the Beja observations which showed a bird with tail markings like a 2nd winter bird, a very white adult-like head and retained juvenile remiges.

What is also now clear is that Caspian Gull has been expanding its range in eastern Europe (van den Berg & Bosman, 1999; Bakker *et al.*, 2000). It has attempted to breed in Poland and Germany and, as might be expected, hybrids between Herring Gull and Caspian Gull occur in Poland and further east (Faber *et al.*, 2001). Fortuitously, the evidence indicates that variation amongst hybrids is not continuous and no extensive intergradation exists between these two taxa (Yésou, 2002). Indeed it is partly based upon this very fact that the taxonomic sub-committee of the AERC and then Sangster *et al.* felt justified in validating Caspian Gull as a good species (AERC TAC 2003; Sangster *et al.* 2007). It basically breeds true and the degree of divergence from Herring Gull, in behaviour, vocalizations, morphology and phylogenetic relationships supports this decision. The problem for observers in Western Europe is not pure-breeding birds; rather the difficulty lies in the fact that although hybrid variation between Herring Gull and Caspian Gull is not continuous, the degree, if any, of first and second generation interbreeding, is less clear. However, the present record, of a bird in very distinctive 1st summer plumage, revealed no indication of hybridisation whatsoever or any signs of intergrade characters (K. Mullarney *in litt.*) and, apart from striking structural differences, there were clear age-related moult differences from Yellow-legged Gull as well. These latter markers are now well-established from field studies in Europe and indeed these two taxa exhibit marked genetic differences (de Knijff *et al.* 2001).



Fig. 4 Field sketch of Caspian Gull, 1st summer type, Beja, April 2006: note the advanced adult-like plumage, alert upright posture and striking wing-bars.

Non-breeding Caspian Gulls now occur very regularly as far west as southern Britain and the species has been observed annually over the past decade in Western Europe in the late autumn, winter and early spring. Indeed it is thanks to diligent and cautious Dutch and British observers that we know so much about plumage variation and the natural moult sequences as the birds age (Bakker *et al.* 2000).

The first Iberian records apparently date from 2005, with two birds recorded in Asturias in the spring of that year (Gantlett, 2006). In the spring of the following year, larger numbers were again recorded in Spain (van den Berg, 2006); as yet however, these have not been accepted by the Spanish Rarities Committee (R.Gutiérrez, *in litt.*).

Though the Beja observation was at the western extremity of European sightings it is perhaps part of the expanding non-breeding range onto the western seaboard of Europe. Wintering Caspian Gulls in Europe favour dumps, pig farms and waterways and it is suggested here that the bird at Beja landfill probably arrived there via the rivers Tagus and/or Guadiana, from Spain initially, though what its movements were before arriving there, are less clear. Nevertheless, enormous




Fig. 5 Field sketch of Caspian Gull, 1st summer type, Beja, April 2006: note the remarkable display of unsullied white in the underwing coverts /primary bases and the neat clean tail pattern.

flocks of Lesser Black-backed Gulls regularly migrate overland using rivers and irrigated areas as navigation aids and feeding stations (Cramp *et al.*, 1985) and it would not be beyond conjecture to suggest that other large gulls may sometimes accompany them, at least during their nomadic winter movements.

Resumo

No dia 18 de Abril de 2006 foi observada no aterro sanitário de Beja uma gaivota que, embora semelhante a uma gaivota-de-patas-amarelas *Larus michahellis* apresentava características que a diferenciavam desta espécie. Após uma demorada e cuidada observação e após uma exaustiva pesquisa bibliográfica, chegou-se à conclusão que a ave era uma gaivota do Cáspio *L. cachinnans*. A ave foi vista pela última vez em 23 de Abril. Este foi o primeiro registo desta espécie oriunda da Europa oriental e da Ásia central em Portugal.

References

AERC TAC. 2003. AERC TAC *Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies-15th Draft* <http://www.aerc.eu>

- Bakker, T., Offereins, R. and Winters, R. 2000. Caspian Gull identification gallery. *Birding World* 13 (2): 60-74.
- Cramp, S. & Simmons, K.E.L. (eds.) 1985. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa* Vol III Oxford University Press. Oxford.
- Faber, M., Betleja, J., Gwiazda, R. and Malczyk, P. 2001. Mixed colonies of large white-headed gulls in southern Poland. *British Birds* 94: 529-534.
- Gantlett, S. 2006. 2005: the Western Palearctic year. *Birding World* 19 (1): 21-40
- Garner, M., Quinn, D. & Glover, B. 1997. Identification of Yellow-legged Gulls in Britain part 2. *British Birds* 90 (9): 369-383.
- Grant, P.J. 1982. *Gulls: a guide to identification*. T. & A. D. Poyser. Calton.
- Jonsson, L. 1998. Yellow-legged Gulls and yellow-legged Herring Gulls in the Baltic. *Alula* 4 (3): 74-100.
- Klein, R. & Gruber, D. 1997. Die Bestimmung und taxonomische Stellung der in Mitteleuropa auftretenden Weisskopfmöwen *Larus cachinnans*. *Limicola* 11: 49-75.
- Olsen, K.M. & Larsson, H. 2004. *Gulls of Europe, Asia and North America*. Christopher Helm. London.
- De Knijff, P., Denkers, F., van Swelm, N.D. and Kuiper, M. 2001 Genetic affinities within the Herring Gull *Larus argentatus* revealed by AFLP genotyping. *J. Mol. Evol.* 52: 85-93.
- Sangster, G., Collinson, J.M., Knox, A.G., Parkin, D.T. and Svensson, L. 2007. Taxonomic recommendations for British birds: Fourth report. *Ibis* 149 (4): 853-857.
- Van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W. 1999. *Rare birds of the Netherlands*. Pica Press. Robertsbridge.
- Van den Berg, A.B. & Haas, M. 2006. WP reports. *Dutch Birding* 28 (3): 170-182.
- Yésou, P. 2002. Trends in systematics. Systematics of *Larus argentatus-cachinnans-fuscus* complex revisited. *Dutch Birding* 24 (5): 271-298.

Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri* at Cape St. Vincent November 2006 – January 2007

Rabirruivo-mourisco Phoenicurus moussieri no Cabo de São Vicente, Novembro de 2006 a Janeiro de 2007

K.M. Wilson

On 16 November 2006, I had taken my family to Cape St. Vincent for a day trip from A Rocha Observatory where we were staying for two weeks. We arrived during the late morning. The weather was particularly warm and sunny with a light wind. A ringtail harrier *Circus* sp. flew across the road quite distantly in front of the car. Due to traffic, I was not able to stop until I reached the fort on the south side of the road approx 1 km east of the Cape. Unfortunately, there was no further sign of the harrier.

Having parked up, we had a quick look around the old fort walls etc. I soon became distracted by birds in the adjacent scrub. Between the fort and road, I was able to cover about a hectare of scrub. Here, there were up to five Sardinian Warblers *Sylvia melanocephala*, a Dartford Warbler *S. undata*, four Common Stonechats *Saxicola torquatus*, two Black Redstarts *Phoenicurus ochruros* (including an adult male) and two European Robins *Erithacus rubecula*. The European Robins and Black Redstarts in particular were highly mobile within this area and were chasing each other around in territorial fashion.

During this activity, a robin-sized chat appeared head on at the top of a bush about 60 m away. The striking orangey-red underparts and black upperparts broken by a blazing white supercilium and wing patch were features that I immediately recognized and I made an instant identification. The bird was a full male Moussier's Redstart *P. moussieri*. I had seen many in Morocco some years ago.

The bird had appeared only very briefly before flying away and out of view. Despite the relative proximity of the Moroccan population, I realized that this would be a highly significant record for Portugal. In all my reading on the country's avifauna, I could not remember any mention

of this species. I needed to get more views and preferably some video footage – I had my camera with me – but the demands of a young family prevented an immediate search.

I was able to return about one hour later. By this time it was around 13h30. I cautiously approached the area again and before long the Moussier's Redstart was relocated. It would sit on prominent perches for periods of up to 30 seconds, but would not tolerate a particularly close approach and when disturbed it went into deep cover. It spent periods of time apparently on the ground feeding out of view. However, I was able to get some video footage from about 30 m, resulting in a small but clearly identifiable image.

A brief description of the bird follows.

This was a small chat, robin-sized and similarly proportioned to European Robin and Black Redstart. The whole of the underparts were a striking orangey-red colour, appearing darker at longer distance. The head was black, but with a very broad, white supercilium which met broadly over the forehead and continued back behind the eye, flaring out around the ear coverts and onto the nape sides, although not quite meeting the orange underparts at the shoulder. The mantle and wings were also jet black except for a large white panel which covered much of the secondaries and reached onto the outer webs of the tertials. The tail appeared rufous, much as other redstarts. Thus the bird's plumage comprised a three-colour scheme. The fine bill was black and the legs were black. The eye was also black and surrounded by the black ear coverts and lores.

On the morning of 19 November I had the chance to return to Cape St. Vincent where I planned to spend the morning looking for migrants. Again, I parked at the fort and quickly obtained more views of the redstart in the usual

location. I then crossed the road and headed to the northern cliffs on the first part of my walk around the Cape. After about 150 m, I was surprised to see the redstart again. Here it showed very well on top of scrub. I was able to set up my telescope and digiscope the bird with the video camera at about 60 m. Full frame footage was obtained over the course of 2-3 minutes. The bird could be seen singing; possibly in sub-song as I was unable to hear anything clearly at that range. I also noted that there were some white flecks on the black ear coverts on its left side that I had not noted previously.

This was my last sighting of the bird. Subsequently, Colin Key, Ray Tipper and other birders were able to observe it over several weeks. It was last seen on 14 January 2007.

Note: A detailed review of this record has been published in *Dutch Birding*. Tipper, R.P. & Wilson, K.W. 2007. Moussier's Redstart at Cabo de São Vicente, Portugal, in November 2006 – January 2007. *Dutch Birding* 29 (5): 297-301.

Resumo

No dia 16 de Novembro de 2006 foi observada junto ao Cabo de São Vicente uma ave que foi rapidamente identificada como sendo um rabirruivo-mourisco *Phoenicurus moussieri*. A ave permaneceu na zona pelo menos até Janeiro de 2007. Este foi o primeiro registo efectuado no nosso país desta espécie originária do Norte de África.



Adult male Moussier's Redstart, Cape St. Vincent, Vila do Bispo, December 2006 (R. Tipper)

Primeiro registo de nidificação confirmada de Cagarraz *Podiceps nigricollis* em Portugal

First confirmed breeding record of Black-necked Grebe Podiceps nigricollis in Portugal

Pedro Pereira & Marco Caetano

O cagarraz *Podiceps nigricollis* é das cinco espécies de mergulhões nidificantes no Paleártico Ocidental, a que apresenta a distribuição mais ampla (Hagemeijer & Blair 1997). Ocorre com frequência associada a meios lênticos, desde que com vegetação emergente ou flutuante disponível, onde nidifica e procura alimento (Cramp & Simmons 1977).

Em Portugal, esta espécie é tipicamente considerada como invernante rara, com o estatuto de quase ameaçada (Cabral *et al.* 2006). As maiores concentrações registam-se no sul do país, nomeadamente no estuário do Sado e em Castro Marim (Farinha & Costa 1999). Em Espanha nidificam pelo menos 848 casais, com casos de reprodução confirmada a cerca de 100 km da fronteira com Portugal (Llimona & Máñez 2003). No entanto, nunca foi confirmada como nidificante no nosso país (Cтры & Costa 1999), existindo apenas observações de indivíduos em plumagem nupcial e registos de possível nidificação, principalmente nas maiores zonas húmidas costeiras do Algarve (Ministro & Fernandes 2002, Elias 2004, 2005).

O cagarraz inverte ainda em número reduzido e de forma dispersa em pequenos corpos de água. A albufeira do Poço da Rua (aproximadamente 3 ha) faz parte de um conjunto de pequenas albufeiras na região de São Cristóvão, concelho de Montemor-o-Novo, no Alentejo central, numa área relativamente plana dominada por montados esparsos, encaixada entre a serra de Monfurado, a norte, e o vale da ribeira das Alcáçovas, a sul.

No dia 1 de Maio de 2007, na albufeira do Poço da Rua, foram observados dois cagarrazes em plumagem nupcial, aparentando estar apenas em busca de alimento. As observações da espécie na região não eram inéditas (N. Faria & J. T. Tavares com. pess.). No dia 26 de Maio os dois indivíduos evidenciaram comportamento reprodutor, com parada nupcial e cópulas. Nesta data esteve

presente um terceiro indivíduo, igualmente adulto em plumagem nupcial. A 8 de Junho, perto do local das cópulas, observou-se um indivíduo num ninho, aparentemente a incubar, e uma segunda ave nas suas proximidades. A ave que incubava transportava por várias ocasiões matéria vegetal até ao ninho com o intuito de ocultar os ovos. O ninho, com cerca de 35 cm de diâmetro, possuía 3 ovos castanho-acinzentados escuros (um ovo medido: 29 x 43 mm); era constituído essencialmente por espigas-de-água *Potamogeton* spp., agrupadas numa plataforma à deriva anexada às plantas vivas que flutuavam na coluna de água, num local onde a profundidade era de aproximadamente 1,10 m. Foram tomadas todas as precauções para que a perturbação junto do local de nidificação fosse a mínima possível, tendo sido observado o regresso de um dos progenitores à tarefa da incubação após o nosso abandono do local. O ninho estava bastante isolado de qualquer outro das restantes espécies de mergulhões, mergulhão-de-crista e mergulhão-pequeno, com as quais podem formar colónias mistas (Hagemeijer & Blair 1997). No dia 25 de Junho, foram observadas duas crias com adultos. Uma vez que o ninho desapareceu, não foi possível determinar o destino do terceiro ovo. A última observação dos adultos neste local data de 7 de Julho, cada um acompanhando uma das crias, já bastante desenvolvidas. Os juvenis permaneceram no local até 22 de Setembro, aparecendo frequentemente associados a mergulhões-pequenos.

Recentemente têm havido oscilações ou declínios populacionais nos países mediterrânicos (Cramp & Simmons 1977), reunindo a Europa central a maior parte da população de cagarraz na actualidade (Hagemeijer & Blair 1997). As populações reprodutoras desta espécie são tipicamente irregulares e flutuantes, ajustando a época de nidificação e variando o número de casais de acordo com a disponibilidade hídrica (Del Hoyo

et al. 1992; Llimona *et al.* 2004). Em Espanha, a maior parte dos casais reprodutores encontra-se fortemente concentrada em poucos locais, sendo a nidificação pontual ou bastante dispersa nas restantes comunidades (Llimona & Máñez 2003). Desta forma, a região potencial de nidificação é relativamente ampla e inclui Portugal. Assim, é possível que o presente casal seja proveniente de Espanha onde, devido a uma diminuição da pluviosidade (*cf.* www.aemet.es), se verificou uma redução no número de casais reprodutores a nível regional. Na Primavera de 2007, nidificaram 1088 casais nas marismas do Guadalquivir, representando apenas 60% do número máximo registado em 2004 (M. Máñez com. pess.). A conjugação de factores favoráveis no Alentejo (nomeadamente níveis hídricos e desenvolvimento de vegetação palustre adequados), pela altura em que a Primavera continuava seca na Andaluzia, terão permitido a ocorrência e nidificação de um casal na albufeira do Poço da Rua. A monitorização da avifauna de pequenas albufeiras, em especial as da região de São Cristóvão, poderá revelar mais casos de reprodução desta espécie.

Agradecimentos

Carlos Godinho, Pedro Salgueiro, Nuno Faria, Guilherme Dias, Edgar Gomes, Alexandre Leitão, João Tiago Tavares e Manuel Máñez.

Summary

In this note we describe the first documented breeding record of Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis* in Portugal. One pair bred during the spring of 2007 at the Poço da Rua reservoir (Montemor-o-Novo), Alentejo. Two chicks fledged successfully from the three eggs that were laid. Breeding in Portugal might be linked with a decrease in the water levels at the main Spanish breeding sites.

Referências

Cabral, M. J. (coord.), J. Almeida, P. R. Almeida, T. Dellinger, N. Ferrand de Almeida, M. E. Oliveira, J. M. Palmeirim, A. L. Queiroz, L. Rogado & M. Santos-Reis (Eds.) 2006. *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*. 2ª ed. I.C.N./Assírio & Alvim, Lisboa.

Cancela d'Abreu, A., T. P. Correia & R. Oliveira 2002. *Contributos para a identificação e caracterização da paisagem de Portugal Continental*, vol. IV. Universidade de Évora, Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico, Lisboa.

Catry, P. & Costa, H. 1999. A Extinção (Temporária) de Aves Nidificantes em Portugal Continental: um Balanço Possível. *Actas do II Congresso de Ornitologia*. S.P.E.A.

Cramp, S. & K. E. L. Simmons (eds.) 1977. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. I. Oxford University Press, Oxford.

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. eds. (1992) *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona.

Elias, G. 2004. Noticiário Ornitológico, 2002. *Anuário Ornitológico* 2: 21-54.

Elias, G. 2005. Noticiário Ornitológico, 2003. *Anuário Ornitológico* 3: 23-53.

Farinha, J. C. & H. Costa 1999. *Guia de Campo das Aves Aquáticas de Portugal*. Instituto da Conservação da Natureza.

Hagemeyer, E. J. M. & M. J. Blair (eds.) 1997. *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser, London.

Llimona, F. & M. Máñez 2003. Zampullín Cuellinegro *Podiceps nigricollis*. In R. Martí y J. C. del Moral (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, 80-81. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

Llimona, F., Máñez, M., García, M. & Ibáñez. 2004. Zampullín Cuellinegro *Podiceps nigricollis*. In A. Madroño, C. González y J. C. Atienza (Eds.) *Libro Rojo de las Aves de España*. Dirección General para la Biodiversidade-SEO/BirdLife. Madrid.

Ministro, J. S. & J. Fernandes 2002. Breeding birds in the Salgados lagoon (Algarve, Portugal): conservation values and management actions. *Airo* 12: 17-24.

Primeiros casos de nidificação de Corvo-marinho *Phalacrocorax carbo* em Portugal

First breeding records of Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Portugal

João L. Almeida

O corvo-marinho *Phalacrocorax carbo* nidifica na maior parte da Europa. Contudo, na Península Ibérica, é fundamentalmente uma espécie invernante, com casos esporádicos de reprodução apenas em Espanha (Lekuona, 2003). Em Portugal é uma invernante comum tanto na costa como no interior.

Ao longo dos últimos anos, durante a época de reprodução, tem-se verificado a permanência de indivíduos desta espécie em número crescente no interior do país, nomeadamente na Albufeira do Alqueva.

Nesta albufeira, durante trabalhos de recenseamento de aves, foram detectados dois dormitórios de Inverno em 2006: um com 878 e um outro com 1450 indivíduos. Durante a época de reprodução desse ano foram detectados alguns indivíduos nas maiores colónias de ardeídeos de Alqueva, sem evidência de nidificação.

Em 2007 foi encontrado um casal de corvos-marinhos a nidificar numa colónia de ardeídeos com mais de 3300 ninhos, no antigo leito da ribeira do Dejebe (Vendinha). Foram ainda observados mais 10 indivíduos em colónias de ardeídeos durante a mesma época de reprodução, quatro deles no antigo leito da ribeira de Alcarrache/Granja (Vale Formoso) e seis na ribeira de Mures (Juromenha), embora nestes casos não tenha ocorrido a nidificação.

Em 2008 foi confirmada a reprodução de três casais de corvos-marinhos em choupos de grande porte na periferia de uma colónia de garças na ribeira do Dejebe (Alqueva). Os ninhos permaneceram activos desde 11 de Maio até 28 de Julho, com um sucesso reprodutor de três crias, estando um ninho ocupado por duas crias, e outro com uma cria. O terceiro ninho acabou por ser abandonado devido a causas desconhecidas.

Em Portugal nunca se tinha comprovado a nidificação desta espécie. Estes são pois os primeiros registos.

Summary

During a heronry survey conducted in 2007 at the Alqueva dam located in the Guadiana basin, Alentejo, a pair of Great Cormorants was found breeding. Subsequently, in 2008, three pairs attempted to breed, two of them successfully. These records constitute the first confirmed breeding by the species in Portugal.

Referências

Lekuona, J.M. (2003) Cormorán *Phalacrocorax carbo* in R. Martí & J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, Dir. Ger. De la Conser. de la Naturaleza/SEO, Madrid

Contagens de Aves no Natal e no Ano Novo – 2006/2007

Christmas and New Year Bird Counts – 2006/2007

Coordenação de Domingos Leitão

Contagens realizadas por Agostinho Tomás, Ana Alexandra Fonseca, Ana Teresa Marques, António José Pereira, Artur Leitão, Carlos Manuel Vilhena, Carlos Pacheco, Clara Ferreira, Clive Viney, Daniel Sobral, David Hurst, Domingos Leitão, Duarte Nuno Bastos, Filipe Moniz, Francisco Espírito, Glenis Vowles, Henk Feith, Joana Santana, João Carlos Claro, José Luis Brandão, José Pedro Tavares, Júlio Reis, Luís Reino, Manuel Jorge Santos, Manuel Matos, Marco Fachada, Mário Santos, Michael Armelin, Miguel Mendes, Nelson Fonseca, Nuno Gomes Miguel, Nuno Soares, Patrícia Silva, Pedro Geraldes, Pedro Henriques, Ricardo Lima, Rodrigo Serrão, Rui Miguel de Brito, Rui Olas Brandão, R. Vowles, Samuel Cruz, Sandra Vieira, Tiago Rodrigues, Vitor Encarnação e Vitor Garcia.

Summary

CANAN (Christmas and New Year Bird Counts) is a program for monitoring wintering farmland birds in Portugal. With this program SPEA aims to monitor the populations of various species by producing abundance indices, updating the national estimates and improving knowledge of wintering birds in Portuguese IBAs.

Volunteers were asked to perform road transects in farmland or grassland areas, recording all birds of the following groups: herons and egrets, storks, ducks, geese, birds of prey, partridges and quails, moorhens, cranes, bustards, plovers and other waders, gulls, sandgrouse, pigeons and doves, owls, hoopoes, kingfishers, crows and shrikes

From 15 December 2006 to 31 January 2007 55 volunteers performed 55 road transects, covering 848.2 km all over the Portuguese mainland (Table 1). A total of 20 032 birds of 76 species was recorded (Table 2). The average abundance was 236.17 birds/km. Most of these birds were recorded in regions where more transects were performed: Alentejo (9686 birds) and Lisbon (7037 birds).

Lapwing was the commonest species, with 9740 birds recorded (Table 2). The second most common was the Cattle Egret, with 1916 birds recorded. These were followed by Black-headed Gull, European Golden Plover, Lesser Black-backed Gull, Northern Shoveler, Great Cormorant, White Stork and Azure-

winged Magpie, all with more than 400 birds recorded (Table 2).

Compared with the previous winter, 14 species showed negative trends and 15 species showed positive trends (Table 3). The ten largest negative trends were recorded for Common Woodpigeon, Common Sandpiper, European Golden Plover, Little Egret, Little Owl, Lesser Black-backed Gull, Red Kite, Common Teal, Common Raven and Eurasian Jay (Table 3). The ten largest positive trends were recorded for Great Cormorant, Black-winged Stilt, Grey Heron, Little Grebe, Western Marsh Harrier, Green Sandpiper, Eurasian Hoopoe, Common Magpie, Common Moorhen, and Cattle Egret (Table 3).

Introdução

Com este programa a SPEA pretende realizar uma monitorização anual das espécies de aves invernantes nos ecossistemas agrícolas. Utilizando uma metodologia simples é possível aproveitar as horas de campo de muitos observadores de aves no período do Natal e do Ano Novo e recolher informação importante para:

- Monitorizar as populações de aves invernantes em zonas agrícolas e conhecer as suas tendências populacionais;

- Melhorar as estimativas das populações nacionais de algumas espécies de aves invernantes não dependentes de zonas húmidas;
- Melhorar o conhecimento sobre as populações de aves invernantes nas IBA (Áreas Importantes para as Aves) com habitats agrícolas.

Tabela 1: Percursos de contagem realizados nas CANAN de 2006/2007 por região.

Table 1: Transect counts performed under CANAN 2005/2006 per region.

Região	Norte	Centro	Lisboa Vale Tejo	Alentejo	Algarve	Total
Percursos (n)	6	5	21	17	6	55
Total percorrido (km)	55,6	78,0	318,5	306,7	89,4	848, 2

Tabela 2: Número de aves por 10 km, por espécie e por região, em resultado da soma dos percursos, e número total de aves por espécie. / **Table 2:** Number of birds per 10 km, per species and per region, and total number of birds per species.

Espécie	Região	TOTAL					aves/10km	
		Norte	Centro	Lisboa	Alentejo	Algarve		
Nome comum	Nome científico	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	
Mergulhão-pequeno	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1			8	6	15	0,18
Mergulhão-de-poupa	<i>Podiceps cristatus</i>				10	1	11	0,13
Corvo-marinho	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	6	10	467	26	510	6,01
Carraceiro	<i>Bubulcus ibis</i>	36	287	985	435	173	1916	22,59
Garça-branca-pequena	<i>Egretta garzetta</i>		112	3	64	8	187	2,2
Garça-branca-grande	<i>Egretta alba</i>				22		22	0,26
Garça-real	<i>Ardea cinerea</i>	17	45	10	101	18	191	2,25
Cegonha-branca	<i>Ciconia ciconia</i>		132	43	233	26	434	5,12
Colhereiro	<i>Platalea leucorodia</i>		1		57		58	0,68
Ganso-bravo	<i>Anser anser</i>					1	1	0,01
Pato-real	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	11	21	255	82	371	4,37
Frisada	<i>Anas strepera</i>				102		102	1,2
Pato-colhereiro	<i>Anas clypeata</i>				528	4	532	6,27
Piadeira	<i>Anas penelope</i>				16	88	104	1,23
Marrequinha	<i>Anas crecca</i>		2	4	84	8	98	1,16
Arrábio	<i>Anas acuta</i>				21		21	0,25
Negrinha	<i>Aythya fuligula</i>				15		15	0,18

Espécie	Região	TOTAL						
		Norte	Centro	Lisboa	Alentejo	Algarve		
Nome comum	Nome científico	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	aves/10km
Grifo	<i>Gyps fulvus</i>		13			1	14	0,17
Águia-pesqueira	<i>Pandion haliaetus</i>			6	1	1	8	0,09
Águia-calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>				2	3	5	0,06
Milhafre-real	<i>Milvus milvus</i>				35		35	0,41
Peneireiro-cinzento	<i>Elanus caeruleus</i>		8	42	12	2	64	0,75
Águia-sapeira	<i>Circus aeruginosus</i>		13	29	10	1	53	0,62
Tartaranhão-cinzento	<i>Circus cyaneus</i>			5	5	2	12	0,14
Águia-d'asa-redonda	<i>Buteo buteo</i>	16	12	70	44	14	156	1,84
Gavião	<i>Accipiter nisus</i>	1	1		3		5	0,06
Peneireiro-comum	<i>Falco tinnunculus</i>	4	8	94	32	30	168	1,98
Falcão-peregrino	<i>Falco peregrinus</i>					2	2	0,02
Esmerilhão	<i>Falco columbarius</i>	1	2		1		4	0,05
Total de aves de rapina diurnas		22	57	246	145	56	526	6,2
Faisão	<i>Phasianus colchicus</i>			2			2	0,02
Perdiz	<i>Alectoris rufa</i>		15	5	112	64	196	2,31
Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>					7	7	0,08
Frango-d'água	<i>Rallus aquaticus</i>		2				2	0,02
Galinha-d'água	<i>Gallinula chloropus</i>		4	6	9	5	24	0,28
Galeirão	<i>Fulica atra</i>			4	92	8	104	1,23
Grou	<i>Grus grus</i>				26		26	0,31
Abetarda	<i>Otis tarda</i>				101		101	1,19
Sisão	<i>Tetrax tetrax</i>				38		38	0,45
	<i>Himantopus</i>							
Pernilongo	<i>himantopus</i>			40	12	26	78	0,92
Alcaravão	<i>Burhinus oedienemus</i>				66	10	76	0,9
Borrelho-grd.-de-coleira	<i>Charadrius hiaticula</i>			15		5	20	0,24
Borrelho-peq.-de-coleira	<i>Charadrius dubius</i>				6		6	0,07
Borrelho-de-coleira-interrompida	<i>Charadrius alexandrinus</i>					20	20	0,24
Tarambola-dourada	<i>Pluvialis apricaria</i>			105	691	10	806	9,5
Abibe	<i>Vanellus vanellus</i>	14	437	4827	4288	174	9740	114,83
Pilrito-de-peito-preto	<i>Calidris alpina</i>		100				100	1,18
Maçarico-das-rochas	<i>Actitis hypoleucos</i>				3	3	6	0,07
Maçarico-bique-bique	<i>Tringa ocbropus</i>		1	6	3	7	17	0,2
Perna-vermelha	<i>Tringa totanus</i>				1	5	6	0,07
Perna-verde	<i>Tringa nebularia</i>					1	1	0,01
Combatente	<i>Philomachus pugnax</i>			1			1	0,01

Espécie	Região	TOTAL						
		Norte	Centro	Lisboa	Alentejo	Algarve		
Nome comum	Nome científico	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	nº aves	aves/10km
Narceja-comum	<i>Gallinago gallinago</i>		1	25	9	10	45	0,53
Guincho	<i>Larus ridibundus</i>		99	92	542	103	836	9,86
Gaivota-de-cabeça-preta	<i>Larus melanocephalus</i>					1	1	0,01
Gaivota-de-patas-amarelas	<i>Larus cachinnans</i>					45	45	0,53
Gaivota-d'asa-escura	<i>Larus fuscus</i>		11	57	397	120	585	6,9
Garajau	<i>Sterna sandvicensis</i>					2	2	0,02
Seixa	<i>Columba oenas</i>		4			85	89	1,05
Pombo-das-rochas	<i>Columba livia</i>					8	8	0,09
Pombo-torcaz	<i>Columba palumbus</i>	2	3	141	7		153	1,8
Rola-turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	70	27	138	84	37	356	4,2
Mocho-galego	<i>Athene noctua</i>		1	1	3	2	7	0,08
Coruja-das-torres	<i>Tyto alba</i>					1	1	0,01
Poupa	<i>Upupa epops</i>		11	5	22	12	50	0,59
Guarda-rios	<i>Alcedo atthis</i>	2		1	1	1	5	0,06
Peto-real	<i>Picus viridis</i>	1		2	1	3	7	0,08
Pica-pau-malhado	<i>Dendrocopos major</i>	1		1		5	7	0,08
Picanço-real	<i>Lanius meridionalis</i>	2	27	40	65	7	141	1,66
Charneco	<i>Cyanopica cyaneus</i>		175	7	158	76	416	4,9
Pega	<i>Pica pica</i>	12	121	8	98	2	241	2,84
Gaio	<i>Garrulus glandarius</i>		5	2	2	9	18	0,21
	<i>Pyrrhocorax</i>							
Gralha-de-bico-vermelho	<i>pyrrhocorax</i>					16	16	0,19
Gralha-de-nuca-cinzenta	<i>Corvus monedula</i>				161	4	165	1,95
Gralha-preta	<i>Corvus corone</i>	28	8	174	113		323	3,81
Corvo	<i>Corvus corax</i>			10	12	2	24	0,28
Total de corvídeos		40	309	201	544	109	1203	14,18
Total de todas as espécies		211	1705	7037	9686	1393	20032	236,17

Tabela 3: Tendência populacional (%) em relação ao Inverno anterior. n – número de pares de percursos utilizados na análise. / **Table 3:** Population trend (% \pm SE) from the previous winter. n – number of transect pairs in the analysis.

Espécie		Tendência populacional (%)	(\pm) Erro Padrão	n
Pombo-torcaz	<i>Columba palumbus</i>	-97,6	0,25	11
Maçarico-das-rochas	<i>Actitis hypoleucos</i>	-73,6	2,28	9
Tarambola-dourada	<i>Pluvialis apricaria</i>	-66,4	0,76	21
Garça-branca-pequena	<i>Egretta garzetta</i>	-52,2	5,06	23
Mocho-galego	<i>Athene noctua</i>	-31,9	4,86	9
Gaivota-d'asa-escura	<i>Larus fuscus</i>	-31,3	1,95	21
Milhafre-real	<i>Milvus milvus</i>	-22,9	3,29	11
Gaio	<i>Garrulus glandarius</i>	-22,0	4,95	12
Marrequinha	<i>Anas crecca</i>	-21,2	3,84	9
Corvo	<i>Corvus corax</i>	-21,2	3,88	9
Gavião	<i>Accipiter nisus</i>	-15,1	7,1	8
Pica-pau-malhado	<i>Dendrocopos major</i>	-15,1	12,02	8
Rola-turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	-12,6	1,53	23
Tartaranhão-cinzento	<i>Circus cyaneus</i>	-10,4	3,12	11
Gralha-preta	<i>Corvus corone</i>	-9,5	0,69	25
Águia-d'asa-redonda	<i>Buteo buteo</i>	-7,7	0,36	43
Charneco	<i>Cyanopica cyanus</i>	-7,7	2,4	16
Peneireiro-cinzento	<i>Elanus caeruleus</i>	-5,0	0,84	22
Guincho	<i>Larus ridibundus</i>	-4,2	1,76	19
Picanço-real	<i>Lanius meridionalis</i>	2,0	0,65	30
Narceja	<i>Gallinago gallinago</i>	5,7	6,87	10
Perdiz	<i>Alectoris rufa</i>	12,6	2,72	17
Pato-real	<i>Anas platyrhynchos</i>	34,8	2,43	17
Cegonha-branca	<i>Ciconia ciconia</i>	49,5	1,51	28
Peneireiro-vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	52,1	0,56	37
Abibe	<i>Vanellus vanellus</i>	56,8	1,72	33
Carraceiro	<i>Bubulcus ibis</i>	60,6	2,25	30
Galinha-d'água	<i>Gallinula chloropus</i>	64,2	7,91	15
Pega	<i>Pica pica</i>	67,2	2,45	15

Poupa	<i>Upupa epops</i>	84,1	4,44	18
Maçarico-bique-bique	<i>Tringa ochropus</i>	86,4	8,63	11
Águia-sapeira	<i>Circus aeruginosus</i>	99,8	12,37	10
Mergulhão-pequeno	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	114,0	110,07	8
Garça-real	<i>Ardea cinerea</i>	147,2	4,67	26
Pernilongo	<i>Himantopus himantopus</i>	393,8	43,79	8
Corvo-marinho	<i>Phalacrocorax carbo</i>	449,9	27,4	20

Métodos

Contagens de aves

Foi pedido aos participantes para realizarem percursos de contagem de aves em habitat predominantemente agrícola entre 15 de Dezembro de 2006 e 31 de Janeiro de 2007. Foi fornecida uma ficha a todos os interessados para registar a seguinte informação: nome e endereço do observador, data, hora de início e hora de finalização do percurso, localização do percurso, dimensão do percurso e modo de deslocação, caracterização agrícola dos terrenos em ambos os lados do percurso, caracterização do regime cinegético dos terrenos em ambos os lados do percurso, número total de indivíduos e número de indivíduos por bando pertencente a cada espécie de ave observada nos dois lados do percurso, a qualquer distância do observador.

As espécies-alvo do censo de 2006/07 foram garças, cegonhas, patos, gansos, aves de rapina diurnas, perdizes, codornizes, galinhas-d'água, grous, abetardas, aves limícolas, gaivotas, cortiços, pombos, rolas, aves de rapina nocturnas, poupas, guarda-rios, corvos, pegas e gralhas e picanços. Foi dado espaço para o registo de outras espécies se o observador assim o entendesse.

Condições meteorológicas em Portugal e no Noroeste da Europa

Em Portugal Continental o mês de Novembro de 2006 foi caracterizado por valores médios da temperatura média do ar superiores aos valores normais para este mês, em todo o território. Pelo contrário, o mês de Dezembro de 2006 foi

caracterizado por valores médios da temperatura média do ar inferiores aos valores normais para o mês em quase todo o território. De 11 a 26 deste mês registou-se um período de frio, o vento soprou do quadrante leste e houve formação de geada. A temperatura mínima desceu significativamente até o dia 20, descida essa mais acentuada nas regiões do litoral. O mês de Janeiro de 2007 foi caracterizado por valores médios da temperatura média do ar próximos dos valores médios para Janeiro. No entanto, na segunda quinzena deste mês ocorreram alguns de dias e noites muito frias, em particular nos dias 28 a 31.

Os valores de precipitação em Novembro de 2006 variaram entre 104 mm em Portel e 462 mm na Covilhã, e foram, em geral, muito superiores aos respectivos valores médios para o mês, tendo por isso este mês sido classificado como chuvoso a extremamente chuvoso. Os valores de precipitação no mês de Dezembro foram próximos dos valores médios em parte da região Norte, mas muito inferiores no restante território. Assim, nestas regiões este mês classificou-se como seco a muito seco, tendo sido considerado normal em parte da região Norte. No mês de Janeiro de 2007 a quantidade de precipitação foi inferior a 40% dos valores normais em grande parte do território e o mês classificou-se como extremamente seco. Toda a informação referente às condições climáticas em Portugal Continental foi obtida no site www.meteo.pt.

No noroeste da Europa o Inverno de 2006/2007 foi em geral ameno e chuvoso. Em vastas regiões do Reino Unido, Holanda e França as temperaturas foram 2 a 3 °C superiores e a precipitação mais de

25% superior às médias esperadas para este período (www.knmi.nl, www.meteofrance.com, www.metoffice.com). Os episódios climáticos extremos foram raros. De referir, no entanto, a ocorrência de um curto período de ventos superiores a 100 km/h e de chuvas muito intensas na segunda semana de Dezembro, que atingiram principalmente o norte da França e a Holanda, e de um único período de frio intenso registado no Reino Unido e na Holanda entre 20 e 25 de Janeiro.

Tendo em consideração estes dados climáticos, poderemos afirmar que no noroeste da Europa no Inverno 2006/2007 não se registaram condições extremas de forma a empurrar contingentes excepcionais de aves para sul. Em Portugal, o Outono e Inverno terão sido em geral favoráveis à internada das aves em zonas agrícolas. As condições de internada agravaram-se progressivamente, devido à escassa pluviosidade registada em Dezembro e Janeiro.

Cálculo do índice populacional

A medição de tendências populacionais só tem significado quando aplicadas a séries temporais longas (Marchant *et al.* 1990). No caso particular do programa CANAN estão já disponíveis seis anos de censo (2001/2002 até 2006/2007), aos quais se podem juntar as duas edições experimentais de Janeiro de 2000 e de Janeiro de 2001 (ver Leitão & Peris 2003), dispondo portanto de um total de oito anos de censo.

Nesta análise foi utilizado um índice encadeado, que mede a razão entre a abundância de aves num determinado ano e a abundância no ano anterior (ver Marchant *et al.* 1990, Siriwardena *et al.* 1998). O número de aves de uma determinada espécie registado num determinado percurso de contagem foi emparelhado com o registo do mesmo percurso do ano (inverno) anterior, tendo sido as contagens somadas através de todos os pares para produzir uma estimativa global da percentagem de mudança. Esta percentagem de mudança foi aplicada ao valor do índice do ano anterior. Apenas os pares de percursos com pelo menos um registo em qualquer dos anos comparados foram incluídos no cálculo das tendências populacionais. Para esta análise foram consideradas as espécies com um mínimo de oito pares de percursos.

Devido à pequena amostra de pares de percursos de contagem ($n=8$ até $n=43$), particularmente nos anos iniciais, optou-se por usar o método de *Jack-Knife* para calcular o erro padrão.

Resultados

Percursos de contagem

Foram realizados 55 percursos por 55 observadores voluntários, distribuídos por todo o território Continental Português (Tabela 1). A maior parte destes percursos foram realizados na região de Lisboa e Vale do Tejo ($n=21$) e no Alentejo ($n=17$). A dimensão dos percursos variou entre 2,5 e 57 km, e foram percorridos no total 848,2 km (Tabela 1). Em Lisboa e Vale do Tejo foram percorridos 318,5 km, no Alentejo 306,7 km, e os restantes nas outras três regiões (Tabela 1). A maior parte destes percursos foi efectuada de automóvel (44 percursos, totalizando 783,5 km) e uma pequena parte foi efectuada a pé ou de bicicleta (11 percursos, totalizando 64,7 km).

Número de aves

Foram registadas 20032 aves, pertencentes a 75 espécies (Tabela 2). A densidade média nos habitats agrícolas amostrados foi de 236,17 aves por cada dez quilómetros percorridos (Tabela 2). A maior abundância de aves foi registada no Alentejo (315,81 aves/10km), seguindo-se-lhe Lisboa e Vale do Tejo (220,94 aves/10km) e o Centro (218,59 aves/10km).

A espécie mais abundante foi o abibe, com 9740 registos, seguida do carraceiro, com 1916 registos (Tabela 2). Seguiram-se-lhes, com mais de 400 registos e por ordem decrescente, o guincho, a tarambola-dourada, a gaivota-d'asa-escura, o pato-colhereiro, o corvo-marinho, a cegonha-branca e o charneco. (Tabela 2). Estas nove espécies no seu conjunto correspondem a 78% de todas as aves registadas.

Tendências populacionais

Relativamente ao Inverno anterior houve 14 espécies que registaram uma regressão populacional, expressa por uma tendência negativa superior a 10% (Tabela 3). Por outro lado, houve 15 espécies que registaram aumentos populacionais, expressos

por tendências positivas superiores a 10%, e sete espécies que permaneceram estáveis relativamente ao Inverno anterior. Quatro destas espécies registaram aumentos populacionais superiores a 100% e outras quatro registaram diminuições superiores a 50% (Tabela 3). As dez espécies cujas populações invernantes mais diminuíram foram, por ordem decrescente, o Pombo-torcaz, o Maçarico-das-rochas, a Tarambola-dourada, a Garça-branca-pequena, o Mocho-galego, a Gaiivota-d'asa-escura, o Milhafre-real, a Marrequinha, o Corvo e o Gaio (Tabela 3). As dez espécies cujas populações mais aumentaram foram, por ordem decrescente, o Corvo-marinho, o Pernilongo, a Garça-real, o Mergulhão-pequeno, a Águia-sapeira, o Maçarico-bique-bique, a Poupa, a Pega, a Galinha-d'água e o Carraceiro (Tabela 3).

Discussão

Tal como no Inverno anterior (Leitão 2006), o Inverno de 2006/2007 não foi favorável à vinda de grandes contingentes de aves invernantes provenientes do Norte da Europa. A ausência de períodos longos de frio terá sido responsável pela diminuição acentuada de algumas espécies migradoras no território de Portugal continental, tal como a Tarambola-dourada e o Pombo-torcaz. De qualquer modo, este padrão não foi igual para todas as espécies. Por exemplo, no caso dos pares de espécies Tarambola-dourada/Abibe e Milhafre-real/Peneireiro-vulgar, todas maioritariamente migradoras, registaram-se tendência populacionais opostas. Apesar das diferenças entre espécies, de um modo geral registaram-se menos aves do que no Inverno anterior (Leitão 2006).

Agradecimentos

Os nossos melhores agradecimentos são devidos a todos os voluntários que efectuaram contagens; sem eles este trabalho não seria possível. Agradecemos também à coordenação dos Censos de Aves Aquáticas, do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, pelo apoio e cedência de dados. Agradecemos ainda aos revisores, que em muito melhoraram a versão inicial deste documento.

Referências

- Leitão, D. (coord.) 2006. Contagens de Aves no Natal e no Ano Novo, 2004/2005. *Anuário Ornitológico* 4: 65-72.
- Leitão, D. & S. Peris 2003. Distribuição e abundância do Abibe *Vanellus vanellus* e da Tarambola-dourada *Pluvialis apricaria* em Portugal. *Airo* 13: 3-16.
- Marchant, J.H., R. Hudson, S.P. Carter & P. Whittington 1990. *Population Trends in British Breeding Birds*. British Trust for Ornithology. Tring, Hertfordshire.
- Siriwardena, G.M., S.R. Baillie, S.T. Buckland, R.M. Fewster, J.H. Marchant & J.D. Wilson 1998. Trends in the abundance of farmland birds: a quantitative comparison of smoothed Common Birds Census indices. *Journal of Applied Ecology* 35: 24-43.